

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2619702Q8048 1 液 660407149 0.02%ヘキザック ク水W	・殺菌消毒剤です。	
	吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社		
	2616700Q4068 1 油 660431074 0.025%オスバ ン	・この薬は軟膏などを作るとき に使用します。	
	2616700Q4041 1 液体 660406126 0.025W/V% 無色～淡黄色澄明 デアミトール水 0.025%	・この薬は手指・皮膚・医療用 具・傷口・粘膜・部屋・家具・ 器具・物品などを消毒します。 また、膣や目の洗浄に使用しま す。	・清潔な手・場所で取り扱い、 出来るだけはやすく使い切ってく ださい。
	丸石製薬株式会社		
	2619702Q8030 1 液体 660407150 0.02W/V%マ 無色澄明 スキン水 0.0 2%	・この薬は結膜囊、外陰・外性 器の皮膚などを消毒します。	・耳や膣、膀胱、口の中などの 粘膜には使用しないでください。 ・本剤の付着した白布を直 接、塩素系漂白剤で漂白しない でください。 ・清潔な手・場所で取り扱い、出来 るだけはやすく使い切ってください。
	日興製薬株式会社 丸石製薬株式会社		
	1324704Q1025 1 液剤(点鼻用) 661320001 0.05%プリビナ すみきった無色 液「チバ」	鼻やなどの血管を収縮させる作 用があり、充血などを除くこと により鼻づまりの症状を軽くし ます。	小児の手のとどかないところに 保管してください。
	日本チバガイギー株 ノバルティス ファ		
	2619702Q6070 1 液 660412054 0.05%ヘキザック 淡赤色澄明 ク水R	・殺菌消毒剤です。	
	吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社		
	2619702X2044 1 液 660407054 0.05%ヘキザック 帯黄色 ク水W	・殺菌消毒剤です。	
	吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2616700Q5048 660421050 0 . 0 5 W / V % チ アミトール水 0 . 0 5 %	1 液体	・この薬は手指・皮膚、医療用具、傷口、粘膜、部屋・家具・器具・物品などを消毒します。また、脛や目の洗浄に使用します。	・清潔な手・場所で取り扱い、出来るだけはやすく使い切ってください。
丸石製薬株式会社			
2619702Q6045 660406122 0 . 0 5 W / V % マ スキン水 0 . 0 5 %	1 液体	・この薬は皮膚の創傷部位や結膜囊、部屋・家具・器具・物品、外陰・外性器の皮膚などを消毒します。	・耳や脣、膀胱、口の中などの粘膜には使用しないでください。・本剤の付着した白布を直接、塩素系漂白剤で漂白しないでください。・清潔な手・場所で取り扱い、出来るだけはやすく使い切ってください。
日興製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2619702Q7033 660412052 0 . 1 % ヘキザック 水 R	1 液	・殺菌消毒剤です。	
吉田製薬株式会社			
吉田製薬株式会社			
2619702X1030 660407050 0 . 1 % ヘキザック 水 W	1 液	・殺菌消毒剤です。	
吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社			
2616700Q6044 660421052 0 . 1 W / V % デア ミトール水 0 . 1 %	1 液体	・この薬は手指・皮膚、医療用具、傷口、粘膜、部屋・家具・器具・物品などを消毒します。また、脣や目の洗浄に使用します。	・清潔な手・場所で取り扱い、出来るだけはやすく使い切ってください。
丸石製薬株式会社			
2619702X1048 660407144 0 . 1 w / v % マス キン水 0 . 1 %	1 液体	・この薬は皮膚の創傷部位や結膜囊、部屋・家具・器具・物品、外陰・外性器の皮膚などを消毒します。	・耳や脣、膀胱、口の中などの粘膜には使用しないでください。・本剤の付着した白布を直接、塩素系漂白剤で漂白しないでください。・清潔な手・場所で取り扱い、出来るだけはやすく使い切ってください。
日興製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2616700Q7032 660421053 0 . 2 W / V % デア ミトール水 0 . 2 %	1 液体	・この薬は手指・皮膚、医療用具、傷口、粘膜、部屋・家具・器具・物品などを消毒します。また、脣や目の洗浄に使用します。	・清潔な手・場所で取り扱い、出来るだけはやすく使い切ってください。
丸石製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	 2619702Q1078 1 液 662610272 0.5%ヘキザック 青紫色透明 アルコール液	・殺菌消毒剤です	
	 2619702Q2139 1 液 660444054 0.5%ヘキザック 無色透明 アルコール液N	・殺菌消毒剤です	
	 2619702Q2104 1 液 660412053 0.5%ヘキザック 淡赤色透明 水R	・殺菌消毒剤です。	
	 2619702Q1175 1 液 660407145 0.5%ヘキザック 帯黄色 水W	・殺菌消毒剤です。	
	 2619702Q1159 1 液体 660407146 0.5w/v%マスキン水 無色透明 0.5%	・この薬は皮膚の創傷部位や結膜囊、部屋・家具・器具・物品、外陰・外性器の皮膚などを消毒します。	・耳や脣、膀胱、口の中などの粘膜には使用しないでください。 ・本剤の付着した白布を直接、塩素系漂白剤で漂白しないでください。 ・清潔な手・場所で取り扱い、出来るだけはやく使い切ってください。
	 1319803Q1029 1 水性点眼剤 661310001 1%コンドロンナ フア液 (成分)無色透明	・この薬は目の充血をとるために用いられます。	・お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまつげに触れない様に注意してください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、一度レンズをはずしてから点眼し、5~10分間位してから再び使用してください。
	 2619819X1068 1 液体 660433053 2%ハイポエタナー 無色 ル「ニッコー」	・この薬はヨードチンキなどの使用によりついたヨウ素の色を脱色する働きがあり、また消毒にも使用します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。 ・刺激がありますので、傷のある皮膚や粘膜には使用しないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2619713Q1122 1 液体 662610464 2.0% V/V %マスキー 無色～微黄色澄明 ン液 2.0%	・この薬は手指・皮膚、皮膚の創傷部位や結膜囊、医療用具、部屋・家具・器具・物品、外陰・外性器の皮膚などの消毒に使用します。	・耳や脣、膀胱、口の中などの粘膜には使用しないでください。・必ず希釈し、濃度に注意して使用してください。・本剤の付着した白布を直接、塩素系漂白剤で漂白しないでください。
	1319804Q1023 1 水性点眼剤 661310002 3%コンドロンナ (成分)無色澄明 ファ液	・この薬は目の充血をとるために用いられます。	・お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまづけに触れない様に注意してください。・コンタクトレンズを使用している人は、1度レンズをはずしてから点眼し、5～10分間位してから再び使用してください。
	2619702Q3135 1 液剤 662610007 5%ヒビテン液 赤色	傷口、手指などの皮膚、器具、家具、物品、部屋などを消毒し、感染を予防します。	このくすりが付着した衣類などを塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミになることがありますので、漂白には酸素系漂白剤をご使用下さい。
	2619702Q3097 1 液 662610274 5%ヘキザック液 赤色澄明	・殺菌消毒剤です。	
	2615701Q1368 1 液剤 662610522 5.0%イソプロ「ヒ」無色澄明 シヤマ」	・殺菌消毒剤です。	・眼に入らないように注意すること、眼に入った場合は直ちによく水洗いすること。・蒸気の吸入に注意すること。・火気に注意すること
	2615701Q1090 1 液体 662610009 5.0%イソプロピル無色澄明 アルコール(丸石)	・この薬は手指、皮膚、医療用具を消毒します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。・傷のある皮膚や粘膜の部分には使わないでください。
	2615701Q1376 1 液 662610523 5.0%イソプロ「ヨ」無色澄明 シダ」	・殺菌消毒剤です	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 2615701Q2160 662610530 70%イソプロ「ヒ 無色透明 シヤマ」	1 液剤	・殺菌消毒剤です。	・眼に入らないように注意すること、眼に入った場合は直ちによく水洗いすること。・蒸気の吸入に注意すること。・火気に注意すること
 2615701Q2127 662610013 70%イソプロピル アルコール(丸石)	1 液体	・この薬は手指、皮膚、医療用具を消毒します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。・傷のある皮膚や粘膜の部分には使わないでください。
 2615701Q2135 662610012 70%イソプロ「ヨ 無色透明 シダ」	1 液	・殺菌消毒剤です	
 1319703Q2060 661310276 A Z点眼液 0.0 2% 5mL	1 点眼液剤	・急性結膜炎、慢性結膜炎、アレルギー性結膜炎、表層角膜炎、眼瞼縁炎、強膜炎の疾患に対し、炎症をおさえる働きがあります。	目を酷使する作業は、眼の病気に悪い影響を与える心配がありますので避けてください。
 1315701Q1073 660406156 D・E・X 0.0 2%点眼液 T	2 点眼液(5mLプラスチック容器)外形図	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 1315701Q1073 660406156 D・E・X 0.0 2%点眼液 T	1 点眼液(5mLプラスチック容器)外形図	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 1315701Q2053 660406155 D・E・X 0.0 5%点眼液 T	1 点眼液(5mLプラスチック容器)外形図	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1315700M2049 660406158	1 眼軟膏	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
D・E・X 0 . 1 % 眼軟膏T	点眼剤の色：白色半透明 キャップの色：白色		
日東メディック株式 日東メディック株式			
1315701Q3076 660406157	2 点眼液（5mLプラスチック容器）外形図	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
D・E・X 0 . 1 % 点眼液T	点眼剤の色：無色透明 キャップの色：青色		
日東メディック株式 ティカ製薬株式会社			
1315701Q3076 660406157	1 点眼液（5mLプラスチック容器）外形図	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
D・E・X 0 . 1 % 点眼液T	点眼剤の色：無色透明 キャップの色：青色		
日東メディック株式 日東メディック株式			
1319714Q3080 660406139	3 点眼液（5mLプラスティック容器）	・ビタミンB2の欠乏によって生じる目の病気に用います。身体の新陳代謝を正常に保つ働きをもつビタミンB2です。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。 ・あやまって衣服につくと黄色いしみになることがあるので、注意してください。衣服についた場合は、石けんをつけて水でよく洗ってください。
FAD点眼液T 0 . 0 5 % 5mL	点眼剤の色：黄色透明 キャップの色：黄色		
日東メディック株式 ティカ製薬株式会社			
1319714Q3080 660406139	2 点眼液（5mLプラスティック容器）	・ビタミンB2の欠乏によって生じる目の病気に用います。身体の新陳代謝を正常に保つ働きをもつビタミンB2です。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。 ・あやまって衣服につくと黄色いしみになることがあるので、注意してください。衣服についた場合は、石けんをつけて水でよく洗ってください。
FAD点眼液T 0 . 0 5 % 5mL	点眼剤の色：黄色透明 キャップの色：黄色		
日東メディック株式 日東メディック株式			
1319714Q3080 660406139	1 点眼液（5mLプラスティック容器）	・ビタミンB2の欠乏によって生じる目の病気に用います。身体の新陳代謝を正常に保つ働きをもつビタミンB2です。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。 ・あやまって衣服につくと黄色いしみになることがあるので、注意してください。衣服についた場合は、石けんをつけて水でよく洗ってください。
FAD点眼液T 0 . 0 5 % 5mL	点眼剤の色：黄色透明 キャップの色：黄色		
日東メディック株式 日医工株式会社			
1319714Q3030 661310291	1 点眼剤（5mLプラスチック容器）	・この薬の有効成分は身体の新陳代謝を正常に保つ働きをもつビタミンB2です。ビタミンB2の欠乏によって生じる目の病気（角膜炎、眼瞼炎）の治療に用います。	・あやまって衣類につくとしみになります。このような場合はしみを残さないため、なるべく早めに水洗いしてください。なお、羊毛や絹などの動物性繊維では洗ってもしみが残ることがありますので注意してください。
FAD点眼液サンテ ン 0 . 0 5 % 5mL	点眼剤の色：黄色～だい だい黄色透明キャップの 色：黄緑		
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649893S1029 660407083 	1 貼付剤 (7 × 10 cm) G S プラスター C 「ユートク」 7 c m × 10 cm 祐徳薬品工業株式会社 久光製薬株式会社	・貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。	・入浴時は、はがして、入浴後にまた貼付して下さい。
1319723Q1028 661310266 	1 水性点眼剤 I D U 点眼液「科研」 0.1% (成分)無色透明(容器)キャップ - ブルーブラック 本体 - 無色 科研製薬株式会社	・単純ヘルペスというウイルスの増殖を抑え、角膜の炎症を改善します。	・お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまづけに触れない様に注意して下さい。・コンタクトレンズを使用している人は、1度レンズをはずしてから点眼し、5~10分間位してから再び使用してください。
1319723Q1044 661310268 	1 点眼液 I . D . U . 点眼液 「センジュ」 0.1% 点眼瓶の色 : 無色キャップ 下端の色 : 紫色	・単純ヘルペスというウイルスの増殖を抑えます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
2649843S1039 660407074 	1 パップ剤 M S 温シップ「タイホウ」 淡黄赤色 ~ 淡赤褐色 岡山大鵬薬品株式会社 大鵬薬品工業株式会社	・ねんざ、だぼく、筋肉、関節、骨折の痛みやはれをおさえます。	・入浴の30分以上前にはがしてください。・入浴後直ちに使用しないでください。・この薬に触れた手で、目、鼻、口などに触れないよう注意してください。・残りの薬は袋にもどし、口を折り曲げて直射日光や高温の場所をさけて保存してください。・小児の手の届かない所に保管してください。
2649843S1055 660407075 	1 シップ剤 M S 温シップ「タカミツ」 淡黄赤色 ~ 淡赤褐色 株式会社タカミツ 株式会社三和化学研	炎症を起こしている部分の循環(血行)をよくしながら炎症を鎮める	・生活上注意することは
2649895S1028 660407077 	3 パップ剤 (10 × 14 cm, 14 × 20 cm) M S 冷シップ「タイホウ」 白色 岡山大鵬薬品株式会社 ティカ製薬株式会社	炎症を起こしている部位を冷却し炎症を鎮め、打撲や筋肉痛などの痛みを和らげます。	・この薬に触れた手で、目、鼻、口などに触れないよう注意してください。・残りの薬は袋にもどし、口を折り曲げて直射日光や高温の場所をさけて保存してください。・小児の手の届かない所に保管してください。
2649895S1028 660407077 	1 パップ剤 M S 冷シップ「タイホウ」 膏体の色 : 白色 岡山大鵬薬品株式会社 大鵬薬品工業株式会社	・ねんざ、だぼく、筋肉、関節、骨折の痛みやはれをおさえます。	・この薬に触れた手で、目、鼻、口などに触れないよう注意してください。・残りの薬は袋にもどし、口を折り曲げて直射日光や高温の場所をさけて保存してください。・小児の手の届かない所に保管してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2649895S1028 660407077 MS冷シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品株式会社 久光製薬株式会社	2 貼付剤 (10 x 14 cm, 20 x 14 cm) 膏体の色：白色 薬袋の記載：HP350P	・貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。 ・入浴時は、はがして、入浴後にまた貼付して下さい。
	2649895S1044 660407078 MS冷シップ「タカミツ」 株式会社タカミツ 株式会社三和化学研	1 シップ剤 M S 冷シップ「タカミツ」	炎症を起こしている部分を冷却するとともに、鎮痛・消炎作用を持っています。 ・生活上注意することは
	2399710E1020 662310002 S Pトローチ明治 0.25mg 明治製菓株式会社 明治製菓株式会社	1 トローチ剤 (ドーナツ型・直径：18.1mm) 青色 S - 0 6	口やのどの細菌を殺す働きがあります。 ・生活上注意することは ・この薬は包装から取り出して服用してください。
	6250700M1065 660444004 アーメス軟膏 3% 大洋薬品工業株式会社 大洋薬品工業株式会社	1 軟膏 アーメス軟膏 3% 白色 チューブのラベル記載： t 9 2 5	病気の原因であるウイルスの増殖を抑制し、皮ふ症状を改善します。 目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。
	1319720Q3035 660444001 アイケア 0.1 0.1% 5mL 科研製薬株式会社 ティカ製薬株式会社	2 点眼剤 (5mLプラスチック容器) アイケア 0.1 0.1% 5mL (成分)無色透明(容器)キャップ - 薄青紫色 本体 - 透明	・角膜(黒目)の表面の傷を治します。 ・涙を保持し安定させて目の乾燥を防ぎます。 ・コンタクトレンズを使用している人は、1度レンズをはずしてから点眼し、5~10分間位してから再び使用してください。
	1319720Q3035 660444001 アイケア 0.1 0.1% 5mL 科研製薬株式会社 ティカ製薬株式会社	3 水性点眼剤 アイケア 0.1 0.1% 5mL (成分)無色透明(容器)キャップ - 薄青紫色 本体 - 透明	・角膜(黒目)の傷をなおします。 ・涙を保持し安定させて目の乾燥を防ぎます。 ・お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまつげに触れない様に注意してください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、1度レンズをはずしてから点眼し、5~10分間位してから再び使用してください。
	1319720Q3035 660444001 アイケア 0.1 0.1% 5mL 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 水性点眼剤 アイケア 0.1 0.1% 5mL (成分)無色透明(容器)キャップ - 薄青紫色 本体 - 透明	・角膜(黒目)の傷をなおします。 ・涙を保持し安定させて目の乾燥を防ぎます。 ・お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまつげに触れない様に注意してください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、1度レンズをはずしてから点眼し、5~10分間位してから再び使用してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2655708N1148 660412000 アイコザールクリー ム 1 %	1 クリーム 白色	・真菌の発育を抑えて、真菌が原因で起こる皮膚病（水虫、たむし、でん風など）を治療します。	患部は清潔に保ち、通気性がよくなるようにしてください。
富士製薬工業株式会社 富士製薬工業株式会社			
1319709Q3020 661310284 アイドロイチン 1 % 点眼液 5 mL	1 点眼剤（5 mL プラスチック容器）	・角膜（黒目）の表面を保護します。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	点眼剤の色：無色～淡黄色 色透明キャップの色：青 緑色		
1319709Q4027 661310285 アイドロイチン 3 % 点眼液 5 mL	1 点眼剤（5 mL プラスチック容器）	・角膜（黒目）の表面を保護します。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	点眼剤の色：無色～淡黄色 色透明キャップの色：明るい緑		
1319741Q1026 660443001 アイビナール点眼液 0.5 mg 5 mL	1 点眼剤 点眼液の色：無色透明 キャップの型・色：星型、水色点眼瓶の色：無	花粉症などのアレルギー性結膜炎の症状である目のかゆみ、充血、めやに、まぶたのはれやごろごろ感などの症状をやわらげます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。
万有製薬株式会社 万有製薬株式会社			
2254700G3022 660412002 アイロミール 0. 3 8 5 4 % 8 . 9 g	1 定量噴霧式エアゾール	・この薬は、気管支をとりまく筋肉の緊張をゆるめ、気管支を拡げて呼吸を楽にする吸入薬です。また、喘息などの発作が起きたときに使うと発作を鎮めます。	・過度の使用は避けてください。 ・吸入後はうがいをしてください。 ・他の医師を受診（喘息あるいは他の病気）するときは、この薬を使っていることを伝えてください。
大日本住友製薬株式 大日本住友製薬株式			
2649710M2106 662640571 亜鉛華（10%）単 軟膏・YI	1 軟膏 白色～淡黄色	・皮膚の傷、やけど、凍傷や湿疹などに用いて、皮膚を保護する作用があります。	
山田製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2649710M2033 662640564 亜鉛華（10%）単 軟膏シオ工	1 軟膏 白色～淡黄色	・外傷、湿疹、皮膚炎等の皮膚疾患の炎症を抑え、皮膚を保護し、化膿を抑える塗り薬です。 ・皮膚疾患による皮膚のただれ、潰瘍や湿った部分を改善する塗り薬です。	小児の手の届かない所に保管してください。
シオ工製薬株式会社 日本新薬株式会社	本体識別コード：包装識別コード：		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649710M2050 662640566 亜鉛華(10%)単 軟膏「ニッコー」	1 軟膏	・この薬は傷、やけど、しもやけ、湿しん、皮膚が炎症を起こしたり、水がしみ出てきたり、ただれたりしている部分を保護し、炎症を抑え、治療する働きがあります。	・口に入れたり飲むことはやめてください。・目には使用しないでください。
2649710M2068 662640567 亜鉛華(10%)単 軟膏「ホエイ」	1 軟膏	・外傷、やけど、湿疹などの各種の皮膚病の炎症、ただれ、潰瘍、湿潤などの症状を改善します。	
メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式			
2649710M2092 662640570 亜鉛華(10%)単 軟膏「ヨシダ」	1 軟膏	・火傷、湿疹、皮膚炎等の炎症を抑えたり、保護したりします。	
吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社			
2649705X1121 660421076 亜鉛華デンプン(丸 石)	1 粉末	・この薬は湿しん、あせも、日焼け、炎症を起こしている部分などを保護し、炎症を抑え、治療する働きがあります。	・誤って吸いしないように注意してください。・目には使用しないでください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2649705X1199 662640811 亜鉛華デンプン「ヨ シダ」	1 粉末	・取れん・消炎・保護・緩和な防腐作用により、湿疹・皮膚炎・あせも、間擦疹、日焼けの症状を改善します。	
吉田製薬株式会社			
2649704M1104 662640446 亜鉛華軟膏	2 軟膏 白色	・この薬は傷、やけど、しもやけ、湿しん、皮膚が炎症を起こしたり、水がしみ出てきたり、ただれたりしている部分を保護し、炎症を抑え、治療する働きがあります。	・口に入れたり飲むことはやめてください。・目には使用しないでください。
2649704M1074 662640446 亜鉛華軟膏	1 軟膏 白色	・外傷、湿疹、皮膚炎等の皮膚疾患の炎症を抑え、皮膚を保護し、化膿を抑える塗り薬です。・皮膚疾患による皮膚のただれ、潰瘍や湿った部分を改善する塗り薬です。	小児の手の届かない所に保管してください。
日本新薬株式会社	本体識別コード：包装識別コード：		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649704M1104 662640446 亜鉛華軟膏	1 軟膏剤 白色 無し	傷、やけど、しもやけ、湿疹・皮膚炎、にきびなどの炎症をおさえ保護します。	1. 広範囲または重度のやけどには使用しないで下さい。2. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流してください。
2649704M1155 660408200 亜鉛華軟膏・YI	1 軟膏 白色	・皮膚の傷、やけど、凍傷や湿疹などに用いて、皮膚を保護する作用があります。	
岩城製薬株式会社			
2649704M1171 662640807 亜鉛華軟膏(日興製)	1 軟膏剤 白色～淡黄色 葉	傷、やけど、しもやけ、湿疹・皮膚炎、にきびなどの炎症をおさえ保護します。	1. 広範囲または重度のやけどには使用しないで下さい。2. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流してください。
2649704M1112 660431049 亜鉛華軟膏 ハチ	2 軟膏剤 白色	・傷、やけど、しもやけ、湿しん、皮ふ炎、にきびなどの炎症をおさえ保護します。	・取扱上の注意 使用後はキャップをしっかり閉めて保管してください。
東洋製薬化成株式会 小野薬品工業株式会			
2649704M1112 660431049 亜鉛華軟膏 ハチ	1 軟膏剤 白色	・傷、やけど、しもやけ、湿しん、皮ふ炎、にきびなどの炎症をおさえ保護します。	・取扱上の注意 使用後はキャップをしっかり閉めて保管してください。
東洋製薬化成株式会 健栄製薬株式会社			
2649704M1120 662640903 亜鉛華軟膏「ホエイ」	2 軟膏 白色	・外傷、やけど、湿疹などの各種の皮膚病の炎症、ただれ、潰瘍、湿潤などの症状を改善します。	
メルク・ホエイ株式			
2649704M1120 662640903 亜鉛華軟膏「ホエイ」	1 軟膏 白色	・外傷、やけど、湿疹などの各種の皮膚病の炎症、ただれ、潰瘍、湿潤などの症状を改善します。	
メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード	形	効能効果	注意事項	
名称	色			
製造会社				
販売会社	記号			
	2649704M1180 1 軟膏 662640808 亜鉛華軟膏「ヨシダ」	・火傷、湿疹、皮膚炎等の炎症を抑えたり、保護したりします。		
	吉田製薬株式会社			
	2649708X1150 2 軟膏 662640907 亜鉛華「ホエイ」 白色	・軟膏の基剤として用います。		
	メルク・ホエイ株式			
	2649708X1150 1 粉末 662640907 亜鉛華「ホエイ」 白色	・軽度の皮膚病の炎症をおさえ、保護します。		
	メルク・ホエイ株式			
	2639700N1024 1 クリーム剤 662630061 アクアチムクリーム 白色 1%	・皮膚の患部の細菌を殺菌することにより、炎症を抑えると共に、ざ瘡（にきびなど）を治療する外用薬です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。	
	大塚製薬株式会社 識別コード：なし 大塚製薬株式会社			
	2639700M1029 1 軟膏剤 620000348 アクアチム軟膏 1% 白色	・皮膚の患部の細菌を殺菌することにより、炎症を抑え、治療する外用薬です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。	
	大塚製薬株式会社 識別コード：なし 大塚製薬株式会社			
	2639700Q1020 1 ローション剤 660432004 アクアチムローション 淡黄色澄明 1%	・皮膚の患部の細菌を殺菌することにより、炎症を抑え、ざ瘡（にきびなど）を治療する外用薬です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。	
	大塚製薬株式会社 識別コード：なし 大塚製薬株式会社			
	2699703M1020 1 軟膏剤 662690012 アクトシン軟膏 3% 白色～微黄白色	傷の周りの血液の流れを良くして、床ずれややけどの回復を早めます。	・生活上注意することは	
	埼玉第一製薬株式会社 第一製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2619714X1067 662610014 アクリノール	1 粉末 黄色	・殺菌消毒剤です。	
	本体識別コード：包装識別コード：		
2619700Q1028 662610266 アクリノール0.1%液「ヨシダ」	1 液 黄色澄明	・殺菌消毒剤です	
吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社			
2619700Q2032 662610267 アクリノール0.2%液「ヨシダ」	1 液 黄色澄明	・殺菌消毒剤です	
吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社			
2619700Q3047 620000349 アクリノール0.5%液「ヨシダ」	1 液 黄色澄明	・殺菌消毒剤です	
吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社			
2619700Q1060 662610020 アクリノール液(丸石) 0.1%	液体 黄色澄明	・この薬は皮膚や扁桃せん、鼻の中、耳、口の中などの化膿している部分の消毒に使用します。	・飲まないでください。・衣類に付着すると黄色に変色し、脱色しにくいので注意してください。・光をあてない工夫をして保存してください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2619714X1121 662610564 アクリノール「ホエイ 黄色イ」	2 粉末 メルク・ホエイ株式	・泌尿器・産婦人科の手術後の化膿した部位の消毒をします。・毛あなが化膿した皮膚の病気(せつ、よう)、化膿による扁桃の炎症、副鼻腔の炎症、中耳の炎症による症状を消毒により改善します。・口の中の化膿による症状を消毒により改善します。	・衣類などに付着すると、脱色できませんので、注意してください。
2619714X1121 662610564 アクリノール「ホエイ 黄色イ」	1 粉末 メルク・ホエイ株式	・泌尿器・産婦人科の手術後の化膿した部位の消毒をします。・毛あなが化膿した皮膚の病気(せつ、よう)、化膿による扁桃の炎症、副鼻腔の炎症、中耳の炎症による症状を消毒により改善します。・口の中の化膿による症状を消毒により改善します。	・衣類などに付着すると、脱色できませんので、注意してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2619714X1130 660421071 アクリノール(丸石)	1 結晶性の粉末 黄色	・この薬は皮膚や扁桃せん、鼻の中、耳、口の中などの化膿している部分の消毒に使用します。	・飲まないでください。・衣類に付着すると黄色に変色し、脱色しにくいので注意してください。・光をあてない工夫をして保存してください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2619700Q1095 662610027 アクリノール溶液 (0.1%) (ニブロファーマ)	1 液剤 黄色澄明	・傷や化膿した部分の細菌を殺す働きがあります。	・衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにくいので、注意して下さい。
ニプロファーマ株式 ニプロファーマ株式			
2649719S1070 662640846 アコニップ 10cm × 14cm	1 パップ剤 (10 × 14 cm) 白色～淡黄色	・肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みを和らげます。外傷後のはれ、痛みを和らげます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	
第一薬品株式会社 ティカ力製薬株式会社	薬袋表面記載：ACP		
2260700F1030 620003010 アズガグルうがい液 T4%	1 液剤 (うがい液) こい青色	・口の中やのどのはれやいたみをやわらげるうがい薬です。	・手や皮ふなどについた場合は、水で洗い流してください。衣服についた場合も、水洗いしてください。また、水洗いできないものはドライクリーニングしてください。・この薬を使用中に口の中が青くなることがあります、これは有効成分によるもので、心配はいりません。・うがいにのみに使用してください。
東亜薬品株式会社 沢井製薬株式会社			
2649731S1038 660433001 アスゼスパップ	1 貼付剤 (大きさ：10 × 14 cm) 白色～淡黄色の膏体	この薬は関節炎や筋肉痛の痛みやはれがある部分にはることにより、それらの症状を抑える作用があります。	
三友薬品株式会社 日医工株式会社			
2529707H1055 660463001 アズゾール腔錠 250mg	1 膀胱用錠剤 (直径15.0 mm) 白色	・トリコモナスという原虫の発育を抑制して膀胱炎を治療します。	
富士製薬工業株式会社 富士製薬工業株式会社	シート記載：アズゾール 腔錠 250		
2655710Q1028 660406132 アスタッツ液 1%	1 液 (外用) 無色透明	真菌に対し殺菌効果を示し、主にいわゆる水虫等に用います。	
株式会社ツムラ 株式会社ツムラ	包装：ポリプロピレン製 容器識別コード：ツムラ -03		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2655710N1021 660406133	1 クリーム（外用） アスタッツクリーム 白色 1 %	真菌に対し殺菌効果を示し、主にいわゆる水虫等に用います。	
株式会社ツムラ 株式会社ツムラ	包装：アルミニウム製 チューブ識別コード：ツ ムラ - 0 2		
2655710M1026 660408269	1 軟膏（外用） アスタッツ軟膏 白色 1 %	真菌に対し殺菌効果を示し、主にいわゆる水虫等に用います。	
株式会社ツムラ 株式会社ツムラ	包装：アルミニウム製 チューブ識別コード：ツ ムラ - 0 5		
2399713E1023 662310031	1 錠剤（長径 1 0 . 5 m m、短径 6 . 0 mm ） アズノールS T 5 mg	・口の中の炎症や傷、のどの炎症を治療する薬です。	
日本新薬株式会社 日本新薬株式会社	(表) 2 3 4 (裏) アズ ノールS T 5 mg		
2260700F1021 660463002	1 液剤 アズノールうがい液 濃青色 4 %	・口の中の炎症や傷、のどの炎症を治療する薬です。	
株式会社日本点眼薬 日本新薬株式会社	アズノールうがい液 4 %		
2260700C1025 662230021	1 顆粒剤 アズノール・ガーグル 淡青色 ル 0 . 4 %	・口の中の炎症や傷、のどの炎症を治療する薬です。	
日本新薬株式会社 日本新薬株式会社	アズノール・ガーグル 2 3 7 0 . 5 g		
2649716M1042 620002619	1 軟こう剤 アズノール軟膏 0 . 3 3 %	・湿疹、やけど、皮膚のただれや潰瘍などを治療する薬です。	
日本新薬株式会社 日本新薬株式会社	アズノール軟膏 0 . 0 3 3 %		
2252700G1025 662220006	1 液剤 アスプール液 (0 . 5 %)	・喘息、気管支炎などに伴う息苦しさをやわらげます。	・次のような場所には置かないでください。日光の当たる所、高温になる場所。清潔に取り扱ってください。
アルフレッサファー アルフレッサファー	無色澄明液の臭：わずかな特異臭		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2252700G2021 662220007 アスプール液 (1 %) アルフレッサファー アルフレッサファー	1 液剤 瓶の色：黄色包装液の 色：無色澄明液の臭：わ ずかな特異臭	・喘息、気管支炎などに伴う息 苦しさをやわらげます。	・次のような場所には置かない でください。日光の当たる 所、高温になる場所 ・清潔に 取り扱ってください。
2649719S1118 660407063 アスマ ID 10 c m × 14 cm	1 貼付剤 (大きさ : 10 × 14 cm) 色：白色～淡黄色の膏 体，白色の不織布	この薬は関節炎や筋肉痛の痛み やはれがある部分にはることに より、それらの症状を抑える作 用があります。	
2649806X1027 662640644 アスマロール	1 パップ剤・ 14 × 10 c m (膏体重量 : 20 g) · 14 × 20 cm 白色～淡白色の膏体，白 色の不織布	この薬は関節炎や筋肉痛の痛み やはれがある部分にはることに より、それらの症状を抑える作 用があります。	・汗をかいたり、皮膚がぬれて いる場合は、患部を清潔にし てから使用して下さい。・本剤 に触れた手で、眼、鼻腔、口唇 等の粘膜に触れないよう注意し て下さい。
2260700F1056 620003012 アズレイうがい液 4 %	1 液剤 濃青色	・口の中やのどのはれ・いたみ をやわらげる薬です。	・薬液がこぼれてシャツなどが 着色しても水洗いすれば落ちま す。
2399713E1031 662310033 アズレミック g	1 錠剤 (長径 10 mm , 短 径 7 mm) 5 m g	・口内炎や咽頭炎などの炎症を 抑えたり、口の中の傷を治したりします。	・口の中が青色になりますが、 これは薬の成分によるものなので特に心配はありません。
2399713E1031 662310033 アズレミック g	2 錠剤 (長径 10 mm , 短 径 7 mm) 5 m g	・口内炎や咽頭炎などの炎症を 抑えたり、口の中の傷を治したりします。	・口の中が青色になりますが、 これは薬の成分によるものなので特に心配はありません。
東洋製薬化成株式会 小野薬品工業株式会	シート裏面の記載：アズ レミック , 5 m g		
2260700B1038 662230013 アズレンG「ヒシヤ マ」 0.4 %	1 散剤 H D - 505 ニプロファーマ株式	この薬は炎症を抑えるうがい薬 です。	・他の病気で他の医療機関にか かるとき、又は薬局で薬を購入 するときには、必ずこの薬を使 用していることを伝えて下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2260700B1038 662230013 	3 散剤 アズレンG「ヒシヤ マ」 0.4%	この薬は炎症を抑えるうがい薬です。	・他の病気で他の医療機関にかかるとき、又は薬局で薬を購入するときには、必ずこの薬を使用していることを伝えて下さい。
ニプロファーマ株式 ニプロファーマ株式	HD - 505		
1319703Q2078 660406137 	1 点眼液 (5 mL プラスチック容器) アズレン点眼液 T 0.02% 5 mL	・目の炎症を抑えます。 点眼剤の色：青紫色透明 キャップの色：紫色	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。・あやまって衣服につくとしみになることがあるので、注意してください。衣服についた場合は、石けんをつけて水でよく洗ってください。
日東メディック株式 日東メディック株式			
2655703N1030 662650099 	1 クリーム アセントクリーム 1%	水虫など真菌（カビの一種）による感染症の治療に用います。	・生活上注意することは患部を清潔にしてください。水虫の場合はできるだけ毎日、指の隙間までよく洗ってください。靴下は通気性のよいものにし、毎日履き替えてください。水虫の菌は湿ったところで増えやすいので、患部ができるだけ乾いた状態にしておいてください。
佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	チューブの記載： 930		
1319703Q2051 661310275 	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) アゾテシン点眼液 0.02% 5 mL	・結膜炎、角膜炎などの目の炎症を抑えます。 点眼剤の色：淡紫色透明 キャップの色：青緑	・あやまって衣類につくとしみになることがあります。このような場合はしみを残さないため、なるべく早めに水洗いしてください。
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
2529708J1027 662550025 	1 錠 (長径 26.3 mm) アデスタンG 100 白色 100 mg	・カビの一種であるカンジダによる外陰部や膣の炎症をしづめます。	・小児の手のとどかないところに保管してください。
日本シェーリング株 日本シェーリング株	A d e s t a n G 1 0 0 S C H E R I N G 飲まないでください。		
2529708J2023 662550026 	1 錠 (長径 26.3 mm) アデスタンG 300 白色 300 mg	・カビの一種であるカンジダによる外陰部や膣の炎症をしづめます。	・小児の手のとどかないところに保管してください。
日本シェーリング株 日本シェーリング株	A d e s t a n G 3 0 0 S C H E R I N G 飲まないでください。		
2655703N1021 662650005 	1 クリーム アデスタンクリーム 1%	・カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によって起こる皮膚病（タムシ、ミズムシ、カンジダ症など）に効果があります。	・患部の清潔と乾燥に心がけてください。・この薬はコンドームなどの避妊用ラテックスゴム製品に付かないように使用してください。ゴム製品が劣化し破れる場合があります。・小児の手のとどかないところに保管してください。
インテンディス株式 インテンディス株式	クリームの色：白色から僅かな黄白色チューブ表面の色：オレンジ色の帯		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1147700J1022 661140190  アデフロニックズボ 12.5 12.5 mg	1 坐剤 シートの記載：A D E F U R O N I C 1 2 . 5 m g 大洋薬品工業株式会	炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。熱を下げる作用があります。	めまいや眠気、目のかすみが起った場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。タバコ、飲酒、コーヒー類はこの薬の胃腸障害を強めるおそれがあるので、量をひかえるよう心がけてください。高温で変形があるので、15以下（なるべく冷蔵庫）で保管してください。
1147700J2029 661140193  アデフロニックズボ 25 25 mg	1 坐剤 シートの記載：A D E F U R O N I C 2 5 m g 大洋薬品工業株式会	炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。熱を下げる作用があります。	めまいやねむ気、目のかすみが起った場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。タバコ、飲酒、コーヒー類はこのくすりの胃腸障害を強めるおそれがありますので、量をひかえるようこころがけてください。高温で変形するがありますので、15以下（なるべく冷蔵庫）で保管してください。
1147700J2029 661140193  アデフロニックズボ 25 25 mg	2 坐剤 シートの記載：A D E F U R O N I C 2 5 m g 大洋薬品工業株式会 ジェイドルフ株式会	炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。熱を下げる作用があります。	めまいやねむ気、目のかすみが起った場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。タバコ、飲酒、コーヒー類はこのくすりの胃腸障害を強めるおそれがありますので、量をひかえるようこころがけてください。高温で変形するありますので、15以下（なるべく冷蔵庫）で保管してください。
2646719N1023 662640019  アドコルチンクリー ム 0.1%	1 クリーム チューブ上の記載：A - D クリーム 三共株式会社 三共株式会社	・湿疹・皮膚炎などのかゆみやはれ、熱を抑えます。・乾癬、掌蹠膿疱症を改善します。	
2646719M1028 662640020  アドコルチン軟膏 0.1%	1 軟膏剤 チューブ上の記載：A - D 三共株式会社 三共株式会社	・湿疹・皮膚炎などのかゆみやはれ、熱を抑えます。・乾癬、掌蹠膿疱症を改善します。	
2649732S1024 662640682  アドフィード 10 cm x 14 cm	1 貼付剤 (10 cm x 14 cm) リードケミカル株式 科研製薬株式会社	この薬は炎症を抑え、腫れや痛みをやわらげます。	はがれやすくなることがあるので、汗をかいたり、皮ふがぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
2655711Q1030 620000352  アトラント外用液 1%	2 液 容器の記載：S S 7 1 7 - S アトラント外用液 1 % エスエス製薬株式会 鳥居薬品株式会社	水虫やカンジダ症の原因である白癬（はくせん）菌やカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があり、水虫やカンジダ症の症状を改善します。	水虫の原因である白癬（はくせん）菌は多湿を好みます。患部に汗や脂がついたら、きれいに洗ってからよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日取り替えましょう。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2655711Q1030 620000352 アトラント外用液 1%	1 液 アトラント外用液 無色透明	・水虫やカンジダ症の原因である白癬（はくせん）菌やカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があり、水虫やカンジダ症の症状を改善します。	・水虫の原因である白癬（はくせん）菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえてください。
エスエス製薬株式会社 三菱ウェルファーマ	容器の記載：SS717 -S		
2655711N1034 620000353 アトラントクリーム 1%	1 クリーム アトラントクリーム 白色	・水虫やカンジダ症の原因である白癬（はくせん）菌やカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があり、水虫やカンジダ症の症状を改善します。	・水虫の原因である白癬（はくせん）菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえてください。
エスエス製薬株式会社 三菱ウェルファーマ	チューブの記載：SS7 17-C		
2655711N1034 620000353 アトラントクリーム 1%	2 クリーム アトラントクリーム 白色	水虫やカンジダ症の原因である白癬（はくせん）菌やカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があり、水虫やカンジダ症の症状を改善します。	水虫の原因である白癬（はくせん）菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってからよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日取り替えましょう。
エスエス製薬株式会社 鳥居薬品株式会社	チューブの記載：SS7 17-C アトラントクリーム 1%		
2655711M1039 620000354 アトラント軟膏 1% 白色～微黄色	2 軟膏 アトラント軟膏 1% 白色～微黄色	水虫やカンジダ症の原因である白癬（はくせん）菌やカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があり、水虫やカンジダ症の症状を改善します。	水虫の原因である白癬（はくせん）菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってからよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日取り替えましょう。
エスエス製薬株式会社 鳥居薬品株式会社	チューブの記載：SS7 17-O アトラント軟膏 1%		
2655711M1039 620000354 アトラント軟膏 1% 白色～微黄色	1 軟膏 アトラント軟膏 1% 白色～微黄色	・水虫やカンジダ症の原因である白癬（はくせん）菌やカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があり、水虫やカンジダ症の症状を改善します。	・水虫の原因である白癬（はくせん）菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえてください。
エスエス製薬株式会社 三菱ウェルファーマ	チューブの記載：SS7 17-O		
2259702G2021 660463003 アトロベントエロゾル 20 μg 4.2 0 mg 10 mL 帝人ファーマ株式会社 帝人ファーマ株式会社	1 エアゾール剤 アトロベントエロゾル 20 μg 4.2 0 mg 10 mL	・気管支が収縮するのを防ぎ、気管支を広げて呼吸を楽にします。	
1147700J1030 661140191 アナバン坐剤 1.2 g 5 12.5 mg 富士化学工業株式会社 興和株式会社	1 坐剤、最大径：9 mm アナバン坐剤 1.2 g 5 12.5 mg F C I 151	・慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰痛、後陣痛の炎症を抑え痛みを和らげます。 ・手術後の炎症を抑え、痛みを和らげます。 ・急性上気道炎による痛み（風邪などによる喉の痛み）を和らげ、熱を下げます。	・生活上注意することは

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1147700J2037 661140194 アナバン坐剤 25 25mg 富士化学工業株式会社 興和株式会社	1 坐剤、最大径：9mm 白～淡黄色 F C I 1 5 2	・慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰痛、後陣痛の炎症を抑え痛みを和らげます。 ・手術後の炎症を抑え、痛みを和らげます。 ・急性上気道炎による痛み（風邪などによる喉の痛み）を和らげ、熱を下げます。	・生活上注意することは
1147700J3041 661140202 アナバン坐剤 50 50mg 富士化学工業株式会社 興和株式会社	1 坐剤、最大径：10mm 白～淡黄色 F C I 1 5 3	・慢性関節リウマチ、変形性関節症、腰痛、後陣痛の炎症を抑え痛みを和らげます。 ・手術後の炎症を抑え、痛みを和らげます。 ・急性上気道炎による痛み（風邪などによる喉の痛み）を和らげ、熱を下げます。	・生活上注意することは
2646723N1046 660406001 アナミドールクリー ム 0.05% 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 クリーム剤 色：白色チューブの色： 白色（帯：橙赤色） キャップの色：紺色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646723M1040 660406002 アナミドール軟膏 0.05% 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 軟膏剤 色：白色～微黄色・半透 明チューブの色：淡青色 (帯：橙赤色) キャップ	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
1149700J1027 661140167 アネオール坐剤 50 50mg 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 坐剤（長さ約27mm） 淡黄色～淡黄かっ色 アネオール坐剤 50m g	・はれ、こわばり、痛みなどをやわらげ、炎症をおさえます。 ただ、この薬は病気の原因そのものを治すものではありません。	
1149700J2023 661140168 アネオール坐剤 75 75mg 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 坐剤（長さ約27mm） 淡黄色～淡黄かっ色 アネオール坐剤 75m g	・はれ、こわばり、痛みなどをやわらげ、炎症をおさえます。 ただ、この薬は病気の原因そのものを治すものではありません。	
2646700N1029 662640694 アフゾナクリーム 0.1% 前田薬品工業株式会 大正富山医薬品株式	1 クリーム剤 白色	・いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症をしめます。	・患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので、多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をひっかいたりして直接刺激しないことも大切です。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646700M1023 662640695 	1 軟膏剤 アフゾナ軟膏 0 . 1 %	・いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症をしめます。	・患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので、多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をひっかいたりして直接刺激しないことも大切です。
前田薬品工業株式会社 大正富山医薬品株式			
2399707D2037 660407066 	1 口腔内粘膜貼付剤 アフターシールS 5 μg	・口内炎の貼り薬です。	
帝國製薬株式会社 大正富山医薬品株式	T F - A S S		
2646717N1024 662640696 	1 クリーム アボコートクリーム 白色 0 . 1 %	湿疹、皮膚炎、かゆみ、赤みなどをおさえます。	子供の手のとどかないところに保存してください。
佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	9 1 1		
2646717M1029 662640697 	1 軟膏 アボコート軟膏 0 . 1 %	湿疹、皮膚炎、かゆみ、赤みなどをおさえます。	子供の手のとどかないところに保存してください。
佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	9 1 0		
2649717M1020 662640021 	1 軟膏 アミノ安息香酸エチル軟膏「マルイシ」 10 %	・この薬は傷、やけど、日焼け、ただれている部分、痔（じ）の痛みを止めたり、かゆみを抑える働きがあります。	・口に入れたり飲むことはやめてください。・目には使用しないでください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	9 1 0		
6250700N1036 660453001 	1 クリーム剤 アラセナ - A クリー クリーム剤の色 : 白色 3 %	病気の原因であるウイルスの増殖を抑制し、皮膚症状を改善します。	・本剤の基剤として使用されている油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化させ、破損する可能性があるため、これらとの接触を避けて下さい。
持田製薬株式会社 持田製薬株式会社	アラセナ - A クリーム 3 % M O 2 0 C 外用薬		
6250700M1022 666250001 	1 軟膏剤 アラセナ - A 軟膏 3 %	病気の原因であるウイルスの増殖を抑制し、皮膚症状を改善します。	
持田製薬株式会社 持田製薬株式会社	チューブの記載 : M O 2 0 8 外用薬		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2649718M1025 3 軟膏 662640469 アラントロックス軟 白色不透明 膏 2 % 大洋薬品工業株式会 大洋薬品工業株式会	床ずれ、やけどなどの皮膚症状 (潰瘍)の治りをよくします。	目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。
	2649718M1025 1 軟膏 662640469 アラントロックス軟 白色不透明 膏 2 % 大洋薬品工業株式会 丸石製薬株式会社	床ずれ、やけどなどの皮膚症状 (潰瘍)の治りをよくします。	目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。
	2649718M1025 2 軟膏 662640469 アラントロックス軟 白色不透明 膏 2 % 大洋薬品工業株式会 丸石製薬株式会社	・この薬は傷ついた皮膚を取り除き、新しい皮膚をつくる働きがあります。	
	2649718M1033 1 軟膏剤 662640022 アルキサ軟膏 2 % 白色 小林化工株式会社 小林化工株式会社	湿疹、外傷・やけどによる皮膚のただれや潰瘍をなおします。	目に入らないように注意してください。化粧下やひげそり後などに化粧用として使用しないでください。直射日光を避けて、室温(30以下)で保存してください。使用後は必ずキャップをよくしめて下さい。子どもの手の届かないところに置いてください。
	2649718M1033 2 軟膏剤 662640022 アルキサ軟膏 2 % 白色 小林化工株式会社 メルク・ホエイ株式	湿疹、外傷・やけどによる皮膚のただれや潰瘍をなおします。	目に入らないように注意してください。化粧下やひげそり後などに化粧用として使用しないでください。直射日光を避けて、室温(30以下)で保存してください。使用後は必ずキャップをよくしめて下さい。子どもの手の届かないところに置いてください。
	2649718M1033 3 軟膏剤 662640022 アルキサ軟膏 2 % 白色 小林化工株式会社 ナガセ医薬品株式会	湿疹、外傷・やけどによる皮膚のただれや潰瘍をなおします。	目に入らないように注意してください。化粧下やひげそり後などに化粧用として使用しないでください。直射日光を避けて、室温(30以下)で保存してください。使用後は必ずキャップをよくしめて下さい。子どもの手の届かないところに置いてください。
	2649718M1033 4 軟膏 662640022 アルキサ軟膏 2 % 白色 小林化工株式会社 メルク・ホエイ株式	床ずれ、やけどなどの皮膚症状 (潰瘍)の治りをよくします。	床ずれは、体位変換、清潔、マッサージ、栄養補給などのケアが大切です。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1319717Q1162 660453002 アルギノン点眼液 100mg 5mL 東亜薬品株式会社 日東メディック株式会社	1 点眼液 (5mL プラスティック容器) 点眼剤の色：無色～微黄色 透明キャップの色：白色	・アレルギー性結膜炎、春季タルの現れた症状をやわらげます。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 1329702R3020 660406005 アルデシンA Q ネーザル 8.5mg 8.5g シェーリング・プラウ シェーリング・プラウ	1 定量噴霧式懸濁剤 キャップはえんじ色	・この薬は、鼻の炎症を抑えることにより、鼻症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど)の程度や頻度を軽減します。 ・この薬は点鼻してすぐに鼻症状を軽減する薬ではありません。	・生活上注意することは
 1141700J2092 660454001 アルピニー坐剤 10 0 100mg エスエス製薬株式会社 株式会社三和化学研	1 坐剤 アルピニー坐剤 100 0 00mg	・子どもの熱をさげる薬です。	
 1149701J1080 660407069 アルビラック坐剤 20mg	1 坐剤 アルビラック坐剤 白色 20mg	炎症をしずめ、痛みをやわらげる作用があります。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。	薬が外に出ないようにするため、挿入後はしばらく運動を避けてください。
大洋薬品工業株式会			
 2691700N1040 620000355 アルファタカシルク リーム 2μg 0.002%	1 乳剤性軟膏剤 白色	・皮膚が赤くなつて盛り上がり、その表皮が銀白色の細かい角質片で覆われ、フケのようにボロボロむけてくる皮膚病や、足の裏および手のひらに水虫が化膿したような発疹が出る皮膚病に効果があります。	
 2691700M1045 620000356 アルファタカシル軟膏 2μg 0.02%	1 軟膏剤 白色～微黃白色	・皮膚が赤くなつて盛り上がり、その表皮が銀白色の細かい角質片で覆われ、フケのようにボロボロむけてくる皮膚病や、足の裏および手のひらに水虫が化膿したような発疹が出る皮膚病に効果があります。	
 1329702R3101 660463004 アルベジン点鼻液 0.1% 8.5mL 大洋薬品工業株式会社 大洋薬品工業株式会社	1 外用液剤 キャップの色：えんじ色	この薬は、鼻の炎症をおさえることにより、鼻炎の症状が起こるのを防ぎます。しかし、この薬は鼻炎の原因を治す薬ではありません。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646727M1022 662640683  アルメタ軟膏 0.1%	1 軟膏	皮膚の炎症(かゆい、赤くはれる等の症状)を改善する塗り薬です。	温度の高くなる所に保管しないで下さい。小児の手の届かない所に保管して下さい。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	商品名等:チューブに印刷		
1329702R3047 660422003  アルロイヤーナーザ ル 8.5mg 8.5g	1 定量噴霧式懸濁剤	・鼻内の炎症や腫れを抑える働きがあり、くしゃみ、鼻汁及び鼻閉の症状を改善します。 ・識別コード:該当せず ・シート記載:該当せず	この薬を使うことで特に注意することはあります。
1329702R3047 660422003  アルロイヤーナーザ ル 8.5mg 8.5g 大正薬品工業株式会社 武田薬品工業株式会社	2 定量噴射式懸濁剤	・この薬はくしゃみ、鼻汁及び鼻閉の症状を改善します。	
1319735Q1020 660407001  アレギサール点眼液 5mg 5mL	1 点眼剤(5mLプラスチック容器)	・アレルギー性結膜炎、春季タルの症状の発現を予防し、また発現した症状をやわらげます。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	アレギサール点眼液 5mg 5mL	点眼剤の色:無色透明 キャップの色:青色	
1319736Q1041 620000357  アレニスト点眼液 0.5% 2.5mg 5mL 東亜薬品株式会社 日東メディック株式会社	1 点眼液(5mLプラスチック容器)	・アレルギー性結膜炎の現れた症状をやわらげます。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
2259801X1029 662220013  アレペール 0.1% 2.5% アルフレッサファー アルフレッサファー	1 水溶液	・吸入用呼吸器官用剤の溶解剤です。	開封後は冷蔵庫内(冷凍不可)で保存し、なるべく速やかに使用してください。目安として7日以内に使用してください。ただし7日以内でも着色や浮遊物の認められた場合は使用しないでください。
2252703G1029 662220014  アロテック吸入液 2% 日本ベーリンガーイ 日本ベーリンガーイ	1 吸入液	・気管支を広げて、呼吸を楽にします。	・生活上注意することは

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2679701Q1020 662670003 アロピックス 5 %	液剤 緑色	頭の皮ふや白斑のできている皮ふの血管を広げて血液の流れをよくするはたらきで、脱毛や白斑を良くします。	・生活上注意することは、湯上がりのあとは、注意して少量を使用してください。
長生堂製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	S - A V		
2646729N1035 660444007 アロミドンクリーム 0 . 3 %	クリーム剤 色：白色～微黄白色 チューブの色：白色 (帯：黄色)キャップの	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2646729N1035 660444007 アロミドンクリーム 0 . 3 %	クリーム剤 色：白色～微黄白色 チューブの色：白色 (帯：黄色)キャップの	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2646729M1030 660444008 アロミドン軟膏 0 . 3 %	軟膏剤 色：白色～微黄色・半透明 チューブの色：淡青色 (帯：黄色)キャップの	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2171700S1087 660433004 アンタップR mg	テープ剤 (短径 3 . 7 cm × 長径 5 . 7 cm) 40 白色	皮膚を通して吸収し、心臓へ酸素や栄養を供給している冠状動脈を広げて心筋への血流量を増加させることで、心臓の機能を改善します。	急に起き上がると気持ちが悪くなったり、めまい、頭痛がおきることがありますのでご注意ください。 注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起きることがあるので、このような場合には車の運転や機械の操作には注意してください。 飲酒すると血圧が低下(めまい、ふらつき等)することがあるので注意してください。 勃起不全の治療薬(バイアグラ錠やレビトラ錠)を飲まないでください。
帝三製薬株式会社 帝人ファーマ株式会社	T J N - 0 7 2		
2646730N1020 662640896 アンテベートクリー ム 0 . 0 5 %	クリーム チューブの記載：T O - 1 8 6 C アンテベートクリーム	外用のステロイド剤です。皮ふの炎症をおさえる働きがあり、発赤(ほっせき：皮ふが赤くなる)、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹(しつしん)や皮ふ炎、虫さされなどの治療に用います。	
鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社			
2646730M1024 662640897 アンテベート軟膏 0 . 0 5 %	軟膏 チューブの記載：T O - 1 8 6 O アンテベート軟膏	外用のステロイド剤です。皮ふの炎症をおさえる働きがあり、発赤(ほっせき：皮ふが赤くなる)、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹(しつしん)や皮ふ炎、虫さされなどの治療に用います。	
鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 2646730Q1026 660463005 アンテベートローション0.05% 鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社	1 ローション 白色 容器の記載：アンテベートローション0.05%	外用のステロイド剤です。皮膚の炎症をおさえる働きがあり、発赤（ほっせき：皮膚が赤くなる）、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹（しつしん）や皮膚炎、虫さされなどの治療に用います。	
 2646730N1046 660453003 アンフラベート0.05%クリーム 前田薬品工業株式会社 佐藤製薬株式会社	1 クリーム 白色 前田薬品工業株式会社 佐藤製薬株式会社	湿疹、皮膚炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮膚の炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。	子供の手のとどかないところに保存してください。
 2646730M1040 660453004 アンフラベート0.05%軟膏 前田薬品工業株式会社 佐藤製薬株式会社	1 軟膏 白色 前田薬品工業株式会社 佐藤製薬株式会社	湿疹、皮膚炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮膚の炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。	子供の手のとどかないところに保存してください。
 2649725N1039 662640597 アンホリルクリーム 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 クリーム剤 色：白色チューブの色：白色（帯：濃黄緑色）キャップの色：淡青色 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
 2649725M1033 662640598 アンホリル軟膏 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 軟膏剤 色：乳白色チューブの色：淡青色（帯：濃黄緑色）キャップの色：淡青 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、痒みなどの症状をとります。・火傷の症状をやわらげる働きもあります。	
 2643700X1125 662640026 アンモニア水 無し 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	2 液剤 無色透明 無し 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	虫さされのお薬です。	1. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療をうけて下さい。2. 粘膜、傷のある所、ただれたり、かぶれています所には使用しないで下さい。3. ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないで下さい。4. なるべく蒸気を吸入しないように注意して下さい。
 2643700X1125 662640026 アンモニア水 無色透明 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 液剤 無色透明 無し 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・消炎作用により虫さされによるはれをおさえます。	
		本体識別コード：包装識別コード：	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2643700X1150 660421074 アンモニア水(丸石)	1 液体 無色透明	・この薬は虫さされに使用します。 ・この薬は痰をきれやすくするお薬を作るために使用します	
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2649893S1037 660453005 イージープラスター c m x 1 0 c m	1 貼付剤 7 ベージュ色	・ねんざ、だぼく、筋肉、関節、骨折の痛みやはれをおさえます。	・開封後は袋の切り口を折り曲げて保管してください。・直射日光、高温の場所をさけて保管してください。・小児の手の届かない所に保管してください。
ニチバン株式会社 大鵬薬品工業株式会社	アルミ袋の記載:イージープラスター N B 2 0 1		
2669700X1024 662660001 イオウ・カンフルローション	1 懸濁液 淡黄色	・この薬はにきびなどを治す働きがあります。	・開封後はふたをして、冷蔵庫など涼しいところで保存してください。・化粧品やほかのものが混ざらないようにしてください。
丸石製薬株式会社			
2260701F1174 660407071 イオダインガーグル液 7 %	1 液剤 無し	のどや口の中の細菌、真菌、ウイルスを殺す働きがあります。	1. 衣類等に付いた場合は、水で洗い落として下さい。2. 銀を含有する歯科材料を変色することがあります。
健栄製薬株式会社 健栄製薬株式会社			
2649718L1020 662640472 イソラボン 6 %	1 散剤(外用) 白色	・傷口の組織の再生を助け、分泌物を吸着させる働きがあり、床ずれ、やけど、手術後の傷口を治します。	この薬を使うことで特に注意することはできません。
あすか製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・識別コード:該当せず ・シート記載:該当せず		
2612701Q3024 662610029 イソジン液 1 0 %	1 液剤 黒褐色(特異なにおいを有する)	・キズや火傷の皮膚などの細菌、真菌、ウイルスを消毒する薬です。	・塗布後は乾燥させてください。・目に入らないように注意してください。入った場合は、水でよく洗い流してください。・衣服等についてしまった場合は、水で洗ってください。・直射日光を避けて保存してください。
明治製菓株式会社 明治製菓株式会社			
2260701F1026 662230003 イソジンガーグル 7 %	1 液 液体の色:黒褐色・透明(特異な芳香がある)	・のどや口の中の細菌、真菌、ウイルスを消毒する薬です。	・あやまってのんでしまった場合は、コップ1杯の牛乳が卵白の水割りをのんでください。・衣服等についてしまった場合は、水で洗ってください。・眼に入らないように注意してください。入った場合には、水でよく洗い流してください。・銀を含む義歯(入れ歯)が着色することがあります。・直射日光を避けて保存してください。
明治製菓株式会社 明治製菓株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2612701Q2028  662610028 イソジンゲル 10% 明治製菓株式会社 明治製菓株式会社	1 軟膏剤 褐色(わずかに特異なにおいがある)	・キズや火傷の皮膚などの細菌、真菌、ウイルスを消毒する薬です。	・衣服等についてしまった場合は、水で洗ってください。
2699801V1092  620000358 イソジンシュガーパスター 日東メディック株式 明治製菓株式会社	1 軟膏剤 褐色(わずかに特異なにおい)	・創傷治癒作用、殺菌作用があり褥瘡(とこずれ)、皮膚潰瘍の治癒を促進させます。	・目に入らないように注意してください。入った場合は、水でよく洗い流してください。・衣服等についてしまった場合は、水で洗ってください。・直射日光を避けて保存してください。・小児の手の届かない所に保管してください。
2171700S1052  662170018 イソピット 40m 東光薬品工業株式会社 日本シェーリング株	1 テープ剤(5.5mm×5.5mm) イソピット 40m テープの色: 淡い褐色 テープ裏面の記載: TO K O 5 0 1	・この薬は皮膚を通して吸収され、心臓に酸素や栄養を補給している心臓の血管を広げる薬です。全身の血管の抵抗を減らして心臓の負担を軽くする作用があります。・狭心症の発作(胸が重苦しくて圧迫感があったり、締め付けられるような胸の痛み)の予防や治療に使いま	・この薬を貼っているときにお酒を飲まないでください。急な血圧の低下が起こることがあります。・この薬を貼って頭痛や血圧の低下が起こることがあります。そのため注意力や集中力が低下したり、とっさの反応がにぶくなることがあるので、自動車の運転や高い所での作業、危険を伴う機械の操作などはしないでください。・小児の手のとどかないところに保管してください。
2615701Q2020  662610268 イソプロ-70 70% 無色澄明 東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式	1 液 イソプロパノール 無色澄明	・手指・皮膚の消毒をします。 ・医療用具の消毒をします。	
2615700X1155  662610031 イソプロパノール 無色澄明 東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式	1 液 イソプロパノール 無色澄明	・手指・皮膚の消毒をします。 ・医療用具の消毒をします。	
2615700X1120  662610031 イソプロパノール 無色澄明 日本新薬株式会社	3 液剤 イソプロパノール 無色澄明	・殺菌消毒剤です。	
2615700X1155  662610031 イソプロパノール 無色澄明 東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式	2 液 イソプロパノール 無色澄明	・手指・皮膚の消毒をします。 ・医療用具の消毒をします。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2615700X1066 660431025 イソプロパノール O.I.	1 液剤 	・手指・皮膚の消毒に用います。 ・医療用具の消毒に用います。	・火気厳禁（引火性および爆発性がありますので、火気には十分注意して下さい。）・蒸気を吸入しないようにして下さい。 ・傷のある皮膚や粘膜に使用すると、刺激感がありますので使用しないで下さい。 ・しっかり栓をして、光が当たらないように保存して下さい。
岩城製薬株式会社			
2649719N1025 662640599 イドメシンコーウク リーム 1%	1 軟膏剤 	肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みを和らげます。 外傷後のはれ、痛みを和らげます。	・生活上注意することは 衣類、装身具などに付着すると汚れなどの原因となることがあります。
興和株式会社 興和株式会社	7 1 5		
2649719M1046 662640032 イドメシンコーウグ ル 1%	1 軟膏剤 	肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みを和らげます。 外傷後のはれ、痛みを和らげます。	・生活上注意することは 衣類、装身具などに付着すると汚れなどの原因となることがあります。
興和株式会社 興和株式会社	7 1 0		
2649719Q1021 662640474 イドメシンコーウゾ ル 1%	1 外皮用液剤 	肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みを和らげます。 外傷後のはれ、痛みを和らげます。	・生活上注意することは 衣類、装身具などに付着すると汚れなどの原因となることがあります。
興和株式会社 興和株式会社	6 1 0		
2649719S1029 662640743 イドメシンコーウ パップ 10 cm x 14 cm	1 パップ剤 (10 × 14 c m) 	肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みを和らげます。 外傷後のはれ、痛みを和らげます。	・生活上注意することは 衣類、装身具などに付着すると汚れなどの原因となることがあります。
ティカ製薬株式会社 興和株式会社	I D P		
2646721N1055 660433008 イトロンクリーム 0.1%	1 クリーム剤 	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	色：白色チューブの色： 白色（帯：青色）キャップ の色：薄紫色		
2646721M1041 660433009 イトロン軟膏 1%	1 軟膏剤 	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	色：白色～微黄色・半透 明チューブの色：淡青色 (帯：青色) キャップの		



薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2259700G1026 662220015 	1 液剤 イノリン吸入液 0.5%	気管支をひろげて呼吸を楽にさせます。	・生活上注意することは
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			
2649728N1040 620002302 	1 クリーム イプロニンクリーム 5%	・非ステロイド系の消炎・鎮痛外用剤です。・皮膚の炎症をやわらげる働きがあり、湿疹、皮膚炎やにきびの治療に用います。・痛みをやわらげる作用もあり、帯状疱疹の治療に用います。	・この薬は、光のあたらない場所に保管してください。
辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社			
2649728M1045 620002303 	1 軟膏剤 イプロニン軟膏 5%	・非ステロイド系の消炎・鎮痛外用剤です。・皮膚の炎症をやわらげる働きがあり、湿疹、皮膚炎の治療に用います。・痛みをやわらげる作用もあり、帯状疱疹の治療に用います。	・この薬は、光のあたらない場所に保管してください。
辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社			
2619702Q1183 660412007 	1 液剤 イワコールE 5%	・皮膚の消毒に用います。・医療用具の消毒に用います。	・火気厳禁（引火性、爆発性がありますので、火気には十分注意して下さい。）・蒸気を吸い込まないようにして下さい。・衣類などに本剤が付着したまま塩素系の漂白剤を使用しますと、褐色のシミが出来る場合がありますので、漂白剤は酸素系にして下さい。・栓をして、直射日光が当たらないように保存して下さい。
山田製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2649726M1054 660412008 	1 軟膏剤 イワザック軟膏 3%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。・やけどの症状をやわらげる働きもあります。・褥瘡の治療にも用います。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2649726M1054 660412008 	2 軟膏剤 イワザック軟膏 3%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。・やけどの症状をやわらげる働きもあります。・褥瘡の治療にも用います。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2699801V1041 660433011 	1 散剤 イワデクト 淡黄褐色	・床ずれなどの皮膚の潰瘍に用います。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2359800J1051 620002304 	1 坐剤 (全長30mm) インカルボン坐剤 淡黄白色	直腸の中で徐々に炭酸ガスを発生させ、生理的な排便作用をうながす便秘治療剤です。	食事に気をつけ、規則正しい排便の習慣を心がけてください。
大洋薬品工業株式会 大洋薬品工業株式会			
2259701A1028 662220016 	1 カプセル (吸入用) インターレ 20mg うすいだいだい色透明 / 無色透明	・気管支喘息およびアレルギー性鼻炎の発現を予防し、また症状があらわれても軽度に抑えます。この薬を定期的に吸入することによって症状の発現が少なく軽くなってきます。	
藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式	(表面)のまないこと インターレ 20mg(裏面) インターレ 20mg ア		
2259701A1028 662220016 	2 カプセル (吸入用) インターレ 20mg うすいだいだい色透明 / 無色透明	・気管支喘息およびアレルギー性鼻炎の発現を予防し、また症状があらわれても軽度に抑えます。この薬を定期的に吸入することによって症状の発現が少なく軽くなってきます。	
アステラス製薬株式 アステラス製薬株式	(表面)のまないこと インターレ 20mg(裏面) インターレ 20mg ア		
2259701R2028 660444010 	2 定量噴霧式エアゾール剤 インターレエアロゾル A 2% 10mL	・気管支喘息の発現を予防し、また症状が現われても軽度に抑えます。この薬を定期的に吸入することによって症状の発現が少なく軽くなってきます。	
アステラス製薬株式 アステラス製薬株式	喘息治療剤 インターレエアロゾル A (クロモグリク酸ナトリウムエア		
2259701R2028 660444010 	1 定量噴霧式エアゾール剤 インターレエアロゾル A 2% 10mL	・気管支喘息の発現を予防し、また症状が現われても軽度に抑えます。この薬を定期的に吸入することによって症状の発現が少なく軽くなってきます。	
藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式	喘息治療剤 インターレエアロゾル A (クロモグリク酸ナトリウムエア		
2259701G1020 662220017 	2 液 (吸入用) インターレ吸入液 1% 2mL	・気管支喘息の発現を予防し、また症状が現われても軽度に抑えます。この薬を定期的に吸入することによって症状の発現が少なく軽くなってきます。	
アステラス製薬株式 アステラス製薬株式			
2259701G1020 662220017 	1 液 (吸入用) インターレ吸入液 1% 2mL	・気管支喘息の発現を予防し、また症状が現われても軽度に抑えます。この薬を定期的に吸入することによって症状の発現が少なく軽くなってきます。	
藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319717Q1022 661310197 	2 点眼液 インタール点眼液 100mg 5mL	無色～微黄色透明	・アレルギー性結膜炎、春季力 タルの発症を予防し、また症状 があらわれても軽度に抑えま す。この薬を定期的に点眼する ことによって症状の発現が少な く軽くなってきます。
藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式			
1319717Q1022 661310197 	1 点眼液 インタール点眼液 100mg 5mL	無色～微黄色透明	・アレルギー性結膜炎、春季力 タルの発症を予防し、また症状 があらわれても軽度に抑えま す。この薬を定期的に点眼する ことによって症状の発現が少な く軽くなってきます。
アステラス製薬株式 アステラス製薬株式			
1319717Q2029 660407015 	2 点眼液 インタール点眼液 D 7mg 0.35 mL	無色～微黄色透明	アレルギー性結膜炎、春季カタ ルの発症を予防し、また症状が 現わっても軽度に抑えます。こ の薬を定期的に点眼することに よって症状の発現が少なく軽く なってきます。
藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式			
1319717Q2029 660407015 	1 点眼液 インタール点眼液 D 7mg 0.35 mL	無色～微黄色透明	アレルギー性結膜炎、春季カタ ルの発症を予防し、また症状が 現わっても軽度に抑えます。こ の薬を定期的に点眼することに よって症状の発現が少なく軽く なってきます。
アステラス製薬株式 アステラス製薬株式			
1329700Q1023 661320003 	2 外用液剤（鼻用定量噴霧 式吸入剤） インタール点鼻液 190mg 9.5m L	無色～微黄色透明	・アレルギー性鼻炎の発症を予 防し、また症状があらわれても 軽度に抑えます。この薬を定期 的に点鼻することによって症状 の発現が少なく軽くなってきま す。
アステラス製薬株式 アステラス製薬株式			
1329700Q1023 661320003 	1 外用液剤（鼻用定量噴霧 式吸入剤） インタール点鼻液 190mg 9.5m L	無色～微黄色透明	・アレルギー性鼻炎の発症を予 防し、また症状があらわれても 軽度に抑えます。この薬を定期 的に点鼻することによって症状 の発現が少なく軽くなってきま す。
藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式			
1145700J2059 661140214 	1 坐剤 インダシン坐剤 2.5mg	帯黄白色 インダシン 2.5 (黄緑 色)	炎症や痛みをやわらげます。ま た手術後の炎症やはれをやわら げます。（ただし、病気の原因 そのものを治すものではありません。）
万有製薬株式会社			・生活上注意することは この 薬は眠気、めまい、ふらつき感 などがあらわれることがありま すので十分注意してください。 もしその症状があらわれた時に は自動車の運転など危険を伴う 機械の操作等はしないようにし てください。この薬は包装さ れたまま冷蔵庫など（光の当た らない涼しい所）に保存してく ださい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1145700J3080 661140240 インダシン坐剤 50 50mg 	1 坐剤 インダシン 50 (紺色) 万有製薬株式会社	炎症や痛みをやわらげます。また手術後の炎症やはれをやわらげます。(ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。)	・生活上注意することは この薬は眠気、めまい、ふらつき感などがあらわれることがありますので十分注意してください。もしその症状があらわれた時には自動車の運転など危険を伴う機械の操作等はしないようにしてください。この薬は包装されたまま冷蔵庫など(光の当たらない涼しい所)に保存してください。
1145700J2067 661140215 インテダール 25 25mg 	1 坐剤 インテダール 25 白色~淡黄色 I T D 25mg	・手術後、外傷後の炎症やはれをやわらげます。(手術後の炎症及び腫脹の緩解)・炎症や痛みをやわらげます。(慢性関節リウマチ、変形性関節症)	ねむけ、注意力や集中力の低下が起こることがあるので、このような場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作は避けて下さい。
1145700J3098 661140241 インテダール 50 50mg 	1 坐剤 インテダール 50 白色~淡黄色 I T D 50mg	・手術後、外傷後の炎症やはれをやわらげます。(手術後の炎症及び腫脹の緩解)・炎症や痛みをやわらげます。(慢性関節リウマチ、変形性関節症)	ねむけ、注意力や集中力の低下が起こることがあるので、このような場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作は避けて下さい。
2649719Q2044 662640476 インテバン外用液 1% 	1 挥発性の外用液 インテバン外用液 黄色澄明 大日本住友製薬株式 識別コード: #302 (容器に記載) 大日本住友製薬株式	炎症や痛みをやわらげます。また、外傷後のはれや痛みをやわらげます。(変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛)	
2649719N1033 662640475 インテバンクリーム 1% 	1 クリーム剤 インテバンクリーム 白色~帯黄白色 大日本住友製薬株式 識別コード: #304 (チューブに記載) 大日本住友製薬株式	炎症や痛みをやわらげます。また、外傷後のはれや痛みをやわらげます。(変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛)	
1145700J2075 661140216 インテバン坐剤 25 25mg 	1 効型:坐剤 インテバン坐剤 25 白色~淡黄色 大日本住友製薬株式 識別コード: INT E B ANS upp 25 大日本住友製薬株式	手術後、外傷後の炎症やはれをやわらげます。(手術後の炎症及び腫脹の緩解)・炎症や痛みをやわらげます。(慢性関節リウマチ、変形性関節症)	ねむけ、注意力や集中力の低下が起こがあるので、このような場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作は避けて下さい。
1145700J3101 661140242 インテバン坐剤 50 50mg 	1 効型:坐剤 インテバン坐剤 50 白色~淡黄色 大日本住友製薬株式 識別コード: INT E B ANS upp 50 大日本住友製薬株式	手術後、外傷後の炎症やはれをやわらげます。(手術後の炎症及び腫脅の緩解)・炎症や痛みをやわらげます。(慢性関節リウマチ、変形性関節症)	ねむけ、注意力や集中力の低下が起こるので、このような場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作は避けて下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649719M1070  662640035 インテバン軟膏 1%	1 ゼリー状の軟膏、 黄色、 大日本住友製薬株式 識別コード：# 302 (チューブに記載) 大日本住友製薬株式	炎症や痛みをやわらげます。 また、外傷後のはれや痛みをやわらげます。（変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛）	
1145700J2083  661140217 インデラニック坐剤 25 25mg	1 坐剤 I M - 2 5	炎症や痛みをやわらげます。また手術後の炎症やはれをやわらげます。	薬が外に出ないようにするため、挿入後はしばらく運動をさせてください。眠気、注意力や集中力の低下が起こることがあるので、そのような場合には車の運転や危険を伴う機械の操作はさせてください。
1145700J3110  661140243 インデラニック坐剤 50 50mg	1 坐剤 I M - 5 0	炎症や痛みをやわらげます。また手術後の炎症やはれをやわらげます。	薬が外に出ないようにするため、挿入後はしばらく運動をさせてください。眠気、注意力や集中力の低下が起こることがあるので、そのような場合には車の運転や危険を伴う機械の操作はさせてください。
2649719M1089  662640601 インデラニック軟膏 1%	1 軟膏 I M - O	チューブのラベル記載： 炎症や痛みをやわらげます。また、外傷後のはれや痛みをやわらげます。	キャップをしっかりと閉めて、火気をさせて保存してください。
2649719N1050  662640702 インドメクリーム 1%	1 クリーム剤 I M - I D C	白色～黄色をおびた白色	・筋肉や関節のはれや痛みをやわらげます。また、外傷後のはれや痛みをやわらげます。
1319721Q1029  661310216 インドメロール点眼液 0.5%	1 点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：白色	チューブ記載：S W - I D C	・白内障手術後の炎症を防止したり、合併症が起こるのを防止します。
2649719Q2060  662640604 インナミット液 1%	1 外用液 黄色澄明	日医工株式会社 日医工株式会社	・肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みをやわらげます。・外傷後のはれや痛みをやわらげます。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649719N1068 662640602 インナミットクリー △ 1 %	1 クリーム 白色	・肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みをやわらげます。・外傷後のはれや痛みをやわらげます。	
日医工株式会社 日医工株式会社			
2649719M1100 662640603 インナミットゲル 1 %	1 ゼリー状の親水性軟膏 黄色	・肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みをやわらげます。・外傷後のはれや痛みをやわらげます。	
日医工株式会社 日医工株式会社			
2646701S3038 660422006 インファナル 4.5mg 7.5cm × 10cm 久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	1 貼付剤(はりぐすり) 白色～うすい黄白色	・このくすりは皮ふの炎症(かゆみ、はれなどの症状)を抑えるはり薬です。	
日新製薬株式会社 (識別コード: IM25 メルク・ホエイ株式	薬袋の記載: HP360 P		
1145700J2199 661140228 インメシン坐剤 2.5 2.5mg	1 坐剤	炎症や痛みをやわらげます。また手術後の炎症やはれをやわらげます。(ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。)	・生活上注意することはこの薬は眠気、めまい、ふらつき感などがあらわれることがありますので十分注意してください。もしその症状があらわれた時には自動車の運転など危険を伴う機械の操作等はしないようにしてください。この薬は包装されたまま冷蔵庫など(光の当たらぬ涼しい所)に保存してください。
日新製薬株式会社 (識別コード: IM50 メルク・ホエイ株式			
1145700J3233 661140255 インメシン坐剤 5.0 5.0mg	1 坐剤	炎症や痛みをやわらげます。また手術後の炎症やはれをやわらげます。(ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。)	・生活上注意することはこの薬は眠気、めまい、ふらつき感などがあらわれることがありますので十分注意してください。もしその症状があらわれた時には自動車の運転など危険を伴う機械の操作等はしないようにしてください。この薬は包装されたまま冷蔵庫など(光の当たらぬ涼しい所)に保存してください。
日新製薬株式会社 (識別コード: IM50 メルク・ホエイ株式			
1145700J3233 661140255 インメシン坐剤 5.0 5.0mg	2 坐剤	炎症やはれ、関節の痛みをやわらげます。(ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。)	・ねむけ、めまい、ふらつき感がおこることがありますので、自動車の運転など危険をともなう機械の作業はさけてください。
	IM50(ヒートシール)		
2619716Q1126 660422007 ウスノン液 10% 帯黄色	1 液剤	・手指や皮膚の消毒に用います。また、傷口の皮膚の消毒に用います。・器具の消毒に用います。	・他の消毒剤と混ざると沈殿が生じたりしますので、注意して下さい。・低温で少し濁つたりする時がありますが、消毒効果に変わりはありません。
山田製薬株式会社 岩城製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1312704Q1024 661310029 ウブレチド点眼液 0.5%	1 点眼液 無色透明	眼圧を低下させ、緑内障（りょくないしょう）の症状を改善します。	この薬を点眼すると、視野が暗くなったり、せまくなったりすることがあります。
鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社			
1312704Q2020 661310030 ウブレチド点眼液 1%	1 点眼液 無色透明	まぶたの筋肉の働きを強め、眼筋（がんきん）型の重症筋無力症における症状を改善します。縮瞳（しゅくどう）を起こし、調節性内斜視（ないしゃし）の症状を改善します。眼圧を低下させ、緑内障（りょくないしょう）の症状を改善します。	この薬を点眼すると、視野が暗くなったり、せまくなったりすることがあります。
鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社			
2669701N2032 620000359 ウレアクリーム20%「イワキ」	1 クリーム剤 色：白色～微黄色チューブの色：白色（帯：淡青色）キャップの色：白色	・皮膚の乾燥を防ぎ、また乾燥して硬くなった皮膚をやわらかくします。	・金属と接触すると、着色することがあります。また、ステンレスが錆びることもあります。
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2669701M1030 662660002 ウレバール 10% 白色	1 軟膏剤 皮膚の乾燥を防ぎ、角質をやわらかくする外用薬です。	皮膚の乾燥を防ぎ、角質をやわらかくする外用薬です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。
株式会社大塚製薬工 大塚製薬株式会社			
2669701Q1032 660406169 ウレバールL 0%	1 乳剤性ローション剤 白色	皮膚の乾燥を防ぎ、角質をやわらかくする外用薬です。	皮膚の乾燥を防ぎ、角質をやわらかくする外用薬です。
株式会社大塚製薬工 識別コード： 大塚製薬株式会社			
2651701X1024 662650009 ウンデシレン酸亜鉛 白色「マルイシ」	1 粉末 白色	・この薬は水虫、たむし、はたけ、いんきんなどを治療する働きがあります。	・この薬は水虫、たむし、はたけ、いんきんなどを治療する働きがあります。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2651700X1020 662650008 ウンデシレン酸「マルイシ」	1 液体または固体 液剤：微黄色～黄色（2以上）固体：白色～黄白色（2以下）	・この薬は水虫、たむし、はたけ、いんきんなどを治療する働きがあります。	・この薬は水虫、たむし、はたけ、いんきんなどを治療する働きがあります。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649851R1023 662640040 エアーサロンバス	1 エアゾール噴霧剤(100ml) 噴霧液微黄色	・噴霧した部位の皮ふから薬物が吸収され、関節や筋肉の痛みをやわらげます。	薬が家具、皮革製品、化成品などにふれると、変質又は変色するおそれがあります。缶のさびによる破裂を防ぐため、水まわり、湿気の多い場所に置かないでください。捨てるときは火気のない屋外でガスを抜いてください。
久光製薬株式会社 久光製薬株式会社			
2647701R1022 662640837 エアゾリンD 1	1 エアゾール 振り混ぜると白色の懸濁液	・副腎皮質ホルモンと抗生物質を配合した外用薬です。 ・湿しんや皮ふ炎や虫さされなどの患部に直接噴霧して治療します。	
武田薬品工業株式会社 武田薬品工業株式会社			
2649852M1020 662640043 エキザルベ	1 軟膏 うすい黄色	・使用部位の炎症を抑え、感染を防ぐ作用があり、湿しん、皮膚炎、やけどの発赤、腫れ、かゆみなどの症状を軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。 ・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。
マルホ株式会社 マルホ株式会社	チューブの記載：エキザルベ		
2619705X1238 662610470 液状フェノール(日興製薬)	1 液体 無色またはわずかに赤色	・この薬は手指・皮膚、医療用具、部屋・家具・器具・物品、排泄物などを消毒します。 ・この薬はかゆみを抑える働きがあります。	・必ず薄めて使用してください。 ・口に入れたり飲むことはやめてください。また、他の人が飲むこともないように十分注意して保管、取り扱いしてください。 ・原液や高濃度液が皮膚についた場合には刺激を起こすので、すぐに拭き取り、水などで洗い流してください。 ・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください
日興製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2655707N1020 662650068 エクセルダームクリーム 1%	1 クリーム 白、青色のリング模様	水虫類(皮ふ糸状菌)などに殺菌的に作用し、発赤、はれ、かゆみの症状をとります。水虫(足白癬)、いんきん(股部白癬)、たむし(体部白癬)、皮ふカンジダ症、黒なます(癪風)などに効果を有します。	・生活上注意することは
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			
2655707Q1026 662650069 エクセルダームソリューション 1%	1 ソリューション 青色	水虫類(皮ふ糸状菌)などに殺菌的に作用し、発赤、はれ、かゆみの症状をとります。水虫(足白癬)、いんきん(股部白癬)、たむし(体部白癬)、皮ふカンジダ症、黒なます(癪風)などに効果を有します。	・生活上注意することはソリューションは、刺激を感じることがあるので、亀裂、びらん面には注意して使用してください。
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			
2646729N1043 620000363 エクラークリーム 0.3%	1 クリーム 白色	皮ふの炎症をおさえ、はれやかゆみなどの症状をやわらげる薬です。	
エスエス製薬株式会社 鳥居薬品株式会社	チューブの記載：SS1 13-Cエクラークリー ム 0.3%		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646729M1048 620000364 	1 軟膏 エクラー軟膏 0 . 3 % 白色～うすい黄色	皮ふの炎症をおさえ、はれやかゆみなどの症状をやわらげる薬です。	
エスエス製薬株式会社 鳥居薬品株式会社	チューブの記載：SS1 13-Oエクラー軟膏 0.3%		
2646729Q1031 620000365 	1 ローション エクラーローション 白色 0.3%	皮ふの炎症をおさえ、はれやかゆみなどの症状をやわらげる薬です。	
エスエス製薬株式会社 鳥居薬品株式会社	容器の記載：SS113 -Lエクラーローション 0.3%		
2615705Q1030 620000366 	1 液 エコ消エタ 無色	・殺菌消毒剤です。	
吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社			
1319800M1023 661310031 	1 眼軟膏 (3.5gチューブ) エコリシン眼軟膏 眼軟膏の色：乳白色半透明キャップの色：青	・結膜炎や麦粒腫（ものもらい）など目の感染症を引き起こしている細菌を殺したり、細菌の増殖を抑えることによって感染症を治します。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
1319801Q1020 661310032 	1 点眼剤（用時溶解型） エコリシン点眼液 点眼剤の色：（溶解前）白色の粉末（ガラス瓶）、無色透明（5ml）	・結膜炎や麦粒腫（ものもらい）など目の感染症を引き起こしている細菌を殺したり、細菌の増殖を抑えることによって感染症を治します。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
2473700S2033 660432016 	1 貼付剤（貼り薬）、だ円形 エストラーナ 0.72mg 9cm2 久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	不足している女性ホルモンを補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗、脛（ちつ）の乾燥感、外陰部のかゆみなどを改善します。	・生活上注意することは、薬を貼ったまま入浴できますが、上から強くこすったりしないでください。
2473700S2041 620003022 	1 貼付剤 エストラジオール貼付剤「F」 0.72mg 9cm2 富士製薬工業株式会社 富士製薬工業株式会社	・天然型女性ホルモンを経皮的に補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗、脛の乾燥感などの症状を改善します。	・薬を貼ったまま入浴できますが、上から強く洗ったり、こすったりしないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2473700S2025 660432015 エストラダームM 0.72mg 9cm 2 日本チバガイギー株 キッセイ薬品工業株	1 貼付剤（はりぐすり） うすいだいだい色 なし	天然型女性ホルモンを経皮的に補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗、脇の乾燥感などの症状や、閉経後の骨粗鬆症を改善します。	・生活上注意することは、薬をはったまま入浴できますが、上から強く洗ったり、こすったりしないでください。
2529701H1031 662550001 エストリール脇錠 0.5mg 持田製薬株式会社 持田製薬株式会社	1 脇錠（長径12.0mm） 白色 ESTRIEL 脇錠V0. 5mg ESTVMO20 4	女性ホルモンの不足で起こる脇部の炎症を抑え、いろいろ不快な症状を和らげる働きがあります。	副作用を予防するため定期的に検診を受けてください。
2529701H1023 662550002 エストリオール脇錠 (富士製薬) 0. 5mg 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	1 脇用錠剤（長径12.4mm、短径7.4mm） 白色 シート記載：エストリオール脇錠 0.5mg	・女性ホルモンの一種であるエストリオールを補充し、脇部の炎症を改善します。	副作用早期発見のため、定期的に婦人科的検査を受けてください。
2615702X1103 662610032 エタノール	3 液 無色透明	・手指・皮膚の消毒をします。 ・手術部位の皮膚の消毒をします。 ・医療用具の消毒をします。	
2615702X1103 662610032 エタノール	2 液剤 無色透明	・手指・皮膚の消毒に用います。 ・手術部位の消毒に用います。 ・医療用具の消毒に用います。	・火気厳禁（引火性および爆発性がありますので、火気には十分注意して下さい。）・蒸気を吸入しないようにして下さい。・傷のある皮膚や粘膜に使用すると、刺激感がありますので使用しないで下さい。・しっかり栓をして、光が当たらないように保存して下さい。
2615702X1103 662610032 エタノール	1 液剤 無色透明	・殺菌消毒剤です。	
本体識別コード：包装識別コード：			
2615702X1383 662610379 エタノール「ヒシヤ マ」 ニプロファーマ株式 ニプロファーマ株式	1 液剤 無色透明	・細菌、真菌、ウイルス等を殺す働きがあります。	・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。・広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。・火気には十分気をつけて下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2615702X1383 662610379 エタノール「ヒシヤ マ」 ニプロファーマ株式 大日本住友製薬株式	2 液剤 無色透明	・細菌、真菌、ウイルス等を殺す働きがあります。	・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。 ・広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。 ・火気には十分気をつけて下さい。
2615702X1251 660421034 エタノール(丸石) 無色透明 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	1 液体 無色透明	・この薬は手指、皮膚および医療用具を消毒します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。 ・刺激がありますので、傷のある皮膚や粘膜には使用しないでください。
2649729N1029 662640735 エパテッククリーム 白色 3% 日産化学工業株式会 ゼリア新薬工業株式	1 クリーム 容器への記載：エパテッククリーム	・塗った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。	本剤の使用中は、天候にかかわらず（曇りの日でも）、戸外活動を避けるとともに、日常の外出時も本剤の塗布部を衣服、サポーターなどでおおい、紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服は紫外線を透過するおそれがあるので、紫外線を透過させにくい色物の衣服を着用してください。また、塗布後少なくとも2週間は同様の注意をしてください。
2649729Q1025 662640582 エパテックゲル 3% 日産化学工業株式会 ゼリア新薬工業株式	1 ゲル 無色～微黄色透明 容器への記載：エパテックゲル	・塗った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。	本剤の使用中は、天候にかかわらず（曇りの日でも）、戸外活動を避けるとともに、日常の外出時も本剤の塗布部を衣服、サポーターなどでおおい、紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服は紫外線を透過するおそれがあるので、紫外線を透過させにくい色物の衣服を着用してください。また、塗布後少なくとも2週間は同様の注意をしてください。
2649729Q3028 662640736 エパテックローション 3% 日産化学工業株式会 ゼリア新薬工業株式	1 ローション 無色～微黄色透明 容器への記載：エパテックローション	・塗った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。	本剤の使用中は、天候にかかわらず（曇りの日でも）、戸外活動を避けるとともに、日常の外出時も本剤の塗布部を衣服、サポーターなどでおおい、紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服は紫外線を透過するおそれがあるので、紫外線を透過させにくい色物の衣服を着用してください。また、塗布後少なくとも2週間は同様の注意をしてください。
6132700J1022 666130005 エポセリン坐剤 1 5 1 2 5 mg 藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式	1 坐剤 白色～帯黄白色 シートの記載：C Z X - S 1 2 5 f 1 1 9	・病気の原因となる多くの細菌に対して殺菌作用を示します。	本剤の使用中は、天候にかかわらず（曇りの日でも）、戸外活動を避けるとともに、日常の外出時も本剤の塗布部を衣服、サポーターなどでおおい、紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服は紫外線を透過するおそれがあるので、紫外線を透過させにくい色物の衣服を着用してください。また、塗布後少なくとも2週間は同様の注意をしてください。
6132700J2029 666130006 エポセリン坐剤 2 0 2 5 0 mg 藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式	1 坐剤 白色～帯黄白色 シートの記載：C Z X - S 2 5 0 f 1 2 9	・病気の原因となる多くの細菌に対して殺菌作用を示します。	本剤の使用中は、天候にかかわらず（曇りの日でも）、戸外活動を避けるとともに、日常の外出時も本剤の塗布部を衣服、サポーターなどでおおい、紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服は紫外線を透過するおそれがあるので、紫外線を透過させにくい色物の衣服を着用してください。また、塗布後少なくとも2週間は同様の注意をしてください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649865M2059 660412011 エラダームゲル 大洋薬品工業株式会社 大洋薬品工業株式会社	1 ゲル 微黄色澄明	使用部位の炎症をおさえ、痛みを和らげる作用があります。慢性関節リウマチ、腰痛症、変形性関節症、腱・腱鞘炎などによる痛み、はれ等の症状を軽くします。	目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。
2649865M1052 660406010 エラダーム軟膏 大洋薬品工業株式会社 大洋薬品工業株式会社	1 軟膏 白色～淡黄白色	使用部位の炎症をおさえ、痛みを和らげる作用があります。慢性関節リウマチ、腰痛症、変形性関節症、腱・腱鞘炎などによる痛み、はれ等の症状を軽くします。	ふたを開けっぱなしにしないでください。目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。
2649865M1052 660406010 エラダーム軟膏 大洋薬品工業株式会社 久光製薬株式会社	2 軟膏 白色～淡黄白色	使用部位の炎症をおさえ、痛みを和らげる作用があります。慢性関節リウマチ、腰痛症、変形性関節症、腱・腱鞘炎などによる痛み、はれ等の症状を軽くします。	ふたを開けっぱなしにしないでください。目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。
2649865M1052 660406010 エラダーム軟膏 大洋薬品工業株式会社 久光製薬株式会社	3 軟膏 白色～うすい黄白色	使用部位の炎症を抑え、痛みを和らげる作用があります。慢性関節リウマチ、腰痛症、変形性関節症、腱・腱鞘炎などによる痛み、腫れ等の症状を軽くします。	・生活上注意することは小児の手の届かないところに保管してください。温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。
1319800M1040 660406140 エリコリ眼軟膏T 日東メディック株式 日東メディック株式	1 眼軟膏 点眼剤の色：白色～淡黃色半透明キャップの色： 白色	・目の炎症を引き起こしている細菌を殺菌します。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319725Q1027 661310240 エリックス点眼液 12.5mg 5mL 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	1 点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：白色キャップ天面：E L	・アレルギー性結膜炎、花粉症、春季カタルの症状をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
2619716Q1029 662610302 エルエイジー10液 10% 吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社	1 液 帯黄色	・殺菌消毒剤です	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2529702H1028 662550027 エルシド腔錠 0mg	1 膜用錠剤（長径12.4mm、短径7.4mm） 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	・カビの一種であるカンジダの発育を抑制して、外陰部や膣の炎症を治療します。	
2634710M1026 662630044 エルタシン軟膏 mg	1 軟膏 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	・細菌による皮膚の感染症を治療します。	
1329705Q1069 660433012 エレクター点鼻液 6.048mg 8mL	1 液剤（点鼻用） キャップの色：だいだい 色液の色：すみきった無色～微黄色 株式会社模範薬品研 メリク・ホエイ株式	・アレルギー性鼻炎のくしゃみ、鼻みす、鼻づまりなどをやわらげます。	・ねむ気があらわれることがありますので、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。
7190701X1036 667190004 塩化ナトリウム	1 結晶又は結晶性の粉末 無色又は白色 株式会社大塚製薬工 大塚製薬株式会社	・食塩を喪失した時の補給に使用します。・また、等張液で皮膚、傷口、粘膜の洗浄や湿布をしたり、うがいをしたり噴霧吸入剤として、気管支粘膜の洗浄や痰の排出を促進するのに使用します。・さらに、生理食塩液は、医療用器具の洗浄にも用います。	主治医からの生活上の指導に従ってください。
2659710Q1035 620003023 塩酸テルビナフィン 液1%「F」	1 液剤 透明～微黄色澄明 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	・水虫やタムシなどカビが原因でおこる病気を治療します。	・患部は清潔に保ち、通気性をよくしましょう。・この薬はアルコールを含んでいるため、火気に近づけないようにしてください。・使用するまでは封を開けず、開封後はなるべく早めに使用してください。
2659710N1039 620003024 塩酸テルビナフィン クリーム1%「F」	1 クリーム剤 白色 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	・水虫やタムシなどカビが原因でおこる病気を治療します。	・患部は清潔に保ち、通気性をよくしましょう。
1211701X1057 660421001 塩酸プロカイン（丸 石）	1 結晶または結晶性の粉末 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は局所を麻酔する働きがあります。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2655700Q2039 1 外用液剤 662650055 エンシェント液 1 %	カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によって起こる皮ふ病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。 ボトルのラベル記載 : t 9 1 7 E S - L	本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。
	2655700N1036 1 クリーム 662650054 エンシェントクリー ム 1 %	カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によって起こる皮ふ病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。
	2655700M1022 1 軟膏 662650056 エンシェント軟膏 1 %	カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によって起こる皮ふ病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。
	2616701Q2035 1 液 660431080 エンゼトニン液 0 . 0 2 %	・殺菌消毒剤です。	
	2616701Q3031 1 液 660431081 エンゼトニン液 0 . 0 2 %	・殺菌消毒剤です。	
	2616701Q4038 1 液 660431082 エンゼトニン液 0 . 0 5 %	・殺菌消毒剤です。	
	2616701Q5034 1 液 660431083 エンゼトニン液 0 . 1 %	・殺菌消毒剤です。	
吉田製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646713N1026 662640706 エンチフルゾンクリーム 0.05%	1 クリーム 白色不透明 チューブのラベル記載： t E F - C 大洋薬品工業株式会	この薬は皮ふの炎症をおさえ、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとり除きます。	
2646713M1020 662640707 エンチフルゾン軟膏 0.05%	1 軟膏 白色～微黄色半透明 チューブのラベル記載： t E F - O 大洋薬品工業株式会	この薬は皮ふの炎症をおさえ、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとり除きます。	
2649725N1047 662640050 エンチマッククリー ム 5%	1 クリーム 白色 チューブのラベル記載： t 913 EM - C 大洋薬品工業株式会 大洋薬品工業株式会	皮ふの炎症をおさえる働きがあり、湿疹、皮ふ炎の治療に用います。また、痛みをおさえる働きもあります。	目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。
2649725M1041 662640051 エンチマック軟膏 5%	1 軟膏 白色～淡黄色半透明 チューブのラベル記載： t 911 EM - O 大洋薬品工業株式会 大洋薬品工業株式会	皮ふの炎症をおさえる働きがあり、湿疹、皮ふ炎やおむつかぶれの治療に用います。また、痛みをおさえる働きもあります。	目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。
2655700Q2047 662650011 エンペシド液 1 %	1 液(瓶入り 10ml) 容器(キャップ：空色本体：白色)、内容(無色～淡黄色澄明) 識別コード：BYE12 バイエル薬品株式会 バイエル薬品株式会	カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によって起こる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	・生活上注意することは、本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。
2655700N1044 662650010 エンペシドクリーム 1 %	1 クリーム(チューブ入り 10g) 容器(キャップ：空色本体：白色)、内容(白色) 識別コード：BYE11 バイエル薬品株式会 バイエル薬品株式会	カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によって起こる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	・生活上注意することは、本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。
2529702H1036 662550004 エンペシド腔錠 0.0mg	1 膨脹錠(長径：24.7mm短径：10.2mm厚さ：6.5mm) 白色 バイエル薬品株式会 バイエル薬品株式会	・カビの一種であるカンジダに効く薬です。カンジダは外陰部や腔等に寄生して炎症を引き起こします。	・薬剤の効果を持続させるために自分で腔内を洗うことは控えてください。・セックスパートナーとの相互感染を防ぐため完治するまではコンドームを使用してください。・セックスパートナーにかゆみ等の症状がみられるときは同時に治療することが必要です。・入浴時は石鹼の刺激を避けるため、外陰部はお湯だけでよく洗い、よく乾燥させてください。・下着やタオルは毎日清潔なものを用い、タオル等は家族と共にしないようにしてください。・下着は通気性のよいものを着用してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
6290700E1023 660432009 	1 錠剤(直径15.9mm) エンペシドトローチ 白色～微黃白色 10mg	口の中のカビの一種であるカンジダを殺す薬です。	・生活上注意することは
バイエル薬品株式会社 バイエル薬品株式会社	分包表面の記載:シート 包装なし		
2646704M1021 662640052 	1 軟こう剤 オイラゾンD 0.05% 白色～黄白色	この薬は副腎皮質ステロイドです。この薬は湿疹や虫されなどの皮膚のかゆみや炎症をおさえます。	品質を保つため他の容器に移しかえないでください。
日本チバガイギー株 ノバルティス フア	チューブの記載: C G E D 0.05		
2646704M2028 662640053 	1 軟こう剤 オイラゾンD 1% 白色～黄白色	この薬は副腎皮質ステロイドです。この薬は湿疹や虫されなどの皮膚のかゆみや炎症をおさえます。	品質を保つため他の容器に移しかえないでください。
日本チバガイギー株 ノバルティス フア	チューブの記載: C G E D 0.1		
2649722M1021 662640842 	1 軟こう剤 オイラックス 0% 白色～黄白色	この薬は湿疹やじん麻疹などの皮ふのかゆみをおさえます。	品質を保つため他の容器に移しかえないでください。
日本チバガイギー株 ノバルティス フア	チューブの記載: C G E X		
2649800M1023 662640055 	1 軟こう剤 オイラックスH 白色～黄白色	・この薬は副腎皮質ステロイドをふくんでいます。・この薬は湿疹や虫されなどの皮膚のかゆみや炎症をおさえます。	品質を保つため他の容器に移しかえないでください。
日本チバガイギー株 ノバルティス フア	チューブの記載: C G E H		
7121701X1080 667120023 	2 軟膏 黄色ワセリン	・この薬は皮膚を保護する働きがあります。また、いろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。	
7121701X1080 667120023 	1 ワセリン 黄色ワセリン	・皮膚を保護します。・軟膏の基剤です。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2619702Q2074 660406019 	1 液剤 オールカット E R 液 赤色澄明 (0.5%)	・手術部位の消毒、医療用具等を消毒し、感染を予防します。	・このくすりが付着した衣類などを塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミになりますので、漂白には酸素系漂白剤をご使用下さい。
2619702Q1027 662610320 	1 液剤 オールカット E W 液 無色澄明 (0.5%)	・手術部位の消毒、医療用具等を消毒し、感染を予防します。	・このくすりが付着した衣類などを塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミになりますので、漂白には酸素系漂白剤をご使用下さい。
2619702Q3038 662610314 	1 液剤 オールカット液 5% 赤色	・傷口、手指などの皮膚、器具、家具、物品、部屋などを消毒し、感染を予防します。	・このくすりが付着した衣類などを塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミになりますので、漂白には酸素系漂白剤をご使用下さい。
2529709H1038 660444011 	1 膀胱用錠剤（長径20mm、短径12mm） オキコナールV 100 mg	・カビの一種であるカンジダの発育を抑制して、外陰部や脇の炎症を治療します。	・子供の手の届かないところに保管してください。
富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会 	シート記載：F J 0 0 3 1 0 0		
2529709H2034 660444012 	1 膀胱用錠剤（長径20mm、短径12mm） オキコナールV 600 mg	・カビの一種であるカンジダの発育を抑制して、外陰部や脇の炎症を治療します。	・子供の手の届かないところに保管してください。
富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会 	シート記載：F J 0 0 3 6 0 0		
2691702M1028 660451003 	1 軟膏 オキサロール軟膏 0.0025%	・乾癬（かんせん）を始めとする、皮膚の角質層が厚くなる病気の症状（皮膚が赤くなる、銀白色の皮が落ちるなど）を軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのを避けてください。・患部は常に清潔に保つようにしてください。
中外製薬株式会社 マルホ株式会社 	チューブの記載：オキサロール軟膏		
2614700X1417 662610034 	1 液剤 オキシドール 無色澄明	・細菌を殺す働きがあります。	・目に入らないように注意して下さい、万一目に入った場合はすぐに水でよく洗い流して下さい。
株式会社フヂミ製薬 ニプロファーマ株式			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2614700X1140 662610034 オキシドール	2 液体 無色透明	・この薬は傷口やただれていますの粘膜、虫歯や歯の根っこなどの炎症部位を消毒したり、口の中を洗浄するために使用します。	・光をあてない工夫をして、30以下で保存してください。
2614700X1077 662610034 オキシドール	1 液剤 無色透明	細菌を殺す働きがあります。	目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流してください。
健栄製薬株式会社	無し		
2614700X1140 662610034 オキシドール	1 液 無色透明	・きず、口腔内などの殺菌・消毒・清掃などをします。	・衣類などに付着すると、脱色できませんので、注意してください。
岩城製薬株式会社			
2614700X1069 660431023 オキシドール・O.I.	2 液剤 無色透明	・傷の殺菌・消毒に用います。・外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽頭喉頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症に用います。・口の中の粘膜の消毒に用います。	・栓をして、光が当たらないようにして涼しい所に保管して下さい。また、強く振ったりしないで下さい。
オリエンタル薬品工 岩城製薬株式会社			
2614700X1379 662610362 オキシドール「ヨシダ」	1 液 無色透明	・傷の殺菌・消毒に用います。・外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽頭喉頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症に用います。・口の中の粘膜の消毒に用います。	・栓をして、光が当たらないようにして涼しい所に保管して下さい。また、強く振ったりしないで下さい。
吉田製薬株式会社			
2614700X1387 662610363 オキシフル	1 外用液剤 無色	・きず口につけ、きず口およびその周囲にある細菌を殺し、消毒します。・外耳・中耳炎、咽喉頭炎、扁桃炎などの炎症を抑えます。・口腔粘膜などを消毒、清浄します。	・キャップをあける時は、瓶口を顔に向かないようにしてください。・他の容器に入れかえないでください。・使用後は栓をしっかりとしめてください。・直射日光を避け、なるべく冷所(30以下)で小児の手の届かないところに保管してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2529709H1020 662550030 オキナゾールV 10 0 100mg	2 錠剤(長径20mm、短径12mm) 白色	・外陰(がいいん)と脣(ちつ)の炎症やかゆみの原因になっているカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があります。	
2529709H1020 662550030 オキナゾールV 10 0 100mg	三菱ウェルファーマ 三菱ウェルファーマ	オキナゾール 100mg	
2529709H1020 662550030 オキナゾールV 10 0 100mg	1 錠剤(長径20mm、短径12mm) 白色	・外陰(がいいん)と脣(ちつ)の炎症やかゆみの原因になっているカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があります。	
2529709H1020 662550030 オキナゾールV 10 0 100mg	三菱ウェルファーマ 三菱ウェルファーマ	オキナゾール 100mg	
2655706Q1021 662650076 オキナゾール液 1%	2 液 無色透明	・水虫やカンジダ症の原因である白癬(はくせん)菌やカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があり、水虫やカンジダ症の症状を改善します。	・水虫の原因である白癬(はくせん)菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえてください。
2655706Q1021 662650076 オキナゾール液 1%	三菱ウェルファーマ	容器の記載： 267	
2655706Q1021 662650076 オキナゾール液 1%	三菱ウェルファーマ	容器の記載： 267	
2655706N1025 662650070 オキナゾールクリー ム 1%	2 クリーム 白色	・水虫やカンジダ症の原因である白癬(はくせん)菌やカンジダ菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があり、水虫やカンジダ症の症状を改善します。	・水虫の原因である白癬(はくせん)菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえてください。
2655706N1025 662650070 オキナゾールクリー ム 1%	三菱ウェルファーマ	チューブの記載： 264	
2655706N1025 662650070 オキナゾールクリー ム 1%	三菱ウェルファーマ	チューブの記載： 264	
2699701M1021 662690003 オクソラレン軟膏 0.3%	1 軟膏剤 白色	・皮膚に日焼けを起こさせ、色素沈着を生じ易くさせる薬剤です。【医療関係者の方へ】「警告」の項をご参照の上、患者さんに十分な説明を行ってください。	・セロリ、ライム、ニンジン、パセリ、イチジク、アメリカボウフウ、カラシなど光に過敏になる成分を含有する食物は、治療期間中食べないようにしてください。
大正製薬株式会社 大正富山医薬品株式	チューブ本体の記載： T A I S H O 1 3 1		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2699701Q1023 662690008 	1 ローション剤 オクソラレンローション0.3% 無色（瓶の色：褐色） 大正製薬株式会社 大正富山医薬品株式	・皮膚に日焼けを起こさせ、色素沈着を生じ易くさせる薬剤です。【医療関係者の方へ】 「警告」の項をご参照の上、患者さんに十分な説明を行ってください。	・セロリ、ライム、ニンジン、パセリ、イチジク、アメリカボウフウ、カラシなど光に過敏になる成分を含有する食物は、治療期間中食べないようにしてください。
2699701Q2038 660454002 	1 ローション剤 オクソラレンローション1% 無色（瓶の色：褐色） 大正製薬株式会社 大正富山医薬品株式	・皮膚に日焼けを起こさせ、色素沈着を生じ易くさせる薬剤です。【医療関係者の方へ】 「警告」の項をご参照の上、患者さんに十分な説明を行ってください。	・セロリ、ライム、ニンジン、パセリ、イチジク、アメリカボウフウ、カラシなど光に過敏になる成分を含有する食物は、治療期間中食べないようにしてください。
1315704Q1026 661310039 	1 点眼液 オドメール0.02%点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：白色キャップ天面：OM 0.02 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・眼瞼炎、結膜炎、角膜炎などの炎症をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1315704Q2022 661310199 	1 点眼液 オドメール0.05%点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：白色キャップ天面：OM 0.05 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・眼瞼炎、結膜炎、角膜炎などの炎症をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1315704Q3029 661310040 	1 点眼液 オドメール0.1%点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：白色キャップ天面：OM 0.1 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、ぶどう膜炎などの炎症をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319716Q3047 660406145 	1 点眼液（5mLプラスティック容器） オフサチント 0.06% 5mL 日東メディック株式会社 日東メディック株式会社	・目の炎症を抑えます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319722Q1112 660453011 	1 点眼液（5mLプラスティック容器） オフロキサット点眼液 0.3% 日医工株式会社 日医工株式会社	この薬は炎症を引き起こしている細菌感染症の原因菌を殺菌する働きがあり、細菌感染による眼の病気を治療する薬です。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319722Q1090 660453012	1 点眼液 (5 mL プラス ティック容器)	・目の炎症を引き起こしている 細菌を殺菌します。	・コンタクトレンズを使用してく いる人は、主治医に相談してく ださい。
オフロキシン点眼液 0.3%	点眼剤の色 : 微黄色 ~ 淡 黄色 澄明キャップの色 : 黄色		
東亜薬品株式会社 日東メディック株式			
2399712E1029 662310005	1 剤形 (直径 mm) : ト ローチ剤 (15.0)	口の中やのどを殺菌消毒し、歯 をぬいた後などの感染を予防し ます。	
オラドールS 口中錠 0.5 mg	淡紅色		
武州製薬株式会社 ノバルティス ファ	オラドールS 0.5 mg、 CG402		
2399712E1037 662310006	1 剤形 (直径 mm) : ト ローチ剤 (15.0)	口の中やのどを殺菌消毒し、歯 をぬいた後などの感染を予防し ます。	
オラドール口中錠 0.5 mg	白色		
武州製薬株式会社 ノバルティス ファ	オラドール 0.5 mg、C G401		
2357701K6174 660412015	1 浸腸液 (粘性な液)	この薬は、大腸の運動を活発に し便をやわらかくして便通をよ くする坐薬 (浸腸剤) です。	
オリエンタル浣腸液 50% 60 mL	無色澄明		
ファーマパック株式 日医工株式会社			
2357701K6174 660412015	2 浸腸液 (粘性な液)	この薬は、大腸の運動を活発に し便をやわらかくして便通をよ くする坐薬 (浸腸剤) です。	
オリエンタル浣腸液 50% 60 mL	無色澄明		
オリエンタル薬品工 日医工株式会社			
2357701K8142 660412016	2 浸腸液 (粘性な液)	この薬は、大腸の運動を活発に し便をやわらかくして便通をよ くする坐薬 (浸腸剤) です。	
オリエンタル浣腸液 50% 120 mL	無色澄明		
ファーマパック株式 日医工株式会社			
2357701K8142 660412016	1 浸腸液 (粘性な液)	この薬は、大腸の運動を活発に し便をやわらかくして便通をよ くする坐薬 (浸腸剤) です。	
オリエンタル浣腸液 50% 120 mL	無色澄明		
オリエンタル薬品工 日医工株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
7121704X1202 667120001 オリブ油	8 液 淡黄色	・皮膚、粘膜を保護します。カーテールの挿入をスムーズにします	
7121704X1202 667120001 オリブ油	7 液剤 淡黄色	1. 皮膚を保護し、日焼け炎症の防止をします。2. やけど、かぶれをなおします。	
7121704X1202 667120001 オリブ油	6 油 淡黄色	・手足のひび、あかぎれ、皮膚のあれなどに用いて、皮膚を保護します。・日焼け炎症の防止作用があります。・火傷やかぶれた皮膚に用います。	・皮膚に使用する外用剤です、内服しないで下さい。(料理などに使って飲食しないで下さい。)・冬期(10℃以下)には、固形分が析出することがあります。その時は、少し温め液状にして使用して下さい。・火気厳禁(引火する恐れがありますので、火気に注意して下さい。)
7121704X1202 667120001 オリブ油	5 油液 淡黄色	・皮膚を保護します。・軟膏などに基剤に用います。	
7121704X1202 667120001 オリブ油	4 液剤 淡黄色	・皮膚、粘膜を保護します。	
	本体識別コード：包装識別コード：		
7121704X1202 667120001 オリブ油	2 液 淡黄色	・皮膚、粘膜を保護します。	
7121704X1202 667120001 オリブ油	1 油状の液体 淡黄色	・この薬は皮膚や粘膜を保護する働きがあります。また、軟膏などを作るときに使用します。	・冬などで10℃以下になると、固まってしまうことがあります。その時は温めて溶かして使用してください。・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
7121704X1202 667120001 オリブ油	3 油 淡黄色	皮膚・粘膜を保護します。	
1315702Q1027 661310044 オルガドロン点眼・ 無色澄明 点耳液 0.1%	2 外用液剤	・目や耳の炎症やアレルギー反応を抑えます。	
1315702Q1027 661310044 オルガドロン点眼・ 無色澄明 点耳液 0.1%	1 外用液剤	・目や耳の炎症や、耳鼻科のアレルギー症状などを抑えます。・耳鼻科の術後に使用します。	
1319722Q1066 660453013 オルカビット点眼液 微黄色～淡黄色澄明 0.3%	1 点眼剤	・目の感染症を引き起こしている細菌を殺菌します。	(保存方法を含む)・コンタクトレンズをしている人は、主治医に相談してください。・ふたを開けて1ヵ月経ったものは使用しないでください。
1149700J1043 661140171 オルヂス坐剤 5.0 g	1 坐剤 乳白色	・この薬はリウマチ、関節炎、腰痛等の炎症や腫れ、こわばり、痛み、発熱などを軽くしたり、ケガや手術後の炎症や痛みを抑えたりする効果があります。	該当しません
アボットジャパン株 HC 182 5.0			
アボットジャパン株			
1149700J1043 661140171 オルヂス坐剤 5.0 g	2 坐剤 乳白色	・この薬はリウマチ、関節炎、腰痛等の炎症や腫れ、こわばり、痛み、発熱などを軽くしたり、ケガや手術後の炎症や痛みを抑えたりする効果があります。	該当しません
アボットジャパン株 HC 182 5.0			
アボットジャパン株			
1149700J2040 661140172 オルヂス坐剤 7.5 g	1 坐剤 乳白色	・この薬はリウマチ、関節炎、腰痛等の炎症や腫れ、こわばり、痛み、発熱などを軽くしたり、ケガや手術後の炎症や痛みを抑えたりする効果があります。	該当しません
アボットジャパン株 HC 183 7.5			
アボットジャパン株			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1149700J2040 661140172 	2 坐剤 オルデス坐剤 75 75mg	・この薬はリウマチ、関節炎、腰痛等の炎症や脹れ、こわばり、痛み、発熱などを軽くしたり、ケガや手術後の炎症や痛みを抑えたりする効果があります。	該当しません
2649887S1023 662640773 	1 貼付剤 (10×14cm) カーマス 10cm 白色 ×14cm	打撲、筋肉痛、関節痛などの痛みを抑え、炎症を鎮めます。	
7121705X1037 667120045 	1 塊状 カカオ脂「ホエイ」 黄白色	・坐剤の基剤です。	
6250700N1028 660444014 	1 クリーム カサールクリーム 白色	・病気の原因であるウイルスの増殖を抑制し、皮膚症状を改善します。	・小児の手の届かない所に保管してください。・温度の高いところを避け、涼しい所に保管してください。・この薬がコンドームにつくと破れやすくなることがあります。使用中は他の方法で避妊するようにしてください。
2260700D1039 662230006 	1 錠剤 (直径10.0mm) カズミランG錠 mg	・はれ(炎症)をやわらげるうがい薬です。	・この薬は、光のあたらない場所に保管してください。
1319706Q1024 661310229 	1 点眼液 カタリンK点眼用 0.005% (溶解後液として)	・老人性白内障の進行をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319706Q2020 661310045 	1 点眼液 カタリン点眼液 0.005% (溶解後液として)	・老人性白内障の進行をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319749Q1022 620002412 ガチフロ 0 . 3 % 点眼液 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	1 点眼剤 ・点眼瓶の色：無色・ キャップの色：透明ピンク色 ・キャップ天面：G F	・結膜炎やものもらい等の眼感染症を引き起こしている細菌を殺菌します。・手術前後の感染を引き起こす細菌を殺菌します。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
2649804X1125 662640916 カチリ「ホエイ」	2 リニメント剤 白色ののり状	・じん麻疹、皮膚のかゆみ、あせも、虫さされなどの症状を改善します。	
メルク・ホエイ株式			
2649804X1125 662640916 カチリ「ホエイ」	1 リニメント剤 白色ののり状	・じん麻疹、皮膚のかゆみ、あせも、虫さされなどの症状を改善します。	
メルク・ホエイ株式 ニプロファーマ株式			
2649804X1206 662640917 カチリ「ヨシダ」	1 軟膏 白	・皮膚のかゆみ、汗疹、蕁麻疹、小児ストロフルス、虫さされ	
吉田製薬株式会社			
2699704W1026 662690013 カデックス 0 . 9 % 日医工株式会社 日医工株式会社	1 細粒状の外用散剤 黄褐～褐色 分包品 外用 3 g カデックス(分包装上)	この薬は床ずれや皮膚潰瘍部分にふりかけることにより、潰瘍面の分泌液を吸い取り清浄化します。また、ヨウ素の抗菌作用により細菌感染を予防する作用があります。これらの作用により潰瘍を小さくしたり、なおす。	
2699704W1026 662690013 カデックス 0 . 9 % 日医工株式会社 エスエス製薬株式会社	3 細粒状の外用散剤 黄褐～褐色 分包品 外用 3 g カデックス(分包装上)	この薬は床ずれや皮膚潰瘍部分にふりかけることにより、潰瘍面の分泌液を吸い取り清浄化します。また、ヨウ素の抗菌作用により細菌感染を予防する作用があります。これらの作用により潰瘍を小さくしたり、なおす。	
2699704W1026 662690013 カデックス 0 . 9 % 日医工株式会社 三菱ウェルファーマ	2 細粒状の外用散剤 黄褐～褐色 分包品 外用 3 g カデックス(分包装上)	この薬は床ずれや皮膚潰瘍部分にふりかけることにより、潰瘍面の分泌液を吸い取り清浄化します。また、ヨウ素の抗菌作用により細菌感染を予防する作用があります。これらの作用により潰瘍を小さくしたり、なおす。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 2699704W1026 662690013 カデックス 0 . 9 % 日医工株式会社 鳥居薬品株式会社	4 細粒状の外用散剤 黄褐～褐色 分包品 外用 3 g カデックス(分包装上)	この薬は床ずれや皮膚潰瘍部分にふりかけることにより、潰瘍面の分泌液を吸い取り清浄化します。また、ヨウ素の抗菌作用により細菌感染を予防する作用があります。これらの作用により潰瘍を小さくしたり、なれます。	
 2699704M1025 660453014 カデックス軟膏 0 . 9 % 日医工株式会社 日医工株式会社	1 軟膏 褐色 日医工株式会社 日医工株式会社	この薬は床ずれや皮膚潰瘍部分にふりかけることにより、潰瘍面の分泌液を吸い取り清浄化します。また、ヨウ素の抗菌作用により細菌感染を予防する作用があります。これらの作用により潰瘍を小さくしたり、なれます。	
 2699704M1025 660453014 カデックス軟膏 0 . 9 % 日医工株式会社 エスエス製薬株式会社	2 軟膏 褐色 日医工株式会社 エスエス製薬株式会社	この薬は床ずれや皮膚潰瘍部分にふりかけることにより、潰瘍面の分泌液を吸い取り清浄化します。また、ヨウ素の抗菌作用により細菌感染を予防する作用があります。これらの作用により潰瘍を小さくしたり、なれます。	
 2699704M1025 660453014 カデックス軟膏 0 . 9 % 日医工株式会社 三菱ウェルファーマ	3 軟膏 褐色 日医工株式会社 三菱ウェルファーマ	この薬は床ずれや皮膚潰瘍部分にふりかけることにより、潰瘍面の分泌液を吸い取り清浄化します。また、ヨウ素の抗菌作用により細菌感染を予防する作用があります。これらの作用により潰瘍を小さくしたり、なれます。	
 2649719S1053 662640745 カトレップ 10 cm x 14 cm 帝國製薬株式会社 大日本住友製薬株式	1 パッピング剤 色：白色～淡黄色（膏体）、白色（不織布） 識別コード：#CL（包装に記載）	炎症や痛みをやわらげます。 また、外傷後のはれや痛みをやわらげます。変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛	
 2634709R1020 662630004 カナマイシンスプレー明治 5 mg 明治製菓株式会社 明治製菓株式会社	1 エアゾール剤 無色（無臭）	・病気の原因となる細菌を殺す働きがあります。	・誤って吸入しないように注意してください。眼科用に使用しないでください。・なるべく涼しい場所で保管してください。・捨てるときは、中身を出しきってから捨ててください。
 2634700M1022 662630005 カナマイシン軟膏明治 20 mg 明治製菓株式会社 明治製菓株式会社	1 軟膏剤（親水性軟膏）	病気の原因となる細菌を殺す働きがあります。	・生活上注意することは・眼科用に使用しないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649855Q1026 662640065 カラミンローション (丸石)	1 懸濁液 わずかに赤色	・この薬は湿しん、あせも、日焼け、軽いやけど、炎症を起こしている部分などを保護し、炎症を抑え、治療する働きがあります。	
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
1319706Q3027 661310305 カリユニ点眼液 0.005% 5mL	1 点眼剤 (5mL プラスチック容器) 点眼剤の色：だいだい色 (懸濁液) キャップの色：白	・水晶体が白く濁るのを抑え、老人性白内障の進行を遅くします。	・あやまって衣類につくとしみになることがあります。このような場合はしみを残さないため、なるべく早めに水洗いしてください。なお、羊毛や絹などの動物性繊維では洗ってもしみが残ることがありますので注意してください。
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
2662700X1090 662660003 カリ石ケン	2 柔らかい固形 (粘滑の軟塊) 黄褐色	・浣腸液、洗浄液の調製に用います。	
メルク・ホエイ株式			
2662700X1074 662660003 カリ石ケン	1 柔らかい固形 (粘滑の軟塊) 黄褐色	・浣腸液、洗浄液の調製に用います。	
東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式			
2662700X1090 662660003 カリ石ケン	1 柔らかい固形 (粘滑の軟塊) 黄褐色	・浣腸液、洗浄液の調製に用います。	
株式会社フヂミ製薬 メルク・ホエイ株式			
2662700X1104 662660003 カリ石ケン	2 軟らかい塊 黄褐色透明	・この薬は皮膚の脂肪性物質を除去して清浄にしたり、皮膚をやわらかくする働きがあります。また、かん腸液を作るためにも使用します。	
丸石製薬株式会社			
1141700J2114 620000370 カルジール小児用坐剤 100 100mg	1 坐剤 (全長 22mm) 白色	この薬は熱を下げる効果があります。	
大洋薬品工業株式会 大洋薬品工業株式会			



薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1141700J3099 620000371	1 坐剤 (全長26mm) カルジール小児用坐 剤 200 200m g 大洋薬品工業株式会 大洋薬品工業株式会	この薬は熱を下げる効果があり ます。	
	1319701Q1030 660433015 カルテオロール点眼 液 T 1 %	点眼液 (5mL) プラス ティック容器 点眼剤の色：無色透明 キャップの色：淡赤色	・目の中の圧力（眼圧）を下げ て、緑内障による視力の悪化を 抑えます。 ・コンタクトレンズを使用してく いる人は、主治医に相談してく ださい。
	1319701Q2036 660433016 カルテオロール点眼 液 T 2 %	点眼液 (5mL) プラス ティック容器 点眼剤の色：無色透明 キャップの色：赤色	・目の中の圧力（眼圧）を下げ て、緑内障による視力の悪化を 抑えます。 ・コンタクトレンズを使用してく いる人は、主治医に相談してく ださい。
	1141700J2050 661140180 カロナール坐剤 10 0 100mg	坐剤 白色～淡黄色 SDCAL・SUP10	・熱を下げます。
	1141700J2050 661140180 カロナール坐剤 10 0 100mg	坐剤 白色～淡黄色 SDCAL・SUP10	・熱を下げます。
	1141700J3048 661140181 カロナール坐剤 20 0 200mg	坐剤 白色～淡黄色 SDCAL・SUP20	・熱を下げます。
	1141700J3048 661140181 カロナール坐剤 20 0 200mg	坐剤 白色～淡黄色 SDCAL・SUP20	・熱を下げます。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1316700Q1025 661310164  眼科用ブリビナ 0.05%	1 液剤(点眼用) すみきった無色	結膜の血管を収縮させる作用があり、目の充血を一時的に取り除きます。	小児の手のとどかないところに保管してください。
1319812M1026 661310157  眼・耳科用リンデロ ンA軟膏	1 軟膏 商品名等：チューブに印 刷	目、耳、鼻の炎症症状(かゆい、赤くなる等)を改善する塗り薬です。	使用する前に手を洗ってください。薬を使用後は汚染しないようしつかりふたをしめてください。温度の高くなる所に保管しないでください。小児の手の届かない所に保管してください。
2260702F1039 662230026  含嗽用AZ細粒「ヒ シヤマ」0.1%	2 散剤(細粒) 包装の記載：含嗽用AZ 細粒 HD-512 う がい薬 本品1包(2g)を	この薬は口の中やのどの炎症を抑えるうがい薬です。	
2260702F1039 662230026  含嗽用AZ細粒「ヒ シヤマ」0.1%	1 散剤(細粒) 包装の記載：含嗽用AZ 細粒 HD-512 う がい薬 本品1包(2g)を	この薬は口の中やのどの炎症を抑えるうがい薬です。	
2260700B1054 662230018  含嗽用アズレン「T YK」0.4%	1 散剤 包装の記載：含嗽用アズレン「TY K」 TYK112	・口の中やのどの、腫れや痛みを和らげます。	
2260700B1054 662230018  含嗽用アズレン「T YK」0.4%	2 散剤 包装の記載：含嗽用アズレン「TY K」 TYK112	・口の中やのどの、腫れや痛みを和らげます。	
2260700C1084 660422017  含嗽用アズレン顆粒 「KOB A」0. 4%	1 顆粒剤 包装の記載：KK372 含嗽用アズレ ン顆粒(分包装上に印 刷)	この薬は、炎症をおさえるうがい薬です。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2260700B1046 662230007 	1 散剤 含嗽用アズレン「昭和」 0.4%	・口の中またはのどの炎症に直接作用し、炎症を抑えます。	光や高温を避けて、風通しのよい暗い所に保存してください。
昭和薬品化工株式会 昭和薬品化工株式会	該当なし		
2260702F1047 662230008 	1 顆粒剤 含嗽用ハチアズレ 0.1%	・のどなど口腔内の炎症によるあれ・痛み・腫れを和らげます。・抜歯後または歯肉炎などの口内の小手術の後による、腫れ・痛みを和らげます。	・特にありません
東洋製薬化成株式会 小野薬品工業株式会	分包の記載：含嗽用ハチアズレ，2g		
2260702F1047 662230008 	2 顆粒剤 含嗽用ハチアズレ 0.1%	・のどなど口腔内の炎症によるあれ・痛み・腫れを和らげます。・抜歯後または歯肉炎などの口内の小手術の後による、腫れ・痛みを和らげます。	・特にありません
東洋製薬化成株式会 小野薬品工業株式会	分包の記載：含嗽用ハチアズレ，2g		
2645700Q1060 662640080 	2 液剤 カンフル精（東洋製 薬）	・筋肉痛、うちみ、ねんざ、しもやけ、打撲の炎症をおさえ、痛みをとります。・かゆみをおさえます。	
東洋製薬化成株式会 小野薬品工業株式会			
2645700Q1060 662640080 	1 液剤 カンフル精（東洋製 薬）	・筋肉痛、うちみ、ねんざ、しもやけ、打撲の炎症をおさえ、痛みをとります。・かゆみをおさえます。	
東洋製薬化成株式会 健栄製薬株式会社			
2645700Q1087 662640076 	1 液体 カンフル精（丸石） 無色透明	・この薬は局所を刺激したり、血行を改善したり、炎症、痛み、かゆみを抑える働きがあります。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。・湿潤している部位には使用しないでください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
1319739Q1029 660432001 	2 点眼剤（2.5mL） キサラタン点眼液 0.005%	緑内障、高眼圧症の患者さんの眼圧を下げる点眼薬です。	
ファイザー株式会社 ファイザー株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 形
診療コード 色
名称 製造会社
販売会社 記号

効能効果

注意事項

	1319739Q1029 660432001	1 点眼剤 (2.5 mL) キサラタン点眼液 無色透明 0.005%	緑内障、高眼圧症の患者さんの 眼圧を下げる点眼薬です。
	1319730Q1079 660433017	1 水性点眼液 キセブレン点眼液 無色～微黄色透明 3.45mg 5mL	・アレルギーによって出てくる 物質の産生を抑え、またその物 質の動きを抑えます。 ・アレル ギー性結膜炎の症状を改善しま す
	1329705Q1077 660433018	1 鼻用定量噴射式懸濁剤 キセブレンネザル 無色～微黄色透明 6.048mg 8mL	・この薬はくしゃみ、鼻汁及び 鼻閉の症状を改善します。
	2616700Q4025 660406124	1 液 逆性石ケン液 0.025% 25ml 「ヨシダ」 0.025%	・殺菌消毒剤です。
	2616700Q9027 660431079	1 液 逆性石ケン液 0.02% 20ml 「ヨシダ」 0.02%	・殺菌消毒剤です。
	2616700Q5030 660421049	1 液 逆性石ケン液 0.05% 50ml 「ヨシダ」 0.05%	・殺菌消毒剤です。
	2616700Q1328 662610420	1 液 逆性石ケン液 1.0% 100ml 「ヨシダ」 1.0%	・殺菌消毒剤です。

薬剤情報雑形マスター覧

形 色	効能効果	注意事項
記号		
 逆性石ケン液10% (ヨシダ) 「ヨシダ」 10%	2616700Q1328 2 液 662610420 吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社	・殺菌消毒剤です。
 逆性石酸液「ヒシヤ」無色～淡黄色 マ」 10%	2616700Q1310 1 液剤 662610419 ニプロファーマ株式 ニプロファーマ株式	・殺菌消毒剤です
 吸水軟膏	7122703X1043 1 軟膏 667120025 丸石製薬株式会社	・この薬は皮膚を保護する働きがあります。また、いろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。 ・口に入れたり飲むことはやめてください。
 吸水軟膏「ホエイ」白色	7122703X1051 1 クリ - ム状 667120056 メルク・ホエイ株式	・皮膚を保護します。 ・軟膏の基剤です。
 キュウパップ・M 白色	2649808S1029 1 はり薬 662640629 救急薬品工業株式会 アステラス製薬株式	・打ち身、ねんざ、関節痛、筋肉痛などの炎症や痛みをやわらげます。 ・はる場所を清潔にして、汗はふきとてから使用してください。
 キュウメート軟膏 0.5% 【内容物：淡黄色澄明】 【キャップ：白色、本体白色】	2649730M1042 1 軟膏剤 660406023 救急薬品工業株式会 昭和薬品化工株式会	・炎症をしづめ、痛みをやわらげる作用があります。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。 衣類についた場合は、水洗いをして下さい。
 キュバール 100 工 アゾール 15mg 8.7g 大日本住友製薬株式 シェーリング・プラウ	2259703Y1025 2 定量バルブ付き吸入用エアゾール剤 660462002 キュバール 100 工 アゾール 15mg 8.7g 大日本住友製薬株式 シェーリング・プラウ	・この薬は、気道の炎症を抑えることにより、ぜんそく発作の程度や頻度を軽減します。 ・この薬はすでに起きてしまった発作をしめるくすりではありません。 ・この薬は症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれます。 ・吸入後はうがいまたは口をすいでください。 ・他の医療機関を受診（ぜんそくあるいは他の病気で）するときは、この薬を使っていることを伝えてください。 ・ぜんそくの症状が悪化した場合は、すぐに主治医に連絡してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2259703Y1025 660462002 キュバール100エアゾール 15mg 8.7g 大日本住友製薬株式 シェーリング・プラウ	1 定量バルブ付き吸入用エアゾール	・この薬は、気道の炎症を抑えることにより、ぜんそく発作の程度や頻度を軽減します。・この薬はすでに起きてしまった発作をしめるくすりではありません。・この薬は症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれます。	・吸入後はできるだけうがいをしてください。・他の医師を受診(喘息あるいは他の病気)するときは、この薬を使っていることを伝えてください。・ぜんそくの症状が悪化した場合は、すぐに主治医に連絡してください。
2259703Y1025 660462002 キュバール100エアゾール 15mg 8.7g 大日本住友製薬株式 大日本住友製薬株式	3 定量バルブ付き吸入用エアゾール	・この薬は、気道の炎症を抑えることにより、ぜんそく発作の程度や頻度を軽減します。・この薬はすでに起きてしまった発作をしめるくすりではありません。・この薬は症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれます。	・吸入後はできるだけうがいをしてください。・他の医師を受診(喘息あるいは他の病気)するときは、この薬を使っていることを伝えてください。・ぜんそくの症状が悪化した場合は、すぐに主治医に連絡してください。
2259703G9020 660462001 キュバール50エアゾール 7mg 8.7g 大日本住友製薬株式 シェーリング・プラウ	1 定量バルブ付き吸入用エアゾール	・この薬は、気道の炎症を抑えることにより、ぜんそく発作の程度や頻度を軽減します。・この薬はすでに起きてしまった発作をしめるくすりではありません。・この薬は症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれます。	・吸入後はできるだけうがいをしてください。・他の医師を受診(喘息あるいは他の病気)するときは、この薬を使っていることを伝えてください。・ぜんそくの症状が悪化した場合は、すぐに主治医に連絡してください。
2259703G9020 660462001 キュバール50エアゾール 7mg 8.7g 大日本住友製薬株式 大日本住友製薬株式	3 定量バルブ付き吸入用エアゾール	・この薬は、気道の炎症を抑えることにより、ぜんそく発作の程度や頻度を軽減します。・この薬はすでに起きてしまった発作をしめるくすりではありません。・この薬は症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれます。	・吸入後はできるだけうがいをしてください。・他の医師を受診(喘息あるいは他の病気)するときは、この薬を使っていることを伝えてください。・ぜんそくの症状が悪化した場合は、すぐに主治医に連絡してください。
2259703G9020 660462001 キュバール50エアゾール 7mg 8.7g 大日本住友製薬株式 シェーリング・プラウ	2 定量バルブ付き吸入用エアゾール剤	・この薬は、気道の炎症を抑えることにより、ぜんそく発作の程度や頻度を軽減します。・この薬はすでに起きてしまった発作をしめるくすりではありません。・この薬は症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれます。	・吸入後はうがいまたは口をすすいでください。・他の医療機関を受診(ぜんそくあるいは他の病気で)するときは、この薬を使っていることを伝えてください。・ぜんそくの症状が悪化した場合は、すぐに主治医に連絡してください。
2559808M1020 662560019 強力ポステリザン(軟膏) マルホ株式会社 マルホ株式会社	1 軟膏 うすい黄色 チューブの記載:強力ポステリザン(軟膏)	・使用部位の炎症を抑え、細菌の感染を防ぐ作用があり、痔の出血・痛み・腫れ・かゆみ、また肛門周囲の湿しんや皮膚炎などの症状を軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。
2649866M1022 662640448 強力レスタミンコートゾンコーワ軟膏 興和株式会社 興和株式会社	1 軟膏剤 無色 705	炎症性、アレルギー性、細菌感染性の皮膚疾患の治療に用います。びらんやかさぶたのある湿疹・皮膚炎、膿皮症、日焼け、皮膚そう痒症、痒疹群(ストロフルス等)などに効果があります。	・生活上注意することは 衣類、装身具などに付着すると汚れなどの原因となることがあります。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2612700X1161 662610097 希ヨードチンキ	1 液 暗赤褐色	・皮膚の消毒をします。・皮膚の傷・潰瘍の殺菌・消毒をします。・歯肉、口の粘膜の消毒をします。	
東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式			
2612700X1161 662610097 希ヨードチンキ	2 液剤 暗かっ色 無し	細菌、真菌、ウイルス等を殺す働きがあります。	1. 粘膜、傷口又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないで下さい。2. マーキュロクロム液と同時に使用しないで下さい。3. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流して下さい。
2612700X1269 660408233 希ヨードチンキ . Y I	1 液剤 暗赤褐色	・皮膚の殺菌・消毒に用います。・歯肉や口腔粘膜の消毒に用います。	・栓をして、光が当たらないようにして保管して下さい。
山田製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2646722M1097 660406024 キングローン軟膏	1 軟膏剤 白色～微黄色 0.05%	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	・この薬は、光のあたらない場所に保管してください。・この薬は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化・破損する可能性があるため、これらとの接触は避けてください。
辰巳化学株式会社			
2646722M1020 662640480 キンダベート軟膏	1 軟膏 白色、半透明 0.05%	この薬は皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとり除きます。	・生活上注意することは特にありません。
キングローン軟膏 0.05%			
グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク			
1319717Q1049 661310307 クールウェイ点眼液	1 点眼液 無色～微黄色澄明 100mg 5mL	・アレルギー性結膜炎の症状（目のかゆみなど）をやわらげます。	
トーアエイヨー株式 アステラス製薬株式	容器の記載：クールウェイ点眼液、社マーク22 1		
3331700X1025 663330001 クエン酸ナトリウム	1 結晶又は粉末 無色～白色（塩味）	・診断用クエン酸ナトリウム液の調剤に用います。・矯味剤として調剤に用います。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319742Q1020 660443002 	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) クラビット点眼液 0.5% 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	・結膜炎や麦粒腫（ものもらい）など目の感染症を引き起こしている細菌を殺して感染症を治します。	
2259701G1055 620000374 	1 吸入液 クリード吸入液 1% 2 mL メディサ新薬株式会社 沢井製薬株式会社	・ぜんそくの発作を軽くするためや予防のために使われます。（ただし、いま起こっているぜんそく発作をすぐおさえるものではありません）	
2646713N1034 662640710 	1 クリーム グリジールクリーム 微黄白色 0.05% 佐藤製薬株式会社 905 佐藤製薬株式会社	いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
2646713Q1057 662640854 	1 スカルプ グリジールスカルプ にごりのある無色 0.05% 佐藤製薬株式会社 907 佐藤製薬株式会社	頭部を含むいろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
2646713M1101 662640855 	1 軟膏 グリジール軟膏 白色 0.05% 佐藤製薬株式会社 白色 佐藤製薬株式会社	いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
2357700X1183 662350004 	2 液剤 グリセリン 無色透明	・皮膚、粘膜を保護します。	
	本体識別コード：包装識別コード：		
2357700X1183 662350004 	3 液剤 グリセリン 無色透明	・直腸の粘膜を刺激して大腸の運動を活発にし、便を軟らかくして排便を促します。 ・浣腸液の調剤に用います。	・目に入らないように注意し、万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2357700X1183 662350004 	1 粘性の液 グリセリン 無色透明	・浣腸液を調製するのに用います。	
東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式			
2357700X1183 662350004 	4 液剤 グリセリン 無色透明	ひび、あかぎれをなおします。 無し	目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流してください。
2357700X1060 660431012 	1 粘性の液剤 グリセリン . O I 無色透明	・浣腸液の調剤に用います。・軟膏剤や他の外用製剤の調剤に用います。	・栓をして、光が当たらないようにして涼しい所に保管して下さい。
オリエンタル薬品工 岩城製薬株式会社			
2662701X1133 662660004 	1 液剤 グリセリンカリ液 無色透明	ひび、あかぎれをなおします。 無し	1. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流して下さい。2. 粘膜、傷口または炎症部位には使用しないで下さい。3. ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないで下さい。
2662701X1133 662660004 	3 液 グリセリンカリ液 無色透明	・手足のき裂・落屑（ひび、あかぎれ）などの荒れを防止します。	
東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式			
2662701X1133 662660004 	2 液剤 グリセリンカリ液 無色透明	・皮膚の角質を軟らかくし、ひびやあかぎれ等の症状を改善します。	・栓をして、光が当たらないようにして涼しい所に保管して下さい。
2357701K8037 662350042 	1 粘性の液 グリセリン浣腸「ム ネ」120 50% 120mL	・この薬は便秘に用いる浣腸剤です。	・腸を傷つけないよう慎重に挿入してください。・使用後は容器ごと廃棄してください。
ムネ製薬株式会社 丸石製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2357701K9025 662350043	1 粘性の液 グリセリン浣腸「ム ネ」150 50% 150mL ムネ製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は便秘に用いる浣腸剤 です。	・腸を傷つけないよう慎重に挿 入してください。・使用後は容 器ごと廃棄してください。
2357701K3035 662350040	1 粘性の液 グリセリン浣腸「ム ネ」30 50% 3 0mL ムネ製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は便秘に用いる浣腸剤 です。	・腸を傷つけないよう慎重に挿 入してください。・使用後は容 器ごと廃棄してください。
2357701K6034 662350041	1 粘性の液 グリセリン浣腸「ム ネ」60 50% 6 0mL ムネ製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は便秘に用いる浣腸剤 です。	・腸を傷つけないよう慎重に挿 入してください。・使用後は容 器ごと廃棄してください。
2357701K1059 662350048	1 液 グリセリン浣腸「ヨ シダ」 50% 吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社	・便秘、腸疾患時の排便。浣腸 のみに使用します。	
2357700X1256 660421012	1 液体 グリセリン(丸石) 無色透明 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬はかん腸液を作った り、いろいろな薬を溶かした り、軟膏の形にするために使 用します。	・湿気に注意して保管してく ださい。
2357700X1396 662350093	1 液 グリセリン「ヨシ ダ」 吉田製薬株式会社	・皮膚、粘膜を保護します。	
2649857X1020 662640092	1 軟こう剤 グリパスC 灰白色 赤褐色 藤永製薬株式会社 三共株式会社	・湿疹・皮膚炎などのかゆみや はれ、熱を抑えます。・虫ささ れ、小児ストロフルスを改善し ます。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649801M1028 662640093 グリメサゾン軟膏	1 軟こう剤 淡黄褐色ないし黄褐色	・湿疹・皮膚炎などのかゆみやはれ、熱を抑えます。 ・尋常性乾癬、虫さされを改善します。	
藤永製薬株式会社 三共株式会社	チューブ上の記載(記号) : Gm		
1319708Q1082 660406147 グルタチオン点眼液 T 2 %	1 用時溶解型点眼液 点眼剤の色：白色（粉末）、無色澄清（溶解液）キャップの色：	・初期老人性白内障の進行を抑えます。角膜の炎症などをやわらげます。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
日東メディック株式 日東メディック株式			
2616703Q1224 662610036 クレゾール石ケン液	1 液剤 黄褐色～赤褐色	・微生物で汚染された手指・皮膚、腫、排泄物などの殺菌・消毒をします。	・下水道に捨てないでください。
株式会社フヂミ製薬 メルク・ホエイ株式			
2616703Q1127 662610036 クレゾール石ケン液	1 液剤 黄褐色～赤褐色	・殺菌消毒剤です。	
日本新薬株式会社	本体識別コード：包装識別コード：		
2616703Q1267 660408062 クレゾール石ケン液 Y I	1 液剤 黄褐色～赤褐色	・手指・皮膚、医療用具、排泄物などの消毒に用います。	・原液が皮膚に付着した場合、刺激症状を起こすことがあります。その場合は、すぐに拭き取り石けん水と水でよく洗い流してください。 ・栓をして、光が当たらないようにして保管してください。
山田製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2616703Q1321 662610445 クレゾール石ケン液 「ニッコー」	1 液体 黄褐色～赤褐色	・この薬は手指・皮膚、医療用具、部屋・家具・器具・物品、排泄物、腫などを消毒します。	・必ず薄めて使用してください。 ・原液や高濃度液が皮膚についた場合には刺激を起こすことがあるので、すぐに拭き取り、石けんと水で洗い流してください。
吉田製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2655700N1060 662650057	1 クリーム剤 クロストリンクリー ム 1 % 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・水虫やカンジダ症などの原因となる真菌(カビの一種)を殺菌する作用があります。	・患部の清潔と乾燥に心がけて下さい。
2619702Q3054 662610289	1 液剤 クロヘキシン液 5 % 赤色 東洋製薬化成株式会 小野薬品工業株式会	・手指・皮膚、傷口、部屋、家具、器具、物品などを消毒し、感染を予防します。	・生活上の注意・このくすりが付着した衣類などを塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミになりますことがありますので、漂白には酸素系漂白剤をご使用ください。 ・取扱上の注意・キャップをしっかり閉めて、光を避け、室温(30度以下)で保存してください。 ・誤用をさけ、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。 ・子供の手の届かないところに保管してください。
2639802M1026 662630006	1 軟こう剤 クロマイ - P 軟膏 乳白色 三共株式会社 三共株式会社	・皮膚感染症の原因となるいる細菌を殺す働きがあります。 ・きず・やけどや手術後の二次感染に使います。	
2521701H1025 662550005	1 錠剤(直径15.0mm) クロマイ腔錠 10 0 mg 三共株式会社 三共株式会社	・腔内感染症の原因となるいる細菌を殺す働きがあります。	
1319717Q1146 660433020	1 点眼液 クロモフェロン点眼液 100mg 5mL 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会	・アレルギー性結膜炎、春季力タルの症状をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319717Q1057 661310308	7 点眼剤(5mLプラスチック容器) クロモリーク点眼液 100mg 5mL ティカ製薬株式会社 ティカ製薬株式会社	花粉症などによるアレルギー性結膜炎、春季力タルの症状を抑えます。この薬を定期的に点眼することによって症状の発現が少なく軽くなります。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
1319717Q1057 661310308	5 点眼剤 クロモリーク点眼液 100mg 5mL ティカ製薬株式会社 株式会社ニデック	・花粉症などによるアレルギー性結膜炎や春季力タルの症状を抑えます。	(保存方法を含む)・コンタクトレンズをしている人は、主治医に相談してください。 ・ふたを開けて1ヵ月経ったものは使用しないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319717Q1057 661310308  クロモリーク点眼液 10.0mg 5mL ティカ製薬株式会社 日東メディック株式	6 点眼剤（5mLプラスチック容器） 点眼液の色：無色～微黄色 透明キャップの色：白色	花粉症などによるアレルギー性結膜炎、春季力タルの症状を抑えます。この薬を定期的に点眼することによって症状の発現が少なく軽くなります。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
1319717Q1057 661310308  クロモリーク点眼液 10.0mg 5mL ティカ製薬株式会社 日東メディック株式	4 点眼液（5mLプラスチック容器） 点眼剤の色：無色～微黄色 透明キャップの色：白色	・アレルギー性結膜炎、春季力タルの現れた症状をやわらげます。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319717Q1057 661310308  クロモリーク点眼液 10.0mg 5mL ティカ製薬株式会社 株式会社ニデック	3 点眼剤（5mLプラスチック容器） 点眼液の色：無色～微黄色 透明キャップの色：白色	花粉症などによるアレルギー性結膜炎、春季力タルの症状を抑えます。この薬を定期的に点眼することによって症状の発現が少なく軽くなります。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
1319717Q1057 661310308  クロモリーク点眼液 10.0mg 5mL ティカ製薬株式会社 サンド株式会社	1 点眼剤 点眼剤の色：無色～微黄色	・アレルギー性結膜炎、春季力タルの発症を予防し、また症状が現われても軽度に抑えます。この薬を定期的に点眼することによって症状の発現が少なく軽くなっています。	アレルギーの原因がわかっている場合には、接触しないよう心がけてください。
1319717Q1057 661310308  クロモリーク点眼液 10.0mg 5mL ティカ製薬株式会社 サンド株式会社	2 点眼剤（5mLプラスチック容器） 点眼液の色：無色～微黄色 透明キャップの色：白色	花粉症などによるアレルギー性結膜炎、春季力タルの症状を抑えます。この薬を定期的に点眼することによって症状の発現が少なく軽くなります。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
1317702Q1056 660406148  クロラムフェニコール点眼液 T 5mg 日東メディック株式 日医工株式会社	2 点眼液 点眼剤の色：無色～微黄色 透明キャップの色：	・目の炎症を引き起こしている細菌を殺菌します。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1317702Q1056 660406148  クロラムフェニコール点眼液 T 5mg 日東メディック株式 日東メディック株式	1 点眼液 点眼剤の色：無色～微黄色 透明キャップの色：	・目の炎症を引き起こしている細菌を殺菌します。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 2634706Q1021 662630008	1 外用液剤 クロロマイセチン局 微黄色～淡黄色粘稠 所用 50mg	・感染症の原因となっている細菌を殺す働きがあります。	
三共株式会社 三共株式会社			
 1325701Q1029 661320004	1 外用液剤 クロロマイセチン耳 無色～微黄色粘稠 科用 5mg	・耳の感染症の原因となっている細菌を殺す働きがあります。	
三共株式会社 三共株式会社			
 2634706M1020 662630009	1 軟こう剤 クロロマイセチン軟 白色 膏 2% 20mg	・感染症の原因となっている細菌を殺す働きがあります。	
三共株式会社 三共株式会社	チューブ上の記載(記号) : C - M		
 2634705X1021 662630047	2 散剤 クロロマイセチン末 白色～黄白色	・感染症の原因となっている細菌を殺す働きがあります。	・この薬は散剤として使用する場合、誤って吸入しないようにしてください。
三共株式会社 三共株式会社			
 2634705X1021 662630047	1 散剤 クロロマイセチン末 白色～黄白色	・感染症の原因となっている細菌を殺す働きがあります。	
三共株式会社 三共株式会社			
 2633705N1023 662630012	1 クリーム ゲーベンクリーム 白色 1%	・やけど、床ずれなどの各種皮膚潰瘍（ひふかいよう）等において、患部の細菌の増殖を抑える作用があります。	
三菱ウェルファーマ チューブの記載： 263 三菱ウェルファーマ			
 2633705N1023 662630012	2 クリーム ゲーベンクリーム 白色 1%	・やけど、床ずれなどの各種皮膚潰瘍（ひふかいよう）等において、患部の細菌の増殖を抑える作用があります。	
三菱ウェルファーマ チューブの記載： 263 三菱ウェルファーマ			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319741Q1034 660443003 	1 点眼液 ケタス点眼液 0.5 mg 5 mL	・花粉症などのアレルギー性結膜炎の症状をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
2649729S2088 660453016 	2 貼付剤 (大きさ : 7 cm x 10 cm) ケトックテープ 7 cm x 10 cm	この薬は関節炎や筋肉痛の痛みやはれがある部分にはることにより、それらの症状を抑える作用があります。	・傷口や粘膜、湿しんや発しんの部位にははらないでください。・本剤をはがした後、はった部位を直射日光に当てるとかぶれ様の症状を起こすことがあるので注意してください。
株式会社昭栄 日医工株式会社			
2649729S2088 660453016 	1 貼付剤 (大きさ : 7 cm x 10 cm) ケトックテープ 7 cm x 10 cm	この薬は関節炎や筋肉痛の痛みやはれがある部分にはることにより、それらの症状を抑える作用があります。	・傷口や粘膜、湿しんや発しんの部位にははらないでください。・本剤をはがした後、はった部位を直射日光に当てるとかぶれ様の症状を起こすことがあるので注意してください。
日医工株式会社 日医工株式会社			
1319730Q1052 660422022 	2 点眼液 ケトテン点眼液 3.45 mg 5 mL	・アレルギー性結膜炎の症状をやわらげます。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
沢井製薬株式会社 沢井製薬株式会社			
1319730Q1052 660422022 	1 点眼液 ケトテン点眼液 3.45 mg 5 mL	・アレルギー性結膜炎の症状をやわらげます。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
沢井製薬株式会社 わかもと製薬株式会社			
1329705Q1042 660422023 	1 点鼻液 ケトテン点鼻液 6.048 mg 8 mL	・アレルギー性鼻炎の症状 (くしゃみ、鼻づまり、鼻水など) をやわらげます。	・この薬を使用すると眠気が起ることがありますので、車の運転など危険をともなう機械の操作はしないようにしてください。
沢井製薬株式会社 沢井製薬株式会社			
2647702N1025 662640096 	1 クリーム剤 ケナコルト A-G クリーム	・湿疹・皮膚炎などのかゆみやはれ、熱を抑えます。・乾癬、掌蹠膿疱症他を改善します。	
三共株式会社 三共株式会社	チューブ上の記載(記号) : A - G クリーム		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2647702M1020 1 軟こう剤 662640097 ケナコルト - A G軟 うすい乳白色膏 三共株式会社 三共株式会社	・湿疹・皮膚炎などのかゆみやはれ、熱を抑えます。・乾癬、掌蹠膿疱症他の改善します。	
	2646705N1030 1 クリーム剤 662640098 ケナコルト - A クリーム 0 . 1 % 三共株式会社 三共株式会社	・湿疹・皮膚炎などのかゆみやはれ、熱を抑えます。・虫さざれ、乾癬、掌蹠膿疱症他の皮膚疾患を改善します。	
	2646705M1034 1 軟こう剤 662640101 ケナコルト - A 軟膏 乳白色 0 . 1 % 三共株式会社 三共株式会社	・湿疹・皮膚炎などのかゆみやはれ、熱を抑えます。・虫さざれ、乾癬、掌蹠膿疱症他の皮膚疾患を改善します。	
	2669701M2029 1 軟膏剤 662660005 ケラチナミンコーワ 白軟膏 2 0 % 興和株式会社 興和株式会社	手や足の角化（皮膚が白くかさかさになる）、アトピー皮膚、魚鱗癖などに用い、角化した皮膚をとり除いたり、皮膚に水分を保たせ、かゆみを和らげ、皮膚をなめらかにします。	・生活上注意することは
	2634710M1042 1 軟膏剤 620000377 ゲルナート軟膏 0 . 1 % 1 m g 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・皮膚の炎症部位にいる細菌を殺菌します。	・この薬を他の人と一緒に使わないで下さい。（一つのチューブを共有しないで下さい。）
	2357701Y1027 1 液剤 660422024 ケンエーG浣腸 0 % 9 0 m L 健栄製薬株式会社 健栄製薬株式会社	便秘、腸の病気により便の出方の悪い時の排便を助けます。	1 . 規則的な排便の習慣をつけて下さい。2 . 纖維質の多い食物と水分を多くとって下さい。（野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など）3 . 適度な運動、腹部マッサージを行いうよう心がけて下さい。4 . 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等をのむと便意をもよおしやすくなります。
	2634710N1021 1 クリーム 662630013 ゲンタシンクリーム 1 m g シェリング・プラウ シェリング・プラウ	・この薬は皮膚の細菌を殺菌する働きがあります。 ・チューブ表面：ラベルを印刷	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1317706Q1020 661310055 ゲンタシン点眼液 3mL シェーリング・プラウ シェーリング・プラウ	1 点眼液 ・容器の色：黄色半透明 ・キャップの色：白色 シェーリング・プラウ シェーリング・プラウ	<ul style="list-style-type: none"> ・次のような人は使う前に主治医に相談してください。以前に薬を使用して、発しん、かゆみなどが出たことのある人。 ・ほかに薬を使っている場合（薬局で買った薬も）、その薬について主治医に伝えてください。 ・妊娠または授乳中の場合は主治医にそのことを必ず伝えください。 	
 2634710M1034 662630014 ゲンタシン軟膏 mg シェーリング・プラウ シェーリング・プラウ	1 軟膏 ・容器の色：白色～微黄色の半透明 ・チューブの色：白色 ・キャップの色：緑色 ・チューブ表面：ラベルを印刷 シェーリング・プラウ シェーリング・プラウ	<ul style="list-style-type: none"> ・この薬は皮膚の細菌を殺菌する働きがあります。 	
 1329800X1026 661320005 コールタイジン ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	1 液剤（スプレー） 液の色：無色透明ボトル の色：青色キャップの 色：白色 ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・鼻の粘膜の充血と炎症を抑え、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの鼻の症状を改善します。 	特にありません。
 7121706X1074 667120004 ゴマ油 メルク・ホエイ株式	1 油 微黄色透明 メルク・ホエイ株式	<ul style="list-style-type: none"> ・軟膏、リニメントの基剤として用います。 	
 1319802Q2047 661310301 コリマイC点眼液 5mL 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 水性点眼剤 (成分)無色～微黄色透明 (容器)キャップ-うす紫本体-透明 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	<p>この薬は2種の抗生物質が配合されており、その抗菌作用によって、混合感染などのおそれのある眼の感染症に効果があります。</p>	<p>お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまづげに触れない様に注意してください。コンタクトレンズを使用している人は、一度レンズをはずしてから点眼し、5～10分間位してから再び使用してください。</p>
 2646706N1026 662640115 コルテスクリーム 1% 大正製薬株式会社 大正富山医薬品株式	1 クリーム剤 白色 チューブ本体の記載：T A I S H O 2 0 3	<ul style="list-style-type: none"> ・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみ等の症状をとります。また、湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされ等に用いたりします。 	
 2646706M2027 662640116 コルテス軟膏 1% 白色 大正製薬株式会社 大正富山医薬品株式	1 軟膏剤 チューブ本体の記載：T A I S H O 2 0 2	<ul style="list-style-type: none"> ・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみ等の症状をとります。また、湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされ等に用いたりします。 	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2619716Q1061 662610525 コンクノール液 1 0 % メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式	1 液剤 微黄色～淡黄色	・微生物で汚染された手指・皮膚などの殺菌・消毒をします。 ・手術部位などの殺菌・消毒をします。 ・家具・器具・物品などの消毒をします。	
2619716Q1061 662610525 コンクノール液 1 0 % メルク・ホエイ株式 花王株式会社	2 液剤 微黄色～淡黄色	・微生物で汚染された手指・皮膚などの殺菌・消毒をします。 ・手術部位などの殺菌・消毒をします。 ・家具・器具・物品などの消毒をします。	
1315701Q3025 661310061 コンドロンデキサ液 0.1 % 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 水性点眼剤 (成分)無色透明(容器)キャップ・灰色本体 - 透明	・この薬は目の炎症、アレルギーを抑えます。(眼科用)	・お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまづけに触れない様に注意してください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、1度レンズをはずしてから点眼し、5～10分間位してから再び使用してください。
1319709Q3039 661310283 コンドロン点眼液 1% 5mL 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 水性点眼剤 (成分)無色透明(容器)キャップ・橙色本体 - 透明	この薬は角膜の保護のために用いられます。	お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまづけに触れない様に注意してください。 コンタクトレンズを使用している人は、1度レンズをはずしてから点眼し、5～10分間位してから再び使用してください。
1319709Q4043 661310287 コンドロン点眼液 3% 5mL 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 水性点眼剤 (成分)無色透明(容器)キャップ・橙色本体 - 透明	この薬は角膜の保護のために用いられます。	お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまづけに触れない様に注意してください。 コンタクトレンズを使用している人は、1度レンズをはずしてから点眼し、5～10分間位してから再び使用してください。
2649727N1020 662640608 コンベッククリーム 白色 5 % 三菱ウェルファーマ チュープの記載： 266 三菱ウェルファーマ	1 クリーム	・皮ふ炎、かぶれ、湿しん、かゆみなどの症状を改善します。	
2649727N1020 662640608 コンベッククリーム 白色 5 % 三菱ウェルファーマ チュープの記載： 266 三菱ウェルファーマ	2 クリーム	・皮ふ炎、かぶれ、湿しん、かゆみなどの症状を改善します。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649727M1024 662640124	2 軟膏	・皮ふ炎、かぶれ、湿しん、かゆみなどの症状を改善します。	
	コンベック軟膏 5%	白色～帯黄白色半透明	
三菱ウェルファーマ	チューブの記載： 265		
三菱ウェルファーマ			
2649727M1024 662640124	1 軟膏	・皮ふ炎、かぶれ、湿しん、かゆみなどの症状を改善します。	
	コンベック軟膏 5%	白色～帯黄白色半透明	
三菱ウェルファーマ	チューブの記載： 265		
三菱ウェルファーマ			
2649724M1020 662640131	1 軟膏	乾燥したりカサカサした皮ふを治療します。	・生活上注意することは特にありません。
	ザーネ軟膏 5,0 帯黄白色 00単位		
サンノーバ株式会社			
エーザイ株式会社			
1319711Q1025 661310064	1 点眼剤	・目の炎症を起こす原因菌を殺します。	
	サイアジン点眼液 4%	点眼剤の色：無色	
山之内製薬株式会社			
アステラス製薬株式			
1311701Q1031 661310066	1 点眼剤（10mLプラスチック容器）	・目の中の筋肉に働いて瞳孔（ひとみ）を広げたり、ピント調節を休ませたりする作用があります。	・点眼後はまぶしく感じたり、近くの物がぼやけて見えます。このような症状がある場合は、「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。また、普段よりまぶしく感じますので、日光やその他の明るい光から目を守るために、昼間の外出時はサングラスをかけるなどしてください。
	サイプレジン 1% 点眼液	点眼剤の色：無色透明 キャップの色：クリーム色	
参天製薬株式会社			
参天製薬株式会社			
2661700X1131 662660009	1 液	・洗浄液、収れん液の調剤に用います。 酢酸 無色透明	・矯味の目的で用います。
東豊薬品株式会社			
メルク・ホエイ株式			
2661700X1298 662660036	1 液体	・この薬は洗浄したり、傷口を治すために使用します。 酢酸（日興製薬） 無色透明	・また、他の薬のpHを調節し、味を変え飲みやすくするために混ぜて使用します。
日興製薬株式会社			
丸石製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1315705M1045 660406153 	1 眼軟膏 酢酸ブレドニゾロン 0.25%眼軟膏 T 日東メディック株式 日東メディック株式	・目の炎症やアレルギーによる 症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副 作用を防ぐために定期的な検査 が必要です。主治医の指示に 従って検査を受けてください。 ・コンタクトレンズを使用 している人は、主治医に相談し てください。
2661700X1310 662660038 	1 液 酢酸「ヨシダ」 無色	・洗浄液、収れん液の調剤、ま た緩衝・矯味の目的で調剤に用 います。	
吉田製薬株式会社			
	1319730Q1028 661310269 ザジテン点眼液 3.45mg 5mL 三共株式会社 ノバルティス ファ	1 点眼剤 5mL プラス チック容器 点眼液の色：無色 - 微 黄色澄明キャップの色 ：緑色	・アレルギーによって出てくる 物質の働きを抑え、アレルギー 性結膜炎の症状を改善します。
	1319730Q2024 620002309 ザジテン点眼液 UD 0.05% 0.2 7.6mg 0.4mL 三共株式会社 ノバルティス ファ	1 点眼剤 0.4mL プラ スチック容器 無色 - 微黄色澄明	・アレルギーによって出てくる 物質の働きを抑え、アレルギー 性結膜炎の症状を改善します。
	1329705Q1026 661320022 ザジテン点鼻液 6.048mg 8mL 日本チバガイギー株 ノバルティス ファ	1 液剤（点鼻用） すみきった無色 ~ 微黄色	アレルギー性鼻炎のくしゃみ、 鼻みず、鼻づまりなどをやわら げます。
	2649710M2114 662640572 サトウザルベ 10 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	1 軟膏 白色 ~ 淡黄色におい：わ ずかに特有なにおいを有 する	下記の皮膚疾患の炎症を抑える ほか、皮膚を保護したり細菌感 染を予防したりします。外傷、 熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛 門周囲のかゆみ、白癬、面皰、 せつ、ようその他皮膚疾患によ るびらん・潰瘍・湿潤面
	7121707X1044 667120005 サラシミツロウ 東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式	1 固形（塊） 白色 ~ 帯黃白色	・軟膏の基剤として用います。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	 6219700J1026 666210001 サラゾピリン坐剤 500mg	1 坐剤（直径 8 ~ 11 mm、長さ 30 mm） 黄～黄褐色	・サルファ剤の一種で、腸の炎症を抑える作用があり、小腸、大腸の炎症性の病気の治療に使われます。
ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	包装への記載：S a l a z o p y r i n 5 0 0 m g P h a r m a c i a &		・日光に過敏になり、ひどい日焼けや発しん、かゆみなどがあらわれることがあるので、太陽に長時間あたったり、紫外線ランプを使ったりしないでください。・尿が黄赤色に着色することがあります。・ソフトコンタクトレンズが黄色に着色することがあります。
	 6219700J1026 666210001 サラゾピリン坐剤 500mg	2 坐剤（直径 8 ~ 11 mm、長さ 30 mm） 黄～黄褐色	・サルファ剤の一種で、腸の炎症を抑える作用があり、小腸、大腸の炎症性の病気の治療に使われます。
ファイザー株式会社 三菱ウェルファーマ	包装への記載：S a l a z o p y r i n 5 0 0 m g P h a r m a c i a &		・日光に過敏になり、ひどい日焼けや発しん、かゆみなどがあらわれることがあるので、太陽に長時間あたったり、紫外線ランプを使ったりしないでください。・尿が黄赤色に着色することがあります。・ソフトコンタクトレンズが黄色に着色することがあります。
	 1143700J5029 661140049 サリチゾン坐薬 75 0 750mg	1 坐剤	・熱を下げ、痛みをやわらげます。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。
昭和薬品化工株式会社 昭和薬品化工株式会社	S D S A L I · S U P · 750		
	 2652700X1108 662650015 サリチル酸	1 結晶 白色	・皮膚の表面が厚くなったり、魚のうろこのようになった各種の皮膚病や、真菌（かび）の感染による各種の皮膚病を改善します。・いぼ、たこ、うおの目をやわらかくしてとります。
	 2652700X1078 660421082 サリチル酸（丸石）	1 結晶または結晶性の粉末 白色	・この薬は真菌を殺す働きがあります。・この薬は皮膚をやわらかくする働きがあります。 ・患部が化膿している場合は主治医に相談してください。・長期間使用しても効果が出ないときは主治医に相談してください。・広い範囲や目には使用しないでください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
	 2641700X1023 662640125 サリチル酸メチル	1 液 無色～微黄色	・関節痛、筋肉痛の痛みをやわらげ、打撲、捻挫のはれ・痛みをやわらげます。
東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式			
	 2641700X1031 662640125 サリチル酸メチル	1 液 無色～微黄色	・関節痛、筋肉痛の痛みをやわらげ、打撲、捻挫のはれ・痛みをやわらげます。
メルク・ホエイ株式			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2399801E1029 662310029 サリベート	1 噴霧式エアゾール剤 50 g 無色	この薬は、唾液の分泌が少なく、口が渴くときに用いる薬です。	
帝人ファーマ株式会 帝人ファーマ株式会			
2649725N1063 662640490 サリベドールクリー	1 クリーム ム 5 %	・湿疹、接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、日光皮膚炎などの各種の皮膚病の炎症やはれ、痛みなどの症状を改善いたします。	
メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式			
2649725M1068 662640491 サリベドール軟膏	1 軟膏 5 %	・湿疹、接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、おむつかぶれ、日光皮膚炎、やけどなどの各種の皮膚病の炎症やはれ、痛みなどの症状を改善いたします。	
メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式			
2399708A1020 662310032 サルコート	1 外用カプセル剤(噴霧剤)(長径:約18mm,短径:約6mm) 50 μ g	口内炎の薬です。	
帝人ファーマ株式会 帝人ファーマ株式会	サルコート 帝人ファ マ		
2254700G4029 660422029 サルタノールインヘ ラー	1 エアゾール吸入剤(アルミ缶入り) 0.16% 1 3.5 mL	この薬は狭くなった気管支を広げることにより喘息、肺気腫、気管支炎、肺結核による症状(息苦しさ、咳など)をしめ、呼吸を楽にします。喘息患者さんの場合:この薬は喘息の発作(呼吸困難、激しい咳など)が起こったときのみ使用して下さい。	生活上の注意喘息患者さんの場合:正しく使用しても効果が不十分な場合は、喘息が悪化している可能性がありますので、直ちに医師に相談して下さい。
0.12% アボットジャパン株 アボットジャパン株	ザルックスクリーム H C 1 8		
2646724N1024 662640575 ザルックスクリーム	2 クリーム状軟膏剤 0.12%	・この薬は皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとる効果があります。	該当しません
アボットジャパン株 アボットジャパン株	H C 1 8		
2646724N1024 662640575 ザルックスクリーム	1 クリーム状軟膏剤 0.12%	・この薬は皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとる効果があります。	該当しません
アボットジャパン株 アボットジャパン株	H C 1 8		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646724M1029 662640576  ザルツクス軟膏 0.12%	1 軟膏剤 白色～微黄色半透明 アボットジャパン株 アボットジャパン株	・この薬は皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとる効果があります。	該当しません
2646724M1029 662640576  ザルツクス軟膏 0.12%	2 軟膏剤 白色～微黄色半透明 アボットジャパン株 アボットジャパン株	・この薬は皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとる効果があります。	該当しません
1317703Q1026 661310068  ザルペリン点眼用 1.0mg 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	1 点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：青色	・結膜炎やものもらい等の眼感染症を引き起こしている細菌を殺菌します。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
2646730N1038 660453017  サレックスクリーム 0.05% 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 クリーム剤 色：白色～微黄白色 チューブの色：白色 (帯：灰色)キャップの	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646730M1032 660453018  サレックス軟膏 0.05% 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 軟膏剤 色：白色～微黄色・半透明 チューブの色：淡青色 (帯：灰色)キャップの	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2649719M1127 662640712  サロダン軟膏 1% 辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社	1 ゼリー状の軟膏剤 黄色	・炎症や痛みをやわらげます。 ・外傷後のはれや痛みをやわらげます。	
2171700S2067 660453019  サワドールテープ S 4.0mg 沢井製薬株式会社 沢井製薬株式会社	1 貼付剤 (5.8cm × 8.7cm) 白色 袋及びシート記載：SW - 922	・心臓への酸素の補給を助け、心臓の負担を軽くします。 ・狭心症発作（胸の圧迫感、痛みなどの症状）の予防に使われますが、いま起こっている発作の症状をやわらげるものではありません。	・この薬を使用すると頭痛などの副作用により、注意力、集中力、反射運動能力などの低下が起こることがありますので、このような場合には車の運転などの危険をともなう機械の操作はしないようにしてください。 ・この薬を使用しているときにはアルコール類を摂取すると血圧が低下することがあるので、注意してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649708X1087 662640451 酸化亜鉛	1 無晶性の粉末 白色 無し	軽度の皮膚病変の炎症をおさえ保護します。	1. 広範囲または重度のやけどには使用しないで下さい。2. 患部が湿潤している場合は使用しないで下さい。3. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流して下さい。4. 誤って吸入しないように注意して下さい。
2649708X1168 660421077 酸化亜鉛(丸石)	1 粉末 白色	・この薬は炎症を起こしている部分などを保護し、炎症を抑える働きがあります。	
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2649708X1257 662640815 酸化亜鉛「ヨシダ」	1 粉末 白	・皮膚炎等の炎症を抑えたり、保護したりします。	
吉田製薬株式会社			
1319710Q2027 661310288 サンコバ点眼液 0.02% 5mL	1 点眼剤(5mLプラスチック容器) 点眼剤の色:紅色透明 キャップの色:赤	・目のピント調節機能に作用して、その機能回復を早めます。	・あやまって衣類につくとしみになることがあります。このような場合はしみを残さないため、なるべく早めに水洗いしてください。
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
1319716Q4027 661310298 サンチンク点眼液 0.2% 5mL	1 点眼剤(5mLプラスチック容器) 点眼剤の色:無色透明 キャップの色:灰白色	・収れん作用により、目の炎症を抑えます。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
1315700M1026 661310073 サンテゾーン0.0 5%眼軟膏	1 眼軟膏(3.5gチューブ) 眼軟膏の色:白色~微黄色 キャップの色:白	・この薬の有効成分はステロイドと呼ばれています。ステロイドは炎症を抑える作用が強く、目のいろいろな炎症に用います。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
1315701Q1081 620000379 サンテゾーン点眼液 (0.02%)	1 点眼剤(5mLプラスチック容器) 点眼剤の色:無色~淡黄色 透明キャップの色:極うすい赤紫	・この薬の有効成分はステロイドと呼ばれています。ステロイドは炎症を抑える作用が強く、目のいろいろな炎症に用います。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1315701Q3033 661310074 サンテゾーン点眼液 (0.1%) 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色：無色～淡黄色 色透明キャップの色：極度の紫	・この薬の有効成分はステロイドと呼ばれています。ステロイドは炎症を抑える作用が強く、目のいろいろな炎症に用います。	
 1317709Q1023 661310075 サンテマイシン点眼液 3 mg 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色：無色～微黄色 色透明キャップの色：極度の橙	・結膜炎や麦粒腫（ものもらい）など目の感染症を引き起こしている細菌を殺して感染症を治します。	
 1312701Q1039 661310331 サンピロ 0.5% 5 mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色：無色透明 色透明キャップの色：極度の青紫	・緑内障の治療などに用いる目薬で、目の中の筋肉に働いて瞳孔（ひとみ）を小さくしたり（縮瞳）、眼圧（目の中の圧力）を下げる作用があります。	・点眼後、薄暗く感じたり、暗いところで物が見えにくくなったりすることがあるので、このような症状がみられるときには「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。
 1312701Q2043 661310332 サンピロ 1% 5 mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色：無色透明 色透明キャップの色：度の青紫	・緑内障の治療などに用いる目薬で、目の中の筋肉に働いて瞳孔（ひとみ）を小さくしたり（縮瞳）、眼圧（目の中の圧力）を下げる作用があります。	・点眼後、薄暗く感じたり、暗いところで物が見えにくくなったりすることがあるので、このような症状がみられるときには「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。
 1312701Q3040 661310333 サンピロ 2% 5 mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色：無色透明 色透明キャップの色：明るい青紫	・緑内障の治療などに用いる目薬で、目の中の筋肉に働いて瞳孔（ひとみ）を小さくしたり（縮瞳）、眼圧（目の中の圧力）を下げる作用があります。	・点眼後、薄暗く感じたり、暗いところで物が見えにくくなったりすることがあるので、このような症状がみられるときには「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。
 1312701Q4020 661310334 サンピロ 3% 5 mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色：無色透明 色透明キャップの色：強い青紫	・緑内障の治療などに用いる目薬で、目の中の筋肉に働いて瞳孔（ひとみ）を小さくしたり（縮瞳）、眼圧（目の中の圧力）を下げる作用があります。	・点眼後、薄暗く感じたり、暗いところで物が見えにくくなったりすることがあるので、このような症状がみられるときには「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。
 1312701Q5034 661310335 サンピロ 4% 5 mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色：無色透明 色透明キャップの色：青紫	・緑内障の治療などに用いる目薬で、目の中の筋肉に働いて瞳孔（ひとみ）を小さくしたり（縮瞳）、眼圧（目の中の圧力）を下げる作用があります。	・点眼後、薄暗く感じたり、暗いところで物が見えにくくなったりすることがあるので、このような症状がみられるときには「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
4223700J2069 664210006 	1 肛門坐剤 サンフラールズボ 750mg	・癌細胞が増えるのを抑えるはたらきがあります。	・生活上注意することは効果や副作用を確かめるために必ず定期的に受診して下さい。
旭化成ファーマ株式 旭化成ファーマ株式	151		
1315706Q2021 661310083 	1 点鼻・点耳剤(5mLプラスチック容器) サンベタゾン液 0.1%	・この薬の有効成分はステロイドと呼ばれており、鼻や耳の炎症やアレルギー反応を抑えます。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
1315706Q2021 661310083 	2 点眼剤(5mLプラスチック容器) サンベタゾン液 0.1%	・この薬の有効成分はステロイドと呼ばれています。ステロイドは炎症を抑える作用が強く、目のいろいろな炎症に用います。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
2611700Q1038 660433029 	1 液 次亜塩6%「ヨシダ」	・殺菌消毒剤です。 微淡黄緑色透明	
吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社			
2649873M1022 662640544 	2 軟膏 紫雲膏「マルイシ」	・この薬はやけどや痔(じ)の痛みを和らげ、肛門の亀裂を治療する働きがあります。	・口に入れたり飲むことはやめてください。・目には使用しないでください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2649873M1022 662640544 	1 軟膏 紫雲膏「マルイシ」	・この薬はやけどや痔(じ)の痛みを和らげ、肛門の亀裂を治療する働きがあります。	・口に入れたり飲むことはやめてください。・目には使用しないでください。
丸石製薬株式会社 大杉製薬株式会社			
2399706M1044 662310019 	1 軟膏剤 歯科用(口腔用)アフタゾロン 0.1%	・口内炎や舌炎に効く薬です。 容器【キャップ:白色、 本体:白色(3g)グリーム色(5g)】、内	・品質を保つため他の容器に移しかえないでください。・なるべく、毎食後や寝る前に塗ってください。
昭和薬品化工株式会 昭和薬品化工株式会			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1325703Q1028 661320018 耳科用ホスミシンS 30mg(溶解後 の液として) 明治製菓株式会社 明治製菓株式会社	粉末／液(添付溶解液) 粉末の色：白色・結晶性 添付溶解液の色：無色澄 明	病気の原因となる細菌を殺す働きがあります。	・生活上注意することは、点耳にのみ使用してください。点眼してはいけません。 ・冷蔵庫で保管した場合は、体温近くまで液の温度が戻ってから使用してください。
1319726Q1030 660412025 ジクロフェナック点 眼液T 0.1% 東亜薬品工業株式会 日東メディック株式	点眼液(5mLプラス チック容器) 点眼剤の色：無色澄明 キャップの色：空色	・白内障手術後の炎症や合併症 を防止します。	・コンタクトレンズを使用して いる人は、主治医に相談してく ださい。
2260701F1050 662230022 ジサニジンガーグル 7% 大洋薬品工業株式会 大洋薬品工業株式会	含嗽液 黒かっ色	のどや口の中の細菌、真菌、ウ イルスを消毒する薬です。	あやまって飲んでしまった場合 は、コップ1杯の牛乳か卵白の 水割りを飲んでください。衣服 等についてしまった場合は、水 で洗ってください。眼に入らない ように注意してください。 入った場合には、水でよく洗い 流してください。銀を含む義歯 (入れ歯)が着色することがあ ります。直射日光をさけて保存 してください。
1317711Q1020 661310213 シセブチン点眼液 3mg シェリング・プラウ シェリング・プラウ	点眼液 ・容器の色：黄色半透 明・キャップの色：黄色	・この薬は細菌を殺菌し、目の 感染症をなおします。	
2171701S6024 660444022 ジドレンテープ 7mg 9.6cm2 東和薬品株式会社 三菱ウェルファーマ	硬膏剤(縦：32mm・ 横：34mm) 無色半透明	・胸が重苦しく圧迫感があつた り、または締めつけられるよう な胸痛(狭心症)の発作の予防 に用います。	血圧低下作用が増強するこ とがありますのでお酒は控えて下 さい。注意力、集中力、反射運動 能力などが低下することがあり ますので自動車の運転などの危 険を伴う機械の操作は控えて下 さい。
2171701S6024 660444022 ジドレンテープ 7mg 9.6cm2 東和薬品株式会社 東和薬品株式会社	硬膏剤(縦：32mm・ 横：34mm) 無色半透明	・胸が重苦しく圧迫感があつた り、または締めつけられるよう な胸痛(狭心症)の発作の予防 に用います。	血圧低下作用が増強するこ とがありますのでお酒は控えて下 さい。注意力、集中力、反射運動 能力などが低下することがあり ますので自動車の運転などの危 険を伴う機械の操作は控えて下 さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1147700J3050 661140203 	2 坐剤（長さ約28.3m） ジフェナック坐剤 50mg 小林化工株式会社 小林化工株式会社	熱を下げる働きがあります。炎症や腫れ、こわばり、痛みを和らげる働きもあります。急性上気道炎のときの熱が、他のくすりで下がらなかつた場合に、緊急に用いたりします。	解熱薬は受診したときの病態に合わせて処方されています。家庭に残っている解熱薬を医師の指示なしに使用しないでください。上気道炎（特にインフルエンザ）では、急激に病気が進行することがあります。病状に注意し、解熱薬をむやみに使用せずに、異常を認めた場合は直ちに主治医に相談してください。この薬を使用すると、眠気、めまい、霧視があらわれることがありますので、車の運転や高い所での作業、危険をともなう機械の操作などは避けてください。タバコ、アルコール類、コーヒー類はこの薬の胃腸障害作用を強める心配がありますので、量を控えるか避けてください。高温（35以上）で溶けて変形します。なるべく冷蔵庫（15以下）で保管してください。一度溶けた物は有効成分の片よりを生じますので、切って使うことはできません。子どもの手の届かないところに置いてください。
1147700J3050 661140203 	1 坐剤（長さ約28.3m） ジフェナック坐剤 50mg 小林化工株式会社 小林化工株式会社	炎症や腫れ、こわばり、痛みを和らげる働きがあります。熱を下げる働きもあります。	この薬を使用すると、眠気、めまい、霧視があらわれることがありますので、車の運転や高い所での作業、危険をともなう機械の操作などは避けてください。飲み込んだり、口の中に入れたりしないでください。タバコ、アルコール類、コーヒー類はこの薬の胃腸障害作用を強める心配がありますので、量を控えるか避けてください。高温（35以上）で溶けて変形します。なるべく冷蔵庫（15以下）で保管してください。一度溶けた物は有効成分の片よりを生じますので、切って使うことはできません。子どもの手の届かないところに置いてください。
2646723N1020 662640559 	1 クリーム ジフラールクリーム 白色 0.05% 山之内製薬株式会社 アステラス製薬株式	・炎症やアレルギー反応を抑え、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。 容器表面の記載：ジフラールクリーム，5g(10g), 0.05%，ク	この薬を使用すると、眠気、めまい、霧視があらわれることがありますので、車の運転や高い所での作業、危険をともなう機械の操作などは避けてください。飲み込んだり、口の中に入れたりしないでください。タバコ、アルコール類、コーヒー類はこの薬の胃腸障害作用を強める心配がありますので、量を控えるか避けてください。高温（35以上）で溶けて変形します。なるべく冷蔵庫（15以下）で保管してください。一度溶けた物は有効成分の片よりを生じますので、切って使うことはできません。子どもの手の届かないところに置いてください。
2646723M1024 662640560 	1 軟膏 ジフラール軟膏 白色 0.05% 山之内製薬株式会社 アステラス製薬株式	・炎症やアレルギー反応を抑え、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。 容器表面の記載：ジフラール軟膏，5g(10g), 0.05%，軟膏他	この薬を使用すると、眠気、めまい、霧視があらわれることがありますので、車の運転や高い所での作業、危険をともなう機械の操作などは避けてください。飲み込んだり、口の中に入れたりしないでください。タバコ、アルコール類、コーヒー類はこの薬の胃腸障害作用を強める心配がありますので、量を控えるか避けてください。高温（35以上）で溶けて変形します。なるべく冷蔵庫（15以下）で保管してください。一度溶けた物は有効成分の片よりを生じますので、切って使うことはできません。子どもの手の届かないところに置いてください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649715X1052 662640452 次没食子酸ピスマス	1 粉末 黄色 無し	ただれでいる皮膚を乾燥させて保護します。	1. 広範囲には使用しないで下さい。2. 誤って吸入しないように注意して下さい。3. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流してください。
2649715X1052 662640452 次没食子酸ピスマス	2 散剤(粉末) 黄色	・(内服)下痢をとめる薬です。 ・(外用)皮膚のただれや痔を乾燥させ改善を早める薬です。	
	本体識別コード: 包装識別コード:		
2649715X1052 662640452 次没食子酸ピスマス	4 粉末 黄色 無し	下痢をなおします。	1. 他の医師を受診するときは、この薬をのんでいることを伝えて下さい。2. 便の色が黒くなることがあります。
2649715X1052 662640452 次没食子酸ピスマス	3 粉末 黄色	・内用: 下痢をおさえます。	便が黒くなることがあります が、心配はありません。
2649715X1125 660421081 次没食子酸ピスマス(丸石)	1 粉末 黄色	・この薬は下痢を止める働きがあります。(内服)・この薬は皮膚のただれでいる部分や痔(じ)を起こしている部分を乾燥させ、保護し、治す働きがあります。(外用)	内服・この薬を飲むと、便が黒くなることがあります。・浣腸には使用しないでください。・長期にわたって飲まないでください。外用・患部が化膿している場合は適切な処置を行った後、使用してください。・広い範囲や目に使用しないでください。・誤って吸入しないように注意してください。
2559813J1050 662550033 ジボラン坐剤	1 紡すい形坐剤 白色～帯黄白色	・内痔核(いぼ痔)の症状(出血、痛み、はれ)を改善します。	お尻はいつも清潔にしましょう。特に入浴は肛門の血液循環をよくしますので、効果的です。排便のとき、無理にいきまないようにしましょう。
大正薬品工業株式会 大正薬品工業株式会	T Y K 2 0 8 Z i b o l a n		
2646708N1050 662640132 シマロンクリーム	1 クリーム 0.05%	・湿疹、乾癬などの各種の皮膚病の炎症やかゆみ、はれ、痛みなどの症状を改善します。	
東興薬品工業株式会 アステラス製薬株式			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646708N1068 662640133  シマロンゲル 0.5%	1 ゲル	湿疹、乾癬などの各種の皮膚病の炎症やかゆみ、はれ、痛みなどの症状を改善します。	
東興薬品工業株式会 アステラス製薬株式			
2646708M1062 662640134  シマロン軟膏 0.5%	1 軟膏	湿疹、乾癬などの各種の皮膚病の炎症やかゆみ、はれ、痛みなどの症状を改善します。	
東興薬品工業株式会 アステラス製薬株式			
2645700Q1141 662640453  純生カンフル精	2 液剤 透明	・局所刺激、血行の改善、消炎、鎮痛、鎮痒などの作用により、筋肉痛、挫傷、打撲、捻挫、軽度の凍傷、凍瘡、皮膚の痒みなどを改善します。	
2645700Q1141 662640453  純生カンフル精	1 液剤 透明	1. 筋肉痛、うちみ、ねんざ、しもやけ、打撲の炎症をおさえ、痛みをとります。2. かゆみをおさえます。	1. 湿潤面への使用はさけて下さい。2. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流して下さい。
	無し		
2663700X1047 660408226  硝酸銀・YI	1 結晶 無色	・淋菌による新生児の結膜炎を予防します。	
岩城製薬株式会社			
2663700X1039 662660062  硝酸銀「ホエイ」	1 結晶 光沢のある無色又は白色	・淋菌による新生児の結膜炎(膿漏眼)を予防する働きをします。	
メルク・ホエイ株式			
2619812X1023 662610148  消毒用(オ)アルコール	1 液剤 微青色透明	・手指・皮膚の消毒に用います。・医療用具の消毒に用います。	・火気厳禁(引火性および爆発性がありますので、火気には十分注意して下さい。)・蒸気を吸入しないようにして下さい。・傷のある皮膚や粘膜に使用すると、刺激感がありますので使用しないで下さい。・しっかりと栓をして、光が当たらないように保存して下さい。
オリエンタル薬品工 岩城製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2615701Q1210 662610150 消毒用イソプロアル コール . 50 (オリ エンタル) 50 % オリエンタル薬品工 岩城製薬株式会社	1 液剤 無色透明	・手指・皮膚の消毒に用います。 ・医療用具の消毒に用います。	・火気厳禁（引火性および爆発性がありますので、火気には十分注意して下さい。）・蒸気を吸入しないようにして下さい。・傷のある皮膚や粘膜に使用すると、刺激感がありますので使用しないで下さい。・しっかり栓をして、光が当たらないように保存して下さい。
2615701Q2054 662610313 消毒用イソプロアル コール . 70 (オリ エンタル) 70 % オリエンタル薬品工 岩城製薬株式会社	1 液剤 無色透明	・手指・皮膚の消毒に用います。 ・医療用具の消毒に用います。	・火気厳禁（引火性および爆発性がありますので、火気には十分注意して下さい。）・蒸気を吸入しないようにして下さい。・傷のある皮膚や粘膜に使用すると、刺激感がありますので使用しないで下さい。・しっかり栓をして、光が当たらないように保存して下さい。
2615703X1116 662610105 消毒用エタノール	1 液剤 無色透明	・殺菌消毒剤です。	本体識別コード：包装識別コード：
2615703X1116 662610105 消毒用エタノール	2 液剤 無色透明	・手指・皮膚の消毒に用います。 ・手術部位の消毒に用います。 ・医療用具の消毒に用います。	・火気厳禁（引火性および爆発性がありますので、火気には十分注意して下さい。）・蒸気を吸入しないようにして下さい。・傷のある皮膚や粘膜に使用すると、刺激感がありますので使用しないで下さい。・しっかり栓をして、光が当たらないように保存して下さい。
2615703X1116 662610105 消毒用エタノール	3 液 無色透明	・手指・皮膚の消毒をしま す。 ・手術部位の皮膚の消毒をし ます。 ・医療用具の消毒をし ます。	
2615703X1116 662610105 消毒用エタノール	4 液剤 無し	細菌、真菌、ウイルス等を殺す 働きがあります。	1. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。2. ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないで下さい。3. 傷および粘膜には使用しないで下さい。4. 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。
2615705Q1048 620000382 消毒用エタノール液 I P	1 液剤 無色透明	細菌、真菌、ウイルス等を殺す 働きがあります。	1. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。2. ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないで下さい。3. 傷および粘膜には使用しないで下さい。4. 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。 5. この薬は飲用しないよう注意して下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2615703X1400 662610390 消毒用エタノール 「ヒシヤマ」	2 液剤 ニプロファーマ株式 大日本住友製薬株式	・細菌、真菌、ウイルス等を殺す働きがあります。	・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。 ・広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。 ・火気には十分気をつけて下さい。
2615703X1400 662610390 消毒用エタノール 「ヒシヤマ」	1 液剤 ニプロファーマ株式 ニプロファーマ株式	・細菌、真菌、ウイルス等を殺す働きがあります。	・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。 ・広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。 ・火気には十分気をつけて下さい。
2615703X1272 660421038 消毒用エタノール (丸石)	1 液体 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は手指、皮膚および医療用具を消毒します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。 ・刺激がありますので、傷のある皮膚や粘膜には使用しないでください。
2615703X1442 662610394 消毒用エタノール 「ヨシダ」	1 液 吉田製薬株式会社	・殺菌消毒剤です。	
2615703X1442 662610394 消毒用エタノール 「ヨシダ」	2 液 吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社	・殺菌消毒剤です。	
2619810X1024 662610106 消毒用ヒシヤマアル コール	1 液剤 ニプロファーマ株式 ニプロファーマ株式	・細菌、真菌、ウイルス等を殺す働きがあります。	・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。 ・広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。 ・火気には十分気をつけて下さい。
2619715Q1024 620001559 消毒用フェノール水 「ヨシダ」	1 液 吉田製薬株式会社	・殺菌消毒剤です。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1329707Q2021 660470001 小児用フルナーゼ点鼻液 2.5% 4mL グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク	1 鼻内に噴霧する液剤 オレンジ色 容器底面の記載：G S F N J r 2 5	このくすりは鼻の粘膜の炎症を抑え、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等の鼻症状を改善します。このくすりは使用してすぐに鼻症状を改善させるくすりではありません。通常、十分な効果が現れるには数日かかります。	
 2649726N1041 662640140 ジルダザッククリー△ 3%	1 クリーム剤 白色 △ 3%	・皮膚の炎症を抑えたり、潰瘍を治療する塗り薬です。	・患部は常に清潔に保つようにして下さい。
 2649726M1046 662640142 ジルダザック軟膏 3%	1 軟膏剤 白色～淡黄白色 △ 3%	・皮膚の炎症を抑えたり、潰瘍を治療する塗り薬です。	・患部は常に清潔に保つようにして下さい。
 6250700M1090 660444023 シルベラン軟膏 3%	1 軟膏 白色	・病気の原因であるウイルスの増殖を抑制し、皮ふ症状を改善します。	
 前田薬品工業株式会社 メリク・ホエイ株式	MY 250		
 1319808Q2028 660407084 人工涙液マイティア 5mL	1 点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：白色キャップ上面：MT	・涙の補充をします。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 7122704X1080 667120029 親水軟膏	2 軟膏 白色	・この薬は皮膚を保護する働きがあります。また、いろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。	
 7122704X1080 667120029 親水軟膏	3 軟膏 白色	・手足のひび、あかぎれ、皮膚のあれなどに用いて、皮膚を保護します。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 形
診療コード 色
名称 記号
製造会社
販売会社

効能効果

注意事項

7122704X1080	1	軟膏	・皮膚を保護します。	
667120029				
親水軟膏		白		
				
7122704X1129	2	クリ - ム	・皮膚を保護します。・軟膏の基剤として用います。	
667120057				
親水軟膏「ホエイ」		白色		
				
メルク・ホエイ株式				
ニプロファーマ株式				
7122704X1129	3	クリ - ム	・皮膚を保護します。・軟膏の基剤として用います。	
667120057				
親水軟膏「ホエイ」		白色		
				
メルク・ホエイ株式				
7122704X1129	1	クリ - ム	・皮膚を保護します。・軟膏の基剤として用います。	
667120057				
親水軟膏「ホエイ」		白色		
				
メルク・ホエイ株式				
メルク・ホエイ株式				
7121702X1033	1	軟膏	・この薬は皮膚を保護する働きがあります。また、いろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。	
667120028				
親水ワセリン		白色		
				
丸石製薬株式会社				
7121702X1041	1	ワセリン状	・皮膚を保護します。・軟膏の基剤です。	
667120054				
親水ワセリン「ホエイ」				
				
メルク・ホエイ株式				
メルク・ホエイ株式				
7121702X1041	2	ワセリン状	・皮膚を保護します。・軟膏の基剤です。	
667120054				
親水ワセリン「ホエイ」				
				
メルク・ホエイ株式				

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2359800J1035 662350104 	1 坐剤 (全長約 32.5 m) 新レシカルポン坐剤 淡黄白色	・直腸の中で徐々に炭酸ガスを発生させ、生理的な排便作用をうながす便秘治療剤です。	食事に気をつけ、規則正しい排便の習慣を心がけてください。
京都薬品工業株式会社 ゼリア新薬工業株式会社	コンテナ記載：新レシカルポン坐剤 KYO 30 1		
2699801V1050 660433031 	1 軟膏 スクロードパスタ 褐色	・褥瘡（床ずれ）や、皮膚潰瘍の治療に用います。患部の細菌を殺し、汚れた水分を吸着して、創傷治癒を促進させる働きがあります。	・直射日光を避けて保存してください。・衣服などについてしまった場合は、水で洗って下さい。
共和薬品工業株式会社 丸石製薬株式会社			
2649728N1024 662640492 	1 クリーム スタデルムクリーム 白色～微黄色 5%	ステロイドを含まない外用剤です。皮ふの炎症をやわらげる働きがあり、湿疹（しつしん）、皮ふ炎やにきびの治療に用います。また、痛みをやわらげる作用もあり、帯状疱疹（たいじょうほうしん）の治療に用います。	
鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社	チューブの記載：TO - 169 K スタデルムクリーム		
2649728M1029 662640493 	1 軟膏 スタデルム軟膏 5% 白色半透明	ステロイドを含まない外用剤です。皮ふの炎症をやわらげる働きがあり、湿疹（しつしん）、皮ふ炎の治療に用います。また、痛みをやわらげる作用もあり、帯状疱疹（たいじょうほうしん）の治療に用います。	
鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社	チューブの記載：TO - 169 N スタデルム軟膏		
2649858M1036 660406045 	1 固形軟膏剤 スチックゼノールA 無色～微黄色（半透明）	・だぼく打撲、ねんざ捻挫による痛みや、関節、筋肉の炎症による痛みをやわらげます。 ・虫さされによる痛みをやわらげます。	
三笠製薬株式会社 三笠製薬株式会社	容器の色：白色 容器の記載：MZ - SZA		
2646725N1061 660406046 	1 クリーム剤 スチブロンクリーム 色：白色チューブの色：白色（帯：紫色）キャップの色：薄紫色 0.05%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2646725M1066 660406047 	1 軟膏剤 スチブロン軟膏 0.05% 色：白色～微黄色・半透明チューブの色：淡青色（帯：紫色）キャップの	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2646725Q1041 1 ローション剤 660407085 スチプロンローション 0.05% 色：白色容器の色：白色 キャップの色：紫色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社		
	2649732S1032 1 外用貼付剤 (10×14 cm) 662640688 ステイパン 10cm×14cm 布の部分 白色薬の部分 白色または淡黄色	・炎症をおさえ、はれや痛みをやわらげます。	
	株式会社トクホン 包装の記載：Y-SB 三菱ウェルファーマ		
	2259701G1047 3 アンプル 660453020 ステリ・ネブ クロ 無色～微黄色の澄明 モリン吸入液 1% 2mL	・気管支喘息の発作を予防し、また症状が現わっても軽度に抑えます。この薬を定期的に吸入することによって症状の発現が少なく軽くなってきます。	
	大正薬品工業株式会 大正薬品工業株式会		
	2259701G1047 2 アンプル 660453020 ステリ・ネブ クロ 無色～微黄色の澄明 モリン吸入液 1% 2mL	・気管支喘息の発作を予防し、また症状が現わっても軽度に抑えます。この薬を定期的に吸入することによって症状の発現が少なく軽くなってきます。	
	大正薬品工業株式会 アルフレッサファー		
	2259701G1047 1 液剤（吸入用） 660453020 ステリ・ネブ クロ 無色透明 モリン吸入液 1% 2mL	・気管支喘息の発現を予防し、また症状が現れても軽度に抑えます。定期的に吸入することによって症状の発現が少なく軽くなってきます。	・次のような場所には置かないでください。日光の当たる所、高温になる所・清潔に取り扱ってください。・アンプルのカットは、「アンプルの使用方法」に従って行ってください。・吸入する時には新しいアンプル1本を使用し、既に使ったアンプルの残液はぜつたいに使わないでください。・吸入後ネブライザー内に残った液は、捨ててください。・この薬は、既に起こっている喘息発作を抑える薬ではありません。
	大正薬品工業株式会 アルフレッサファー		
	2259803X1036 2 定量噴霧式エアゾール剤 660453021 ストメリンDエアロ アダプターの色：白 ゾル 5mL	・気管支を拡げ、呼吸を楽にします。	
	藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式		
	2259803X1036 1 定量噴霧式エアゾール剤 660453021 ストメリンDエアロ アダプターの色：白 ゾル 5mL	・気管支を拡げ、呼吸を楽にします。	
	アステラス製薬株式 アステラス製薬株式		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646720N1034 662640861 	1 クリーム剤 ス皮ラゾンクリーム 色：白色チューブの色： 0 . 3 % 白色（帯：淡青色） キャップの色：淡緑色 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646720N1034 662640861 	2 クリーム剤 ス皮ラゾンクリーム 色：白色チューブの色： 0 . 3 % 白色（帯：淡青色） キャップの色：淡緑色 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646720M1039 662640862 	2 軟膏剤 ス皮ラゾン軟膏 色：白色～微黄色・半透 0 . 3 % 明チューブの色：淡青色 (帯：淡青色)キャップ 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646720M1039 662640862 	1 軟膏剤 ス皮ラゾン軟膏 色：白色～微黄色・半透 0 . 3 % 明チューブの色：淡青色 (帯：淡青色)キャップ 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646720Q1030 662640863 	2 ローション剤 ス皮ラゾンローション 色：乳白色容器の色：白 0 . 3 % 色キャップの色：淡青色 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646720Q1030 662640863 	1 ローション剤 ス皮ラゾンローション 色：乳白色容器の色：白 0 . 3 % 色キャップの色：淡青色 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2259709G1027 620002421 	1 硬カプセル剤（粉末吸入 剤）（直径約6mm, 長 さ約16mm） スピリーバ吸入用カ プセル 1.8 μg 日本ベーリングガーイ 日本ベーリングガーイ	不透明な明るい緑色 ・気管支を広げることによつて、息切れなどの症状を起こりにくくする薬剤です。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2259709G1027 620002421 スピリーバ吸入用力 プセル 18 µg	2 硬カプセル剤（粉末吸入 剤）（直径約 6 mm，長 さ約 16 mm） 不透明な明るい緑色	・気管支を広げることによっ て、息切れなどの症状を起こり にくくする薬剤です。	
	スピリーバ 18 & m i c r o ; g など		
2499701R1028 662490002 スプレキュア 1 5.75 mg 10 m L サノフィ・アベンテ 持田製薬株式会社	1 点鼻剤（点鼻用注入器付 かっ色ガラスピン入液 体） スプレキュア 1 5.75 mg 10 m L サノフィ・アベンテ 持田製薬株式会社	・鼻腔内に噴霧後 1 ~ 2 週間で 性ホルモンの分泌を抑え始め、 以後使用を継続して抑え続ける ことより、性ホルモンに依存す る子宮内膜症や中枢性思春期早 発症、子宮筋腫による種々の症 状を改善します。	・使用中は牛乳の摂取、適度の 運動日光浴などを心がけて下さ い。
2399709E1027 662310007 スプロールトローチ 2 mg	1 トローチ剤（直径約 13 mm） スプロールトローチ 白色 2 mg	・口腔内及びのどを殺菌・消毒 します。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	スプロールトローチ 2 m g		
2649731M1039 660407028 スミルスチック 3 % 三笠製薬株式会社 大正富山医薬品株式	3 固形軟膏剤 薬剤の色：白色～淡黄白 色半透明容器の色：本体 (白)、キャップ(青) MZ - SMS	・関節や筋肉などの痛みをやわ らげ、炎症を抑えます。ただ し、病気の原因そのものを治す ものではありません。	
2649731M1039 660407028 スミルスチック 3 % 三笠製薬株式会社 大正富山医薬品株式	2 固形軟膏剤 白色～淡黄白色半透明 容器の色：本体(白)、 キャップ(青) 容器の記 載：MZ - SMS	・関節や筋肉などの痛みをやわ らげたり、炎症を抑えます。	
2649731M1039 660407028 スミルスチック 3 % 三笠製薬株式会社 三笠製薬株式会社	1 固形軟膏剤 白色～淡黄白色半透明 容器の色：本体(白)、 キャップ(青) 容器の記 載：MZ - SMS	・関節や筋肉などの痛みをやわ らげたり、炎症を抑えます。	
2649731S2026 660463013 スミルテープ 7 c m × 10 cm 三笠製薬株式会社 大正富山医薬品株式	1 貼付剤（7 cm × 10 cm） スミルテープ 7 c 肌色(布) m × 10 cm 三笠製薬株式会社 MZ - SMT (袋に記 載)	・関節や筋肉などの痛みをやわ らげたり、炎症を抑えます。非 ステロイド系の鎮痛消炎剤で、 薬物が皮膚から吸収されます。	

薬剤情報雑形マスター覧

形 色 記号	効能効果	注意事項
名称 製造会社 販売会社		
 2649731S2026 2 貼付剤 (7 cm × 10 cm) 660463013 スミルテープ 7 c m × 10 c m 微黄色半透明～黄色半透明(薬剤)肌色(支持体：布) 三笠製薬株式会社 M Z - S M T 大正富山医薬品株式	<ul style="list-style-type: none"> ・関節や筋肉などの痛みをやわらげ、炎症を抑えます。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。 	
 2649731S2026 3 貼付剤 (7 cm × 10 cm) 660463013 スミルテープ 7 c m × 10 c m 肌色(布) 三笠製薬株式会社 M Z - S M T (袋に記載) 三笠製薬株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・関節や筋肉などの痛みをやわらげたり、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。 	
 2649731Q1030 1 ローション剤 660406055 スミルローション 3 % 株式会社池田模範堂 容器(キャップ)の色：半透明(白色)容器の記載：M Z - S L 三笠製薬株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・関節や筋肉などの痛みをやわらげたり、炎症を抑えます。 	
 2649733N1025 2 クリーム 662640892 スルプロチンクリー ム 1 % 大洋薬品工業株式会社 チューブのラベル記載：S P - C 大洋薬品工業株式会社	<p>この薬は皮ふの炎症(はれ・赤み)や湿疹をおさえ、痛みやかゆみをやわらげる働きがあります。したがって、急性や慢性の湿疹、皮ふのカサカサ、かぶれ、アトピー性皮ふ炎、口のまわりのぶつぶつ、帯状疱疹(水を含んだ赤いぶつぶつ)などを治す効果があります。この薬はステロイド剤ではありません。</p>	<p>目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。</p>
 2649733N1025 1 クリーム 662640892 スルプロチンクリー ム 1 % 大洋薬品工業株式会社 チューブのラベル記載：S P - C 日本ケミファ株式会社	<p>この薬は皮ふの炎症(はれ・赤み)や湿疹をおさえ、痛みやかゆみをやわらげる働きがあります。したがって、急性や慢性の湿疹、皮ふのカサカサ、かぶれ、アトピー性皮ふ炎、口のまわりのぶつぶつ、帯状疱疹(水を含んだ赤いぶつぶつ)などを治す効果があります。この薬はステロイド剤ではありません。</p>	<p>目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。</p>
 2649733M1020 1 軟膏 662640738 スルプロチン軟膏 1 % 大洋薬品工業株式会社 チューブのラベル記載：S P - O 日本ケミファ株式会社	<p>この薬は皮ふの炎症(はれ・赤み)や湿疹をおさえ、痛みやかゆみをやわらげる働きがあります。したがって、急性や慢性の湿疹、皮ふのカサカサ、かぶれ、アトピー性皮ふ炎、口のまわりのぶつぶつ、帯状疱疹(水を含んだ赤いぶつぶつ)などを治す効果があります。この薬はステロイド剤ではありません。</p>	<p>目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。</p>
 2649733M1020 2 軟膏 662640738 スルプロチン軟膏 1 % 大洋薬品工業株式会社 チューブのラベル記載：S P - O 大洋薬品工業株式会社	<p>この薬は皮ふの炎症(はれ・赤み)や湿疹をおさえ、痛みやかゆみをやわらげる働きがあります。したがって、急性や慢性の湿疹、皮ふのカサカサ、かぶれ、アトピー性皮ふ炎、口のまわりのぶつぶつ、帯状疱疹(水を含んだ赤いぶつぶつ)などを治す効果があります。この薬はステロイド剤ではありません。</p>	<p>目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。</p>


薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
7122702X1103 667120030 	1 軟膏状 精製ラノリン 淡黄色～帯黄褐色	・軟膏の基剤として用います。	
7122702X1090 667120030 	2 軟膏 精製ラノリン 淡黄色	・軟膏基剤です。	
7122702X1090 667120030 	1 軟膏 精製ラノリン 淡黄色～帯黄褐色	・いろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。	
丸石製薬株式会社			
2649729N1037 662640737 	1 クリーム セクタークリーム 白色	塗った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中及び使用後も当分の間は、塗ったところを色物の衣服やサポーター等でおおい、紫外線にあてないようにしてください。・戸外へ出るときは天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し、塗ったところを紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあります。・海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。
久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	薬袋の記載：H P 2 1 0 C		
2649729Q1033 662640583 	2 ゲル セクターゲル 3% 無色～微黄色透明	塗った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中及び使用後も当分の間は、塗ったところを色物の衣服やサポーター等でおおい、紫外線にあてないようにしてください。・戸外へ出るときは天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し、塗ったところを紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあります。・海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。
久光製薬株式会社 ノバルティス ファ	・薬袋の記載：H P 2 1 0 G		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649729Q1033 662640583 	1 ゲル セクターゲル 3% 無色～微黄色透明	塗った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中及び使用後も当分の間は、塗ったところを色物の衣服やサポーター等でおおい、紫外線にあてないようにしてください。・戸外へ出るときは天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し、塗ったところを紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあります。・海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。
久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	・薬袋の記載：H P 2 1 0 G		
2649729Q2021 662640733 	1 液剤 セクターローション 3% 無色～微黄色透明	塗った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中及び使用後も当分の間は、塗ったところを色物の衣服やサポーター等でおおい、紫外線にあてないようにしてください。・戸外へ出るときは天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し、塗ったところを紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあります。・海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。
久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	薬袋の記載：H P 2 1 0 L		
2649865N1023 662640864 	1 軟膏剤 ゼスタッククリーム 淡褐色	・打撲、捻挫による痛み、関節、筋肉の炎症による痛みをやわらげます。	
三笠製薬株式会社 三笠製薬株式会社	キャップの色：黄緑色 チューブの色：白色 チューブの記載：M Z -		
2649865Q1038 660407089 	1 ローション剤 ゼスタックローション 淡黄色～淡黄褐色透明	・打撲、捻挫による痛み、関節、筋肉の炎症による痛みをやわらげます	
三笠製薬株式会社 三笠製薬株式会社	容器の色：白色 キャップの色：黄緑色 容器の記載：M Z - Z T L		
1124700J1028 661170001 	1 坐剤 セニラン坐剤 3 mg	・手術前の不安・緊張やそれに伴う不眠等の症状をやわらげます。	・車の運転など、眠気や注意力・集中力・反射運動の低下などが起こることがありますので、車の運転や高いところでの作業、危険を伴う機械の操作などには十分注意してください。・この薬を使用しているときは、酒などアルコール類は飲まないでください。
サンド株式会社 サンド株式会社	S E N I R A N 3 S N S 3		
2659705Q1026 662650022 	1 液剤 セパリン液 2% 無色から淡黄色透明	水虫、いんきんたむし、ゼにたむしの治療に使用します。	
大日本住友製薬株式	識別コード：# 1 0 5 (包装)		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2649731S1046 660433037 セブテット 10 cm × 14 cm メディサ新薬株式会社 沢井製薬株式会社	1 貼付剤 (10 × 14 cm) (膏体)白色～うすい黄色 (不織布)白色 袋記載: SW - 472	・筋肉や関節の炎症や痛みをやわらげます。
	2659712N1020 660443004 ゼフナートクリーム 白色 2%	1 クリーム チューブの記載: Z Y 1 0 3 ゼフナートクリーム 2 %	水虫などの原因である白癬(はくせん)菌の発育をおさえる作用と、殺す作用があり、水虫などの症状を改善します。
	1319745Q1024 660443014 ゼペリン点眼液 0.1% 5 mg 5 mL わかもと製薬株式会社 興和株式会社	1 点眼剤 ゼペリン点眼液 0.1% 5 mg 5 mL	目のかゆみ、充血など、アレルギーによる結膜炎の症状を改善します。 ・生活上注意することは ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
	1119702G1020 661110018 セボフレン	3 吸入剤(液体) 無色透明	・この薬は手術、検査などに用いる全身麻酔です。
	1119702G1020 661110018 セボフレン	2 吸入剤(液体) 無色透明	・この薬は手術、検査などに用いる全身麻酔です。
	1119702G1020 661110018 セボフレン	1 吸入剤(液体) 無色透明	・この薬は手術、検査などに用いる全身麻酔です。
	2649732S1040 662640689 ゼボラス 10 cm × 14 cm 三笠製薬株式会社 三笠製薬株式会社	1 貼付剤 (10 cm × 14 cm) 白色～淡黄色 薬袋表面の記載: M Z - Z E P	・貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。・次のような病気や症状の痛み、はれのある人に効果があります。(へんけいせい かんせつしょう)変形性関節症、(かたかんせつしゅういえん)肩関節周囲炎などの痛みや炎症に、また、筋肉痛や外傷後のはれや痛みなどに用いま

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2649719S1061 1 シップ剤 662640848 ゼムパック 10c 白色～淡黄色 m x 14cm	炎症を起こしている部分の痛みを除いたり、炎症をおさえたりします。	・生活上注意することは
	2649950M1038 1 ゲル剤 660406057 ゼムロングル 無色透明	・外傷部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。	
	大正薬品工業株式会 チューブ：TYK236 大正薬品工業株式会		
	2649719S1100 1 はり薬 660407029 セラスター 10c 茶色 m x 14cm	・関節炎や筋肉痛などの痛みをやわらげます。	・汗をかいている時は汗をよくふき取り、患部を清潔にしてからはってください。・はった後、汗をかいた場合も同様に、患部を清潔にした上で、はりかけてください。
	2655708Q1080 1 チューブ 660407090 ゼルス液 1% 白色	カビの一種であるはくせん菌、カンジダ、ばんふう菌によっておこる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	・生活上注意することは本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。
	2655708N1113 1 チューブ 660407091 ゼルスクリーム 1%	カビの一種であるはくせん菌、カンジダ、ばんふう菌によっておこる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	・生活上注意することは本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。
	2649731S1054 2 貼付剤 660433038 セルスポット 10 cm x 14cm	ねんざ、打ち身、またはその他原因による関節の炎症を除いて痛みをとりますが、原因を治すものではありません。	
	大原薬品工業株式会 識別コード：OH-12 3 メルク・ホエイ株式		
	2649731S1054 1 貼付剤 660433038 セルスポット 10 cm x 14cm	・ねんざ、だぼく、またはその他原因による関節の炎症を除いて痛みをとりますが、原因を治すものではありません。	・直射日光や高温の場所をさけて保管してください。・開封後はチャックをしめて保管してください。・乳幼児の手のとどかない所に保管してください。
	大原薬品工業株式会 アルミ袋の記載：セルス ポットOH-123 大鵬薬品工業株式会		

薬剤情報難形マスター覧

形 色 記号	効能効果	注意事項
名称 製造会社 販売会社		
 <p>2259708G1022 1 吸入用散剤（4つのブリスターがある円形ホイルパック） 660462003 セレベント 25 口タディスク 25 μg グラクソ・スミスク セレベント 25 μg , 吸入専用 グラクソ・スミスク</p>	<p>・この薬は毎日規則正しく使用することにより、喘息・慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の症状（息苦しさ、咳など）を予防し、症状を軽減します。・この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。</p>	<p>生活上の注意この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、別に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診して下さい。</p>
 <p>2259708G3025 1 吸入用散剤 620001944 セレベント 50 ディスカス 50 μg セレベント 50 ディスカス グラクソ・スミスク セレベント 50 ディスカス グラクソ・スミスク</p>	<p>・この薬は毎日規則正しく使用することにより、喘息・慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の症状（息苦しさ、咳など）を予防し、症状を軽減します。・この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。</p>	<p>この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、別に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診して下さい。</p>
 <p>2259708G2029 1 吸入用散剤（4つのブリスターがある円形ホイルパック） 660462004 セレベント 50 口タディスク 50 μg セレベント 50 ディスカス グラクソ・スミスク セレベント 50 μg , 吸入専用 グラクソ・スミスク</p>	<p>・この薬は毎日規則正しく使用することにより、喘息・慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の症状（息苦しさ、咳など）を予防し、症状を軽減します。・この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。</p>	<p>生活上の注意この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、別に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診して下さい。</p>
 <p>2699801V1025 1 軟膏剤 662690009 ソアナースパスタ 褐色 ティカ製薬株式会社 S N P ティカ製薬株式会社</p>	<p>褥瘡（床ずれ）、皮膚潰瘍の治癒を促進します。薬の成分によって患部に新しい肉芽や血管・表皮の形成を促進します。また、殺菌作用があり、患部を菌から守ります。</p>	<p>衣類、装身具などに付着したらすぐに洗い落としてください。</p>
 <p>1319719M1020 2 眼軟膏 661310214 ゾビラックス眼軟膏 白色 3 % 住友製薬株式会社 キャップの色：ブルー グラクソ・スミスク</p>	<p>単純ヘルペスウイルスが引き起こす角膜の炎症の治療に用いる薬です。ウイルスの増殖を抑え、病気の回復を早める働きをもっています。</p>	<p>・生活上注意することはこの薬を使用している間はコンタクトレンズの着用を避けてください。</p>
 <p>1319719M1020 1 眼軟膏（5 g チューブ） 661310214 ゾビラックス眼軟膏 眼軟膏の色：白色キャップの色：白 住友製薬株式会社 参天製薬株式会社</p>	<p>・単純ヘルペスウイルスが引き起こす角膜（黒目）の炎症の治療に用いる薬です。ウイルスの増殖を抑え、病気の回復を早める働きをもっています。</p>	<p>・この薬を使用している間はコンタクトレンズの装用を避けてください。</p>
 <p>6250701N1049 1 クリーム剤 620003042 ゾビラックスクリー ム 5 % グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク</p>	<p>・単純ヘルペスウイルスが引き起こす病気の治療に用いる薬です。ウイルスの増殖を抑え、病気の回復を早める働きをもっています。</p>	<p>・特にありません。</p>

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
6250701M1027 666250002 	1 軟膏 ゾビラックス軟膏 5 % グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク	単純ヘルペスウイルスが引き起こす病気の治療に用いる薬です。ウイルスの増殖を抑え、病気の回復を早める働きをもっています。	・生活上注意することは特にありません。
1319710Q2043 660444024 	1 点眼液 ソフティア点眼液 0.02% 5 mL 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	点眼瓶の色：無色キャップの色：ピンク色キャップ天面：SFT	・焦点の調節を行う目の中の筋肉の疲れを改善します。 コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
2634711S1020 662630018 	1 パップ剤 ソフラチュール 0.8mg 10cm x 10cm サノフィ・アベンテ ソフラチュール サノフィ・アベンテ	黄白色の軟膏を付着浸透させた目の粗い木綿ガーゼ	・細菌の感染を抑え、外傷、熱傷などを改善します。 ・主治医の指示を守って下さい。
2634711S2026 662630019 	1 パップ剤 ソフラチュール帯 32.4mg 10cm x 30cm サノフィ・アベンテ ソフラチュール サノフィ・アベンテ	黄白色の軟膏を付着浸透させた目の粗い木綿ガーゼ	・細菌の感染を抑え、外傷、熱傷などを改善します。 ・主治医の指示を守って下さい。
2649718M2021 662640866 	1 ゲル ソフレットゲル 6 % 佐藤製薬株式会社 : 933 佐藤製薬株式会社	床ずれ、やけどなどの皮膚症状(潰瘍)の治りをよくします。	床ずれは、体位変換、清潔、マッサージ、栄養補給などのケアが大切です。
2529950J1025 662550007 	1 膀胱薬 ソルコセリル膀胱薬 白色～淡黄色 東菱薬品工業株式会社 大鵬薬品工業株式会社	ソルコセリル膀胱薬 S S - V	・子宮の腔部での炎症やびらんの組織修復を促進し、治りをはやめる膀胱用の坐薬です。 ・膀胱薬のそう入後20～30分は、薬が膀胱から出ることがあるので、激しい運動はさけてください。 ・膀胱薬中の油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化・破損する可能性があるため、これらの製品との接触をさせてください。 ・冷所に保管してください。
2699950M1021 662690005 	1 軟膏 ソルコセリル軟膏 5 % 東菱薬品工業株式会社 大鵬薬品工業株式会社	チューブの記載：ソルコセリル軟膏	・傷の組織修復を促進し、治りをはやめるぬり薬です。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	1329704Q1021 2 点鼻液 661320017 ソルファ点鼻液 0.25% 8mL	・花粉症などのアレルギー性鼻炎の症状（鼻づまり、くしゃみ、鼻水）を改善する薬です。	
	武田薬品工業株式会社 武田薬品工業株式会社		
	1329704Q1021 1 点鼻液 661320017 ソルファ点鼻液 0.25% 8mL	・アレルギー性鼻炎に対して、局所的に作用し、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等の症状を改善します。 ・識別コード：該当せず・シート記載：該当せず	この薬を使うことで特に注意することはありません。
	2646713N1107 1 クリーム剤 662640867 ソルベガクリーム 0.05%	このくすりは皮膚の炎症（赤くはれる、かゆいなどの症状）を抑えるぬり薬です。	
	久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	容器の記載：	
	2646713Q1022 1 ゲル剤 662640613 ソルベガゲル 0.5%	このくすりは皮膚の炎症（赤くはれる、かゆいなどの症状）を抑えるぬり薬です。	
	久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	容器の記載：	
	2646713M1047 1 軟膏剤 662640612 ソルベガ軟膏 0.5%	このくすりは皮膚の炎症（赤くはれる、かゆいなどの症状）を抑えるぬり薬です。	
	久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	容器の記載：	
	2646725M1120 1 軟膏剤 660407092 ソロミー軟膏 0.5%	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
	辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社		
	2646723N1038 2 クリーム 662640561 ダイアコートクリー ム 0.05%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。 ・湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされなどに用いられます。	この薬を化粧下やひげそり後に使用しないでください。
	ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	軟膏の色：白色チューブ の色：ピンク色キャップ の色：ピンク色	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646723N1038 662640561  ダイアコートクリー ム 0.05% 住友製薬株式会社 ファイザー株式会社	1 クリーム 軟膏の色：白色チューブ の色：ピンク色キャップ の色：ピンク色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。・湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされなどに用いられます。	この薬を化粧下やひげそり後に使用しないでください。
2646723M1032 662640562  ダイアコート軟膏 0.05% ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	2 軟膏 軟膏の色：白色チューブ の色：白色キャップの 色：白色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。・湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされなどに用いられます。	この薬を化粧下やひげそり後に使用しないでください。
2646723M1032 662640562  ダイアコート軟膏 0.05% 住友製薬株式会社 ファイザー株式会社	1 軟膏 軟膏の色：白色チューブ の色：白色キャップの 色：白色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。・湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされなどに用いられます。	この薬を化粧下やひげそり後に使用しないでください。
2646703N1049 662640792  ダイプロセルクリー ム 0.064% 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	1 クリーム 白色	湿疹、皮膚炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮膚の炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
2646703M1060 662640752  ダイプロセル軟膏 0.064% 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	1 軟膏 白色～微黄色	湿疹、皮膚炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮膚の炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
2259703G3022 662220046  タウナス 8mg 1 g 共和薬品工業株式会社 日研化学株式会社	1 定量噴霧式エアゾール剤 外観：キャップが灰色、 ボディーがアルミ缶	気管支喘息の発作を防ぎ、呼吸を楽にします。	本剤使用後は、火中に缶を入れないでください。
1329702R3063 660422035  タウナスアクスプレー 8.5mg 8.5g 共和薬品工業株式会社 日研化学株式会社	1 定量噴射式懸濁剤 外観：キャップがピンク 色、ボディーが白色	アレルギー性鼻炎のくしゃみ、鼻水、鼻づまりを抑えます。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 2655700Q2080 662650025 タオソ液 1% 東興薬品工業株式会 アステラス製薬株式	1 液 無色～微黄色	・かびの一種の真菌によって起 こる白癬症（水虫など）やカン ジダ症などの皮膚の感染症を治 療するためのぬり薬です。	
 2655700N1095 662650023 タオソクリーム 1% 東興薬品工業株式会 アステラス製薬株式	1 クリーム 白色	・かびの一種の真菌によって起 こる白癬症（水虫など）やカン ジダ症などの皮膚の感染症を治 療するためのぬり薬です。	
 2655700M1030 662650024 タオソゲル 1% 東興薬品工業株式会 アステラス製薬株式	1 ゲル 無色～微黄色	・かびの一種の真菌によって起 こる白癬症（水虫など）やカン ジダ症などの皮膚の感染症を治 療するためのぬり薬です。	
 7990711X2021 660443009 タココンブ 3.0 cm x 2.5 cm ZLBベーリング株 ZLBベーリング株	1 シート状外用剤 白色のスポンジ状シート、片面の活性面はリボ フラビン（ビタミンB）	・生体では傷がでて出血する と出血を止めようとする仕組み が働きます。タココンブはこの ような血が固まる作用を応用し た生理的なシート状組織接着剤 です。生体では出血すると血液 内のフィブリノゲン、トロンビ ンが作用し、安定で不溶性の フィブリンと呼ばれる凝固物質 を生成します。タココンブはこ れらの成分をシートに含んで おり、更に生成したフィブリンの 溶解を防ぐためアプロチニンと いう成分が加えられています。 肝臓外科領域における出血、肺 外科領域における肺縫合部・胸 膜剥離部からの空気漏れ、心臓 血管外科領域における心臓・血 管縫合部の出血、産婦人科領域 での組織の接着・閉鎖を目的と して使用されています。	・特にありません。
 7990711X3028 660443010 タココンブ 4.8 cm x 4.8 cm ZLBベーリング株 ZLBベーリング株	1 シート状外用剤 白色のスポンジ状シート、片面の活性面はリボ フラビン（ビタミンB）	・生体では傷がでて出血する と出血を止めようとする仕組み が働きます。タココンブはこの ような血が固まる作用を応用し た生理的なシート状組織接着剤 です。生体では出血すると血液 内のフィブリノゲン、トロンビ ンが作用し、安定で不溶性の フィブリンと呼ばれる凝固物質 を生成します。タココンブはこ れらの成分をシートに含んで おり、更に生成したフィブリンの 溶解を防ぐためアプロチニンと いう成分が加えられています。 肝臓外科領域における出血、肺 外科領域における肺縫合部・胸 膜剥離部からの空気漏れ、心臓 血管外科領域における心臓・血 管縫合部の出血、産婦人科領域 での組織の接着・閉鎖を目的と して使用されています。	・特にありません。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
7990711X1025 660421119 タココンブ 9.5 cm x 4.8 cm ZLBベーリング株 ZLBベーリング株	1 シート状外用剤 白色のスponジ状シート、片面の活性面はリボフラビン（ビタミンB）	・生体では傷がでて出血すると出血を止めようとする仕組みが働きます。タココンブはこのような血が固まる作用を応用した生理的なシート状組織接着剤です。生体では出血すると血液内のフィブリノゲン、トロンビンが作用し、安定で不溶性のフィブリンと呼ばれる凝固物質を生成します。タココンブはこれらの成分をシートに含んでおり、更に生成したフィブリンの溶解を防ぐためアプロチニンという成分が加えられています。肝臓外科領域における出血、肺外科領域における肺縫合部・胸膜剥離部からの空気漏れ、心臓血管外科領域における心臓・血管縫合部の出血、産婦人科領域での組織の接着・閉鎖を目的として使用されています。	・特にありません。
1319708Q1040 661310087 タチオン点眼用 2% 山之内製薬株式会社 アステラス製薬株式	1 点眼剤（アルミパックに入った白いタチオン錠剤と5ccの溶解液の入った容器の色：キャップ薄緑色、ボディ白色） 紙ケースの記載：点眼薬、年月日、病院名、用法、錠剤の溶解日、ア	・白内障（はくないしょう）が悪くなるのを抑えたり、角膜炎（かくまくえん）などの炎症をやわらげます。	
2649729S1120 660422036 タッチロン 10cm x 14cm 株式会社三和化学研 株式会社三和化学研	1 シップ剤 無色透明～微黄色半透明 株式会社三和化学研	この薬は成分を皮膚から浸透させることにより炎症を抑え、痛みを和らげる働きがあります。	・生活上注意することは
2649729S2037 660422037 タッチロンテープ 7cm x 10cm 昭和ケミカ株式会社 株式会社三和化学研	1 プラスター剤 微黄色半透明～黄色半透明 昭和ケミカ株式会社 株式会社三和化学研	慢性の炎症を起こしている部分の痛みを除いたり、炎症をおさえたりします。	・生活上注意することは
2634713M1020 660462005 ダラシンTゲル 1% ファイザー株式会社 佐藤製薬株式会社	1 ゲル 無色透明 ファイザー株式会社 佐藤製薬株式会社	・この薬はにきびの患部の細菌を殺すことにより、炎症をおさえ、にきびを治療します。	・主治医の指導に従ってください。
1319722Q1139 660453023 タリザート点眼液 0.3% 大正薬品工業株式会 アルフレッサファー	1 水性点眼液 微黄色～淡黄色澄明 大正薬品工業株式会 アルフレッサファー	・目に細菌などが入る結膜炎、眼瞼炎、角膜炎などに使用します。	目を汚れた指などでさわらないでください。点眼のとき容器の先端が直接目に触れないように注意してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319722Q1139 660453023 タリザート点眼液 0.3%	2 水性点眼液 微黄色～淡黄色透明	・目に細菌などに入る結膜炎、眼瞼炎、角膜炎などに使用します。	目を汚れた指などでさわらないでください。点眼のとき容器の先端が直接目に触れないように注意してください。
大正薬品工業株式会社 大正薬品工業株式会社			
1319722M1021 661310221 タリピッド眼軟膏 0.3%	1 眼軟膏(3.5gチューブ) 眼軟膏の色：淡黄色 キャップの色：明るい橙	・結膜炎や麦粒腫（ものもらい）など目の感染症を引き起こしている細菌を殺して感染症を治します。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
1329706Q1020 661320023 タリピッド耳科用液 3mg	1 液剤 かすかな黄色～あわい黄色	中耳炎、外耳炎などの耳の感染症の原因となる細菌を殺します。	・生活上注意することは
第一製薬株式会社 第一製薬株式会社	-		
1319722Q1023 661310222 タリピッド点眼液 0.3%	1 点眼剤(5mLプラスチック容器) 点眼剤の色：微黄色～淡黄色透明キャップの色：明るい橙	・結膜炎や麦粒腫（ものもらい）など目の感染症を引き起こしている細菌を殺して感染症を治します。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
1319722Q1074 660453024 タリフロン点眼液 0.3%	1 点眼剤(5mLプラスチック容器) 点眼液の色：微黄色～淡黄色透明キャップの色：橙色	・目の炎症を引き起こしている細菌を殺菌します。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
東和薬品株式会社 東和薬品株式会社			
7113700X1210 667110005 タルク	1 粉末 白	・皮膚などに散布し滑りをよくします。	
吉田製薬株式会社			
7113700X1156 667110005 タルク	1 結晶性の粉末 白色～灰白色	・この薬は丸剤、錠剤などを作るときに使用します。または、散布剤として使用します。	
丸石製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646727M1049 660463017 タルメア軟膏 0.1% 富士製薬工業株式会社 富士製薬工業株式会社	1 軟膏 白色 富士製薬工業株式会社 富士製薬工業株式会社	・皮膚の炎症を抑えます。	
7121709X1094 667120031 単軟膏 富士製薬工業株式会社	1 液 黄色 富士製薬工業株式会社	・皮膚を保護します。	
7121709X1094 667120031 単軟膏 富士製薬工業株式会社	2 軟膏 黄色 富士製薬工業株式会社	・この薬は皮膚を保護する働きがあります。また、いろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。	
2616700Q1352 662610423 デアミトール「マルイシ」10% 丸石製薬株式会社	1 液体 無色～淡黄色透明 丸石製薬株式会社	・この薬は手指・皮膚、医療用具、傷口、粘膜、部屋・家具・器具・物品などを消毒します。また、腋や目の洗浄に使用します。	・飲まないでください。・必ず希釈し、濃度に注意して使用してください。・原液や高濃度液が目に入らないように注意してください。
2616700Q3070 662610432 デアミトール「マルイシ」50W/V% 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	1 液体またはゼリ- ようの流動体 無色～淡黄色透明 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は手指・皮膚、医療用具、傷口、粘膜、部屋・家具・器具・物品などを消毒します。また、腋や目の洗浄に使用します。	・飲まないでください。・必ず希釈し、濃度に注意して使用してください。・原液や高濃度液が目に入らないように注意してください。
1319702Q1026 661310088 チモブトール0.5% 万有製薬株式会社 万有製薬株式会社	1 点眼剤 点眼液の色：無色～微黄色透明キャップの型・ 色：花びら型、スカイプ 万有製薬株式会社 万有製薬株式会社	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。
1319702Q1026 661310088 チモブトール0.2% 万有製薬株式会社 参天製薬株式会社	2 点眼剤 点眼液の色：無色～微黄色透明キャップの型・ 色：花びら型、スカイプ 万有製薬株式会社 参天製薬株式会社	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1319702Q2022 661310089 チモプトール 0.5% 万有製薬株式会社 万有製薬株式会社	1 点眼剤 点眼液の色：無色～微黄色澄明キャップの型・色：花びら型、ブルー点	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。
 1319702Q2022 661310089 チモプトール 0.5% 万有製薬株式会社 参天製薬株式会社	2 点眼剤 点眼液の色：無色～微黄色澄明キャップの型・色：ブルー	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。
 1319702Q2022 661310089 チモプトール 0.5% 万有製薬株式会社 参天製薬株式会社	3 点眼剤 点眼液の色：無色～微黄色澄明キャップの型・色：花びら型、ブルー点	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。
 1319702Q3029 660432017 チモプトール X-E 0.25% 万有製薬株式会社 参天製薬株式会社	3 点眼剤 点眼液の色：無色～微白色キャップの型・色：橢円形、淡いピンク点眼瓶	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。
 1319702Q3029 660432017 チモプトール X-E 0.25% 万有製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤（5mL プラスチック容器） 点眼液の色：無色～微白色キャップの色：淡いピンク	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	生活上の注意（保存方法を含む）・コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。
 1319702Q3029 660432017 チモプトール X-E 0.25% 万有製薬株式会社 万有製薬株式会社	4 点眼剤 点眼液の色：無色～微白色キャップの型・色：橢円形、淡いピンク点眼瓶	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。
 1319702Q3029 660432017 チモプトール X-E 0.25% 万有製薬株式会社 参天製薬株式会社	2 点眼剤（5mL プラスチック容器） 点眼液の色：無色～微黄色澄明キャップの色：スカイブルー	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1319702Q4025 660432018 チモプトールX E 0.5% 万有製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼液の色：無色～微白色キャップの色：濃いピンク	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	生活上の注意（保存方法を含む）・コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。・この薬は遮光袋に入れて保存してください。
 1319702Q4025 660432018 チモプトールX E 0.5% 万有製薬株式会社 参天製薬株式会社	3 点眼剤 点眼液の色：無色～微白色キャップの型・色：楕円形、濃いピンク点眼瓶	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。
 1319702Q4025 660432018 チモプトールX E 0.5% 万有製薬株式会社 万有製薬株式会社	2 点眼剤 点眼液の色：無色～微白色キャップの型・色：楕円形、濃いピンク点眼瓶	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。この薬は遮光袋に入れて保存してください。
 1319702Q1042 661310246 チモロール点眼液 0.25%「ティカ」 0.25% ティカ製薬株式会社 日東メディック株式	1 点眼液 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色：無色透明 キャップの色：淡黄色	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化を抑えます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 1319702Q2049 661310248 チモロール点眼液 0.5%「ティカ」 0.5% ティカ製薬株式会社 日東メディック株式	3 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼液の色；無色透明 キャップの色；淡グレー	緑内障における視力の悪化をおさえるために眼圧を下げます。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
 1319702Q2049 661310248 チモロール点眼液 0.5%「ティカ」 0.5% ティカ製薬株式会社 日本アルコン株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼液の色；無色透明 キャップの色；淡グレー	緑内障における視力の悪化をおさえるために眼圧を下げます。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
 1319702Q2049 661310248 チモロール点眼液 0.5%「ティカ」 0.5% ティカ製薬株式会社 ティカ製薬株式会社	2 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼液の色；無色透明 キャップの色；淡グレー	緑内障における視力の悪化をおさえるために眼圧を下げます。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

形 色 記号	効能効果	注意事項
名称	製造会社	販売会社
 1319702Q2049 661310248 チモロール点眼液 0.5%「ティカ」 0.5% テイカ製薬株式会社 日東メディック株式	4 点眼液 (5 mL プラスティック容器) 点眼剤の色：無色透明 キャップの色：淡灰色	・目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化を抑えます。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 1319702Q1093 660463018 チモロール点眼液 T 0.25% 東亜薬品株式会社 日東メディック株式	1 点眼液 (5 mL プラスティック容器) 点眼剤の色：無色～微黄色 透明キャップの色：空色	・目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化を抑えます。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 1319702Q2103 660463019 チモロール点眼液 T 0.5% 東亜薬品株式会社 日東メディック株式	1 点眼液 (5 mL プラスティック容器) 点眼剤の色：無色～微黄色 透明キャップの色：青色	・目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化を抑えます。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 2649709X1146 662640158 チンク油	2 液剤 白色～類白色 無し	湿疹・皮膚炎・やけどをおすすめのお薬です。 1. 広範囲または重度のやけどには使用しないで下さい。2. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流してください。
 2649709X1146 662640158 チンク油	4 液体 白色～類白色	この薬は小範囲のすり傷、やけど、湿しん、皮膚炎を治療し、保護・防腐する働きがあります。
 2649709X1146 662640158 チンク油	3 軟膏剤 白色～類白色 本体識別コード：包装識別コード：	収れん・消炎・保護・緩和な防腐作用により、擦り傷、やけど、湿疹、皮膚炎の症状を改善します。
 2649709X1146 662640158 チンク油	1 泥状物 白色～類白色	この薬は軽度の皮膚の炎症を抑え、緩和な防腐作用もある薬です。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 662640912 チンク油・Y I	2649709X1227 1 泥状(懸濁剤) 660408079 チンク油・Y I 白色～類白色	・軽い擦り傷や火傷、その他の皮膚炎に用い、消炎・保護・防腐作用があります。	
山田製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
 662640912 チンク油「ホエイ」	2649709X1189 2 泥状の懸濁物 662640912 チンク油「ホエイ」 白色～類白色	・小さなすりきず、軽度のやけどや皮膚炎を改善します。	
メルク・ホエイ株式			
 662640912 チンク油「ホエイ」	2649709X1189 1 泥状の懸濁物 662640912 チンク油「ホエイ」 白色～類白色	・小さなすりきず、軽度のやけどや皮膚炎を改善します。	
メルク・ホエイ株式 ニプロファーマ株式			
 662640820 チンク油「ヨシダ」	2649709X1294 1 軟膏 662640820 チンク油「ヨシダ」 白	・收れん・消炎・保護・緩和な防腐作用により、擦り傷、やけど、湿疹、皮膚炎の症状を改善します。	
吉田製薬株式会社			
 662640498 株式会社ツムラ	2649873M1030 1 軟膏(外用) ツムラ紫雲膏 ・識別コード：501	このくすりは漢方薬の軟膏です。あなたの症状や体质に合わせて処方してあります。・やけどによる炎症と痛みを抑えます。・痔の痛みを和らげ、肛門の傷の回復を促進します。	
株式会社ツムラ			
 660463020 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	1319720Q3051 1 点眼液 ティアパラランス 0.1%点眼液 5mL 天面：TBL	・角膜の傷の修復を助けます。・涙液を保持し目の乾燥を防ぎます。	ソフトコンタクトレンズを装用したまま点眼しないでください。
千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社			
 661310202 ティカゾン製薬株式会社 ティカゾン製薬株式会社	1315702Q1035 1 点眼・点耳液(5mL) プラスチック容器 ティカゾン点眼液 0.1% 無色透明キャップの色：クリーム色	・目や耳の炎症やアレルギー性の炎症を抑えます。	点眼の場合、コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1319724Q1057 660422040 ティプロフェン点眼液 0.1% ティカ製薬株式会社 科研製薬株式会社	3 点眼剤 (5mLプラスチック容器) 点眼液の色；無色透明 キャップの色；グリーン	眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、目の手術後の炎症を抑えます。この薬は、菌の感染、異物等による傷、花粉や埃、ダニ等のアレルゲン、化粧品、その他いろいろな原因によって引き起った炎症を抑制します。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
 1319724Q1057 660422040 ティプロフェン点眼液 0.1% ティカ製薬株式会社 ティカ製薬株式会社	2 点眼剤 (5mLプラスチック容器) 点眼液の色；無色透明 キャップの色；グリーン	眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、目の手術後の炎症を抑えます。この薬は、菌の感染、異物等による傷、花粉や埃、ダニ等のアレルゲン、化粧品、その他いろいろな原因によって引き起った炎症を抑制します。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
 1319724Q1057 660422040 ティプロフェン点眼液 0.1% ティカ製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 水性点眼剤 (成分)無色透明(容器)キャップ・緑色 本体・透明	・この薬は目の炎症を抑えます。	・お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手をせっけんと流水で良く洗い、容器の先端が直接、目やまつげに触れないように注意してください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。 ・使用時は必ず投薬袋(緑色)に入れ、4週間以内に使い切るようにしてください。
 2646723M1121 660407096 テオロップ軟膏 0.05%	1 軟膏剤 白色～微黄色	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
 2646704N1035 662640177 デキサメサゾンクリーム「イワキ」 0.1%	2 軟膏剤 色：白色半透明チューブ の色：白色(帯：肌色) キャップの色：淡黄色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
 2646704N1035 662640177 デキサメサゾンクリーム「イワキ」 0.1%	1 軟膏剤 色：白色半透明チューブ の色：白色(帯：肌色) キャップの色：淡黄色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
 2646704M2125 662640182 デキサメサゾン軟膏「イワキ」 0.1%	1 軟膏剤 色：白色半透明チューブ の色：淡青色(帯：肌色) キャップの色：淡黄	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646704M2125 662640182 	2 軟膏剤 デキサメサゾン軟膏「イワキ」0.1% 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646704Q1023 662640178 	2 ローション剤 デキサメサゾンローション「イワキ」0.1% 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646704Q1023 662640178 	1 ローション剤 デキサメサゾンローション「イワキ」0.1% 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2647709M1048 662640502 	1 軟膏 デキサンG軟膏 白色 富士製薬工業株式会社 富士製薬工業株式会社	・皮膚の炎症を抑え、症状を改善します。	
2647709M1048 662640502 	2 軟膏 デキサンG軟膏 白色 富士製薬工業株式会社 ティコクメディック	・皮膚の炎症を抑え、症状を改善します。	
2647709Q1023 662640716 	1 ローション デキサン - V G ローション 白色 富士製薬工業株式会社 富士製薬工業株式会社	・皮膚の炎症を抑え、症状を改善します。	
2646700M1058 662640160 	2 軟膏 テクスメテン軟膏 0.1% 佐藤製薬株式会社 中外製薬株式会社	いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2646700M1058 1 軟膏 662640160 テクスメテン軟膏 0.1% 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
	2646700N1053 2 クリーム状の軟膏 662640159 テクスメテンユニバーサルクリーム 0.1% 佐藤製薬株式会社 中外製薬株式会社	いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
	2646700N1053 1 クリーム状の軟膏 662640159 テクスメテンユニバーサルクリーム 0.1% 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
	2699704W1034 1 散剤 662690014 デクラート 0.9% 日本新薬株式会社 日本新薬株式会社	・床ずれや皮膚のただれなどの傷の部分を殺菌消毒し、ただれたところを改善する薬です。	
	2399800X1025 1 軟膏剤 662310011 デスパコーワ 興和株式会社 興和株式会社	炎症を抑える作用や、殺菌作用、局所麻酔作用を持つ薬剤が配合されており、口内炎(アフタ)や歯周炎のはれ、痛みなどの炎症を和らげます。	・生活上注意することは
	2419700R2029 1 点鼻用スプレー剤 660470004 デスマプレシン・スプレー 10協和 5 0.00 μg 協和醸酵工業株式会社 協和醸酵工業株式会社	・この薬は体内で尿の量や水分を調節しているホルモン(パソプレシン)の夜間の分泌不足が関係しておきる夜尿症に用います。・この薬はパソプレシンによく似た合成物質(誘導体)で、パソプレシンの不足を体外から補う働きをします。・この薬は鼻腔内に投与するスプレー剤です。	・夜尿症は薬を使えば治るといふものではありません。まず主治医の指示に従った生活指導をしっかり守ることが大切です。・夕食後より翌朝までの飲水は、先生の指示に従い、極力避けてください。先生の指示以上に飲んでしまった場合はこの薬は使用しないでください。・夜寝る前に排尿をしてから、この薬を使ってください。・鼻炎などの鼻の病気などがありこの薬をうまく使用できない場合には、主治医または薬剤師に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2419700R1022 660433041 デスマプレシン・ス プレー 2.5 協和 125 μg 協和醸酵工業株式会 協和醸酵工業株式会	1 点鼻用スプレー剤 点鼻用スプレー剤の色： 無色透明 ラベルの記載：K H 4 0 7	・この薬は、体内で尿量を調節 しているパソブレシンというホ ルモンが不足しているために大 量の尿が出る中枢性尿崩症とい う病気に用います。デスマプレ シンは、パソブレシンによく似 た物質（誘導体）で、パソ ブレシンの不足を体外から補う 薬です。また、パソブレシンの 不足が関係していると思われる 夜尿症に用いられることがあります。この薬は鼻腔内に投与す るスプレー剤です。	・鼻炎や鼻のけがなどによって この薬をうまく使用できないよ うな場合には、すぐに主治医ま たは薬剤師に相談してくださ い。・外出または旅行などをす る場合は、忘れずに携行してく ださい。・携帯する時は収納 ケースに入れ、バッグなどに立 てた状態で入れて携帯してく ださい。（ポケットなど、体温 が直接伝わるところに入れると 薬液がもれることができます。） ・旅行などでこの薬を携 行する場合には、高温の場所は さて、極力温度差の少ない場 所に保管してください。・水分 のとりすぎに気を付けてください
2419700Q1027 662410001 デスマプレシン点鼻 液協和 250 μg 協和醸酵工業株式会 協和醸酵工業株式会	1 点鼻液剤 点鼻液剤の無色透明 ラベルの記載：K H 4 0 4 [予備キャップ（液もれ 防止用）添付]	・この薬は、体内で尿量を調節 しているパソブレシンというホ ルモンが不足しているために大 量の尿が出る中枢性尿崩症とい う病気に用います。デスマプレ シンは、パソブレシンによく似 た物質（誘導体）で、パソ ブレシンの不足を体外から補う 薬です。また、パソブレシンの 不足が関係していると思われる 夜尿症に用いられることがあります。この薬は鼻腔内に投与す る点鼻薬です。	・鼻炎や鼻のけがなどによって この薬をうまく使用できないよ うな場合には、すぐに主治医ま たは薬剤師に相談してくださ い。・外出または旅行などをす る場合は、忘れずに携行してく ださい。・携帯する時には、冷 蔵庫から取り出し薬液を部屋の 温度に戻してから、バッグなど に立てた状態で入れて携帯して ください。（ポケットなど、体温 が直接伝わるところに入れると 薬液がもれることができます。また部屋の温度に戻すには、最初に容器の先端部分 (チート)に薬液がたまっていることを確認し、予備キャップをはずして室内で20～30 分ほど放置するか、手のひらで1分間ほど握り締めて暖めてください。暖め終わったら、再び 予備キャップと茶色の保護 キャップをしてください。） ・旅行などでこの薬を携行する場合 には、高温の場所はさて、 極力温度差の少ない場所に保管 してください。・水分のとりすぎに 気を付けてください。
1319747Q1023 660451004 デタントール 0.0 1% 点眼液 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラス チック容器) 点眼剤の色：無色透明 キャップの色：紫	・緑内障や高眼圧症の治療に用 いる目薬で、眼圧（目の中の圧 力）を下げる作用があります。	
2659710Q1051 620003043 テビーナ液 1 % 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 液剤 無色～淡黄色透明容器の 色：白色（帯：淡青色） キャップの色：淡青色 抗真菌薬 テビーナ液 1 %	・水虫やカンジダ症などの原因 となる真菌（カビの一種）を殺 菌する作用があります。	・室温で保存し、火気は避けて 下さい。・患部の清潔と乾燥に 心がけて下さい。
2659710N1063 620003044 テビーナクリーム 1 % 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 クリーム剤 白色チューブの色：白色 (帯：淡青色) キャップ の色：白色 抗真菌薬 テビーナク リーム 1 %	・水虫やカンジダ症などの原因 となる真菌（カビの一種）を殺 菌する作用があります。	・患部の清潔と乾燥に心がけて 下さい。・薬をぬった部分は、 なるべく直射日光に当たらない ようにして下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2647706R2021 662640838 テラコー・スプレー	1 噴霧剤 (エアゾール剤) 液の色：黄色ボトルの 色：白色キャップの色： 白色	・炎症を抑える働きがあり、発 赤、はれ、かゆみなどの症状を とります。・湿疹や皮膚炎など に用いられます。	この薬は高圧ガスを使用した可 燃性であり、危険なため、下記 の注意を守ってください。 ・ストーブやコンロ等、火気の付 近で使用しないでください。 ・火気を使用している室内で 大量に使用しないでください。 ・日の当たる場所や温度の高 い(40度以上)場所に置かな いでください。・火の中に入 れないでください。・使 切って捨ててください。 ・逆 さまにして使用するとガスが抜 けて液が残りますので、逆さま にして使用しないでください。 ・缶のさびによる破裂を防ぐ ため、水回り、湿気の多い場所 に置かないでください。・捨 てるときは火気のない屋外で噴 射音が消えるまでボタンを押し てガスを抜いてください。本剤 は黄色の噴霧液です。衣服など へ付着するおそれがありますの で注意してください。
2647705M1023 662640163 テラ・コートリル軟 膏	1 軟膏 軟膏の色：黄色チューブ の色：白色キャップの 色：青色	・炎症を抑える働きがあり、発 赤、はれ、かゆみなどの症状を とります。・湿疹や皮膚炎、歯 肉炎などに用いられます。	特にありません。
2633701M1038 662630021 テラジアパスタ 5%	1 軟膏剤 (バスタ) 白色	細菌を殺す薬のはいっている軟 膏で、細菌によって起こってい る皮膚病を治します。	・生活上注意することは患部を いつも清潔にし、日光など強い 光に当たないよう注意してく ださい。小児の手のとどかない所 においてください。直射日光や 高温の場所をさけて保管してく ださい。
2639804M1025 662630023 テラマイシン軟膏 (ポリミキシンB含有)	1 軟膏 軟膏の色：黄色チューブ の色：白色キャップの 色：青色	・病気(感染症)の原因となる 色々な細菌に対して殺菌作用を 示します。・皮膚に起こる感染 症に効果があります。ただし、 真菌やウイルス性の病気には効 果がありません。・外傷や熱傷 (やけど)など、および手術後 の二次感染を予防します。	特にありません。
2649725N1098 662640784 デルキサムクリーム 5%	1 クリ - ム 白色不透明	皮膚の炎症を抑え、湿疹や 皮膚炎を改善します。痛み を抑える働きもあり帯状疱疹の 治療に用いられます。アト ビ - 性皮膚炎をはじめ、急性湿 疹、接触皮膚炎(かぶれ)、日 光皮膚炎(日焼け)などに用い たりします。	目に入らないように注意し てください。化粧下やひげ そり後などに化粧用として使用 しないでください。直射日 光と湿気を避けて、室温(3 0以下)で保存してく ださい。子どもの手の届かない ところに置いてください。 使用的のつど、くすりが劣化しな いようにしっかりふたを締めてく ださい。
2649725M1092 662640506 デルキサム軟膏 5%	1 軟膏剤 白色	皮膚の炎症を抑え、湿疹や 皮膚炎を改善します。痛み を抑える働きもあり帯状疱疹の 治療に用いられます。アト ビ - 性皮膚炎をはじめ、急性湿 疹、接触皮膚炎(かぶれ)、日 光皮膚炎(日焼け)などに用い たりします。	目に入らないように注意し てください。化粧下やひげ そり後などに化粧用として使用 しないでください。直射日 光と湿気を避けて、室温(3 0以下)で保存してく ださい。子どもの手の届かない ところに置いてください。 使用的のつど、薬が劣化しな いようにしっかりふたを締めてく ださい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2399706M1060 662310012	1 軟膏 デルゾン口腔用 0.1%	この薬は口内炎や舌炎の薬です。	
			
2646713M1128 620002314	1 軟膏剤 デルトピカ軟膏 0.5%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	・化粧下やひげそり後には使用しないで下さい。
			
2646713Q1073 620002315	1 ローション剤 デルトピカローション 0.05%	・主として頭皮に使用します。・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	・化粧下やひげそり後には使用しないで下さい。
			
2659710N1080 620003046	1 クリーム剤 テルフィナピンク リーム 1%	・カビを殺し水虫などを治します。	
			
2646703N1057 662640722	2 クリーム剤 デルモゾール - DP クリーム 0.06 4%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
			
2646703N1057 662640722	1 クリーム剤 デルモゾール - DP クリーム 0.06 4%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
			
2646703M1078 662640723	1 軟膏剤 デルモゾール - DP 軟膏 0.064%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646703M1078 662640723	2 軟膏剤 デルモゾール - D P 軟膏 0 . 0 6 4 %	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。 色：乳白色チューブの 色：淡青色（帯：赤色） キャップの色：薄紫色	
	岩城製薬株式会社		
2646703Q2025 662640724	1 ローション剤 デルモゾール - D P ローション 0 . 0 6 4 %	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社		
2647709N1043 662640719	1 クリーム剤 デルモゾールG クリーム	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。 ・炎症部位にいる細菌を殺菌します。	
	岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社		
2647709M1064 662640720	1 軟膏剤 デルモゾールG軟膏	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。 ・炎症部位にいる細菌を殺菌します。	
	岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社		
2647709Q1031 662640721	1 ローション剤 デルモゾールG ローション	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。 ・炎症部位にいる細菌を殺菌します。	
	岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社		
2646701M2075 662640204	1 軟膏剤 デルモゾール軟膏 0 . 1 2 %	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社		
2646701M2075 662640204	2 軟膏剤 デルモゾール軟膏 0 . 1 2 %	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	岩城製薬株式会社		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 形
診療コード 色
名称 製造会社
販売会社 記号

効能効果

注意事項

	2646701Q1020 662640203 デルモゾールローション 0.12%	2 ローション剤 色：白色容器の色：白色 キャップの色：緑色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	2646701Q1020 662640203 デルモゾールローション 0.12%	1 ローション剤 色：白色容器の色：白色 キャップの色：緑色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	2646713N1069 662640205 デルモベートクリーム 0.05%	1 クリーム 白色	この薬は皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	・生活上注意することは特にありません。
	2646713Q1030 662640206 デルモベートスカルプト 0.05%	1 ローション 無色透明	この薬はおもに頭の皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	・生活上注意することは特にありません。
	2646713M1063 662640207 デルモベート軟膏 0.05%	1 軟膏 白色、半透明	この薬は皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	・生活上注意することは特にありません。
	2647707M1022 662640616 デルモランF軟膏	1 軟膏 白色～微黄色	じゅくじゅくしている皮膚や細菌に感染している皮膚の湿疹、皮膚炎、かゆみ、赤みなどをおさえます。	子供の手のとどかないところに保存してください。
	2359700J1037 662350019 テレミンソフト坐薬 1号	1 坐剤 淡黄色 2mg	・便秘時の排便を促します。 腸の検査時、または手術前後時、腸にたまっているものを排除します	
		テレミンソフト 2mg		
		サンド株式会社		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2359700J2041 662350020 	1 坐剤 テレミンソフト坐薬 淡黄色 3号 10mg	・便秘の時の排便を促します。 腸の検査時、または手術前後時、腸にたまっているものを排除します	
	テレミンソフト 10mg サンド株式会社		
	1319813Q1049 620002624 点眼・点鼻用リンデ 無色～微黄色 ロンA液	・目、鼻の炎症症状（かゆい、赤くなるなど）を改善する薬です。	・直接光のあたらない涼しい所に保管してください。・小児の手の届かない所に保管してください。
	塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	商品名等：容器のラベルに印刷	
	1319801Q1062 660406160 点眼用エリコリT	1 用時溶解型点眼液 点眼剤の色：白色～淡黃白色（粉末）、無色透明（溶解液）キャップの	・目の炎症を引き起こしている細菌を殺菌します。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
	日東メディック株式 日東メディック株式		
	1319706Q1067 660406161 点眼用ピレノキシン T 0.005% (溶解後の液とし)	1 用時溶解型点眼液 点眼剤の色：だいたい黄色（粉末）、無色透明（溶解液）キャップの	・初期老人性白内障の進行を抑えます。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。・あやまって衣服につくと黄色いしみになることがあるので、注意してください。衣服についた場合は、石けんをつけて水でよく洗ってください。
	日東メディック株式 日東メディック株式		
	1319706Q1067 660406161 点眼用ピレノキシン T 0.005% (溶解後の液とし)	2 用時溶解型点眼液 点眼剤の色：だいたい黄色（粉末）、無色透明（溶解液）キャップの	・初期老人性白内障の進行を抑えます。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。・あやまって衣服につくと黄色いしみになることがあるので、注意してください。衣服についた場合は、石けんをつけて水でよく洗ってください。
	日東メディック株式 科研製薬株式会社		
	1319706Q1067 660406161 点眼用ピレノキシン T 0.005% (溶解後の液とし)	3 水溶性点眼剤 (成分) 粉末：だいたい黄色 溶解液：無色透明 (容器) 粉末：キャップ	・この薬は老人性白内障の進行を抑えます。 ・お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手をせっけんと流水で良く洗い、容器の先端が直接、目やまづけに触れない様に注意してください。・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。・溶解後は冷暗所に保存し、5週間以内に使い切るようにしてください。
	日東メディック株式 科研製薬株式会社		
	2649712X1075 662640208 トウガラシチンキ	1 液剤 黄赤色 無し	1. 皮膚を刺激して、筋肉痛、しもやけの痛みをやわらげます。 2. 育毛のお薬です。 1. 入浴直後に使用しないでください。 2. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流して下さい。


薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項	
	 2649712X1075 662640208 トウガラシチンキ	2 液 (チンキ剤) 黄赤色	・局所を刺激し、血行をよくすることにより筋肉痛、しもやけ(凍瘡)、軽度の凍傷(皮膚に充血、むくみが生じた程度)を改善します。 ・局所を刺激し、血行をよくすることにより毛髪を育てます。	・入浴直後には使用しないでください。
	 1324702Q1026 661320006 トーケ 0 . 1 1 8 %	1 液剤 無色透明	・鼻づまりをおさえて、鼻の空気の通りをよくします。	・フタをあけたら、汚染に注意してください。 ・室温で保存してください。 ・連用又は使いすぎにより、次第に効果が落ちたり、鼻づまりをおこすことがあります。
	 2646701S2023 662640573 トクダーム 0 . 3 m g 5 c m × 1 0 c m	1 テープ剤 白色を帯びた半透明	・皮膚(ひふ)の炎症などを抑えるお薬です。	
	ニチバン株式会社 大鵬薬品工業株式会社	アルミ袋の記載: トクダーム TD - S S (5 c m × 1 0 c m) TD - S		
	 2649733N1041 662640894 トバルジッククリー ム 1 %	1 クリーム 白色～淡黃白色	・湿疹、アトピー性皮膚炎、皮脂欠乏性湿疹などの炎症を押さえ、かゆみを軽減します。 ・帶状疱疹の痛みを軽減します。	特になし
	アルフレッサファー	チューブ底面の記載: N F 5 4 9		
	 2649733M1046 662640740 トバルジック軟膏 1 %	1 軟膏剤 白色～微黃色半透明	・湿疹、アトピー性皮膚炎、皮脂欠乏性湿疹などの炎症を押さえ、かゆみを軽減します。 ・帶状疱疹の痛みを軽減します。	特になし
	アルフレッサファー	チューブ底面の記載: N F 5 4 8		
	 2646708N1106 662640511 トプシムEクリーム 0 . 0 5 %	1 クリーム 白色、一部にピンクの縞模様	皮ふ部分の炎症を抑える働きがあり、下記疾患、皮ふ症状の治療に用います。湿疹・皮ふ炎群(進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ビダール苔癬、放射線皮ふ炎、日光皮ふ炎を含む) ・痒疹群(じんましん様苔癬、ストロフルス、固定じんましんを含む)、乾癬、掌蹠膿疱症、円形脱毛症(悪性を含む)、尋常性白斑(なお、本剤は医師が診察に基づき適切と判断され、処方される薬剤です。思わぬ副作用の発生など招かないためにも、自己判断での使用は避けてください)。	・生活上注意することは、この薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用は避けてください。
	田辺製薬株式会社			
	田辺製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646708N1114 662640211  トブシムクリーム 0.05%	1 クリーム 白地に一部緑の縞模様	皮ふ部分の炎症を抑える働きがあり、下記疾患、皮ふ症状の治療に用います。湿疹・皮ふ炎群（進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ビダール苔癬、放射線皮ふ炎、日光皮ふ炎を含む） 痒疹群（じんましん様苔癬、ストロフルス、固定じんましんを含む）、乾癬、掌蹠膿疱症、円形脱毛症（悪性を含む）、尋常性白斑 なお、本剤は医師が診察に基づき適切と判断され、処方される薬剤です。思わぬ副作用の発生など招かないためにも、自己判断での使用は避けてください。	・生活上注意することは、この薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用は避けてください。
2646708R2023 662640839  トブシムスプレー 0.0143%	1 噴霧液 白地	皮ふ部分の炎症を抑える働きがあり、下記疾患、皮ふ症状の治療に用います。湿疹・皮ふ炎群（進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ビダール苔癬、放射線皮ふ炎、日光皮ふ炎を含む） 痒疹群（じんましん様苔癬、ストロフルス、固定じんましんを含む）、乾癬、掌蹠膿疱症、円形脱毛症（悪性を含む）、尋常性白斑 なお、本剤は医師が診察に基づき適切と判断され、処方される薬剤です。思わぬ副作用の発生など招かないためにも、自己判断での使用は避けてください。	・生活上注意することは、この薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用は避けてください。
2646708M1089 662640212  トブシム軟膏 0.05%	1 軟膏 白色、一部に赤の縞模様	皮ふ部分の炎症を抑える働きがあり、下記疾患、皮ふ症状の治療に用います。湿疹・皮ふ炎群（進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ビダール苔癬、放射線皮ふ炎、日光皮ふ炎を含む） 痒疹群（じんましん様苔癬、ストロフルス、固定じんましんを含む）、乾癬、掌蹠膿疱症、円形脱毛症（悪性を含む）、尋常性白斑 なお、本剤は医師が診察に基づき適切と判断され、処方される薬剤です。思わぬ副作用の発生など招かないためにも、自己判断での使用は避けてください。	・生活上注意することは、この薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用はさけてください。
2646708Q1021 662640513  トブシムローション 0.05%	1 ローション 白地	皮ふ部分の炎症を抑える働きがあり、下記疾患、皮ふ症状の治療に用います。湿疹・皮ふ炎群（進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ビダール苔癬、放射線皮ふ炎、日光皮ふ炎を含む） 痒疹群（じんましん様苔癬、ストロフルス、固定じんましんを含む）、乾癬、掌蹠膿疱症、円形脱毛症（悪性を含む）、尋常性白斑 なお、本剤は医師が診察に基づき適切と判断され、処方される薬剤です。思わぬ副作用の発生など招かないためにも、自己判断での使用は避けてください。	・生活上注意することは、この薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用は避けてください。
2691701M1023 660443005  ドボネックス軟膏 0.005%	1 軟膏 白色～淡黄色半透明	・皮膚の細胞が異常に増えるために起こる乾癬の症状（皮膚が赤くなる、銀白色の皮が落ちるなど）を、正常な速度で皮膚の細胞が増えるように整えて改善します。	・小児の手の届かないところに保管してください。誤って内服したときは主治医または薬剤師に相談してください。何か異常を感じたときは医療機関を受診してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2691701M1023 660443005 	2 軟膏 ドボネックス軟膏 0.005%	・皮膚の細胞が異常に増えるために起こる乾癬の症状（皮膚が赤くなる、銀白色の皮が落ちるなど）を、正常な速度で皮膚の細胞が増えるように整えて改善します。	・小児の手の届かないところに保管してください。誤って内服したときは主治医または薬剤師に相談してください。何か異常を感じたときは医療機関を受診してください。
帝國製薬株式会社 アステラス製薬株式会社	チューブの記載：f 4 5 5		
1319730Q1133 660433045 	1 点鼻液 ドラケルン点眼液 3.45mg 5mL	アレルギー性鼻炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどをやわらげます。	・ねむけが起こることがありますので、車の運転や危険をともなう機械の作業などに十分注意してください。
2646705M1069 662640216 	1 軟膏 トリシノロン 0.1% 東興薬品工業株式会社 科研製薬株式会社	・この薬は炎症を抑える働きがあり、しつしん湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされ、軽いやけどなどに用います。	・化粧下、ひげそり後など治療以外の目的に使用しないでください。
2646705N1056 662640217 	1 クリーム剤 トリシノロン（クリーム） 0.1% 東興薬品工業株式会社 科研製薬株式会社	・この薬は炎症を抑える働きがあり、しつしん湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされ、軽いやけどなどに用います。	・化粧下、ひげそり後など治療以外の目的に使用しないでください。
2616700Q1131 660408087 	1 液剤 トリゾン液 . Y I 10%	・手指・皮膚の消毒に、又手術部位の消毒に用います。 ・細菌などに感染した皮膚の消毒に用います。 ・瞼や結膜のうの洗浄に用います。 ・医療用具の消毒に用います。	
岩城製薬株式会社			
1319738Q1024 660432002 	1 点眼剤 トルソプト点眼液 0.5% 万有製薬株式会社 万有製薬株式会社	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。
1319738Q2020 660432003 	1 点眼剤 トルソプト点眼液 1% 万有製薬株式会社 万有製薬株式会社	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視力の悪化をおさえます。	コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2699801V1084 660463021 ドルミジンパスタ 黄褐色	軟膏剤 ・床ずれなどの皮膚の潰瘍に用います。	・衣服などに付いた時はすぐに洗い落として下さい。・直射日光、高温をさけて保存してください。
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
	2646711S2035 662640221 ドレニゾンテープ 0.3mg 7.5cm m x 10cm 大日本住友製薬株式 D R E 大日本住友製薬株式	貼付剤 皮膚の炎症を抑える貼りくすりです。	・他の医師を受診するときは、この薬を使っていることを伝えください。
帝國製薬株式会社 大日本住友製薬株式			
	2646711S2035 662640221 ドレニゾンテープ 0.3mg 7.5cm m x 10cm D R E 大日本住友製薬株式	貼付剤 皮膚の炎症を抑える貼りくすりです。	・他の医師を受診するときは、この薬を使っていることを伝えください。
帝國製薬株式会社 大日本住友製薬株式			
	3323701X4078 663320049 トロンビンF 1 0,000単位 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	バイアル 白色～淡黄色 ・組織表面の出血を止める作用があります。	
富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会			
	3323701X3080 663320045 トロンビンF 5, 000単位 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	バイアル 白色～淡黄色 ・組織表面の出血を止める作用があります。	
富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会			
	1329702R3080 660433047 ナイスピー 8.5 mg 8.5g 東興薬品工業株式会 大日本住友製薬株式	定量噴霧式懸濁剤（点鼻剤） ・この薬は、鼻の炎症を抑えることにより、鼻炎の症状（くしゃみ、鼻水、鼻づまり）を改善します。	・他の医師を受診するときは、この薬を使っていることを伝えください。
東興薬品工業株式会 大日本住友製薬株式			
	2399714J1026 662390001 ナウゼリン坐剤 10 10mg 協和醸酵工業株式会 協和醸酵工業株式会	坐剤 ・小児用の薬で、特に風邪や自家中毒などによる吐き気を抑えます。・吐き気などの症状が強い場合に、頓用で使用する薬です。	
協和醸酵工業株式会 協和醸酵工業株式会			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2399714J2022  662390002	1 坐剤 ナウゼリン坐剤 3 0 3 0 m g	・この薬は消化管の運動を整え、吐き気、嘔吐などを抑えたり、胃のむかつき、もたれ感、食欲不振やお腹の張ったような症状を改善します。・特に吐き気や嘔吐症状が強い場合に、頓用で使用する薬です。・小児用ですが、高齢者や体重の少ない方にも使用されます。	
2399714J3029  662390003	1 坐剤 ナウゼリン坐剤 6 0 6 0 m g	・この薬は消化管の運動を整え、吐き気、嘔吐などを抑えたり、胃のむかつき、もたれ感、食欲不振やお腹の張ったような症状を改善します。・特に吐き気や嘔吐症状が強い場合に、頓用で使用する薬です。	
2499702Q1027  660407002	1 点鼻液 ナサニール点鼻液 1 0 m g 5 m L	・子宮内膜症による痛みなどをやわらげます。・子宮筋腫の縮小と子宮筋腫による月経過多、下腹部痛、腰痛、貧血をやわらげます。	・必ず避妊してください。
1324700Q1027  661320008	2 液剤 ナシピン 0 . 0 5 %	・目の充血をとります。	・めまいや眠気があらわれることがありますので、車の運転や危険を伴う機械の操作などには気をつけて下さい。
1324700Q1027  661320008	1 液剤 ナシピン 0 . 0 5 %	・鼻の粘膜の充血をとります。	・めまいや眠気があらわれることがありますので、車の運転や危険を伴う機械の操作などには気をつけて下さい。
2639700Q1047  620003048	1 ローション剤 ナジロキサンロー ション 1 %	皮膚の患部の細菌を殺菌することにより、炎症を抑えて、にきびを治療する外用薬です。	主治医からの指導に従ってください。
2499702Q1035  620003049	1 点鼻液 ナファレリール点鼻 液 0 . 2 % 1 0 m g 5 m L	・ホルモンの分泌を抑えて子宮内膜症の不快な症状を改善します。・ホルモンの分泌を抑えて子宮筋腫を縮小し、不快な症状を改善します。	・この薬を使用中は、コンドームなどの避妊用具で避妊してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 形
診療コード 色
名称 製造会社
販売会社 記号

効能効果

注意事項

	2655709N1029 662650106 ニゾラールクリーム 白色 2 % ヤンセンファーマ株 協和醸酵工業株式会社	2 クリーム剤	<p>・この薬はカビの一種（真菌）の増殖を抑えます。水虫に代表されるような皮膚の表面でカビがとりついて炎症が起きている皮膚真菌症（おむつかぶれを含む）の治療に用います。 ・脂漏性皮膚炎（頭、顔、胸骨部など皮脂を多く分泌する部分や脇の下など）の皮膚が擦れやすい部分にフケのような皮膚の角質が付着し、赤く炎症が起きている状態の湿疹・皮膚炎）の治療に用います。</p>	・この薬を他の人に使用させないで下さい。
	2655709N1029 662650106 ニゾラールクリーム 白色 2 % ヤンセンファーマ株 ヤンセンファーマ株	1 クリーム剤	<p>・この薬はカビの一種（真菌）の増殖を抑えます。水虫に代表されるような皮膚の表面でカビがとりついて炎症が起きている皮膚真菌症（おむつかぶれを含む）の治療に用います。 ・脂漏性皮膚炎（頭、顔、胸骨部など皮脂を多く分泌する部分や脇の下など）の皮膚が擦れやすい部分にフケのような皮膚の角質が付着し、赤く炎症が起きている状態の湿疹・皮膚炎）の治療に用います。</p>	・この薬を他の人に使用させないで下さい。
	1319730Q1141 660433050 ニチカード点眼液 3.45mg 5mL	1 点眼剤（5mLプラスチック容器）	<p>・アレルギーによって出てくる物質の働きを抑え、アレルギー性結膜炎の症状を和らげます。</p>	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
	2649729S1090 660412034 ニックールK cm x 14cm	1 貼付剤（大きさ：10×14cm）	<p>この薬は関節炎や筋肉痛の痛みやはれがある部分にはることにより、それらの症状を抑える作用があります。</p>	<p>・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中および使用後も当分の間、天候にかかわらず、戸外の活動をさけるとともに、色物の衣服、サポーターなどを着用し、貼ったところを紫外線に当てないようにしてください。</p>
	2619716Q1118 660412035 ニッサンアノン#1 0%液	1 液剤	<p>・傷口、手指などの皮膚、器具、家具、物品、部屋などを消毒し、感染を予防します。</p>	<p>取扱い上の注意 ヨードチンキ、マーキュロクロム、硝酸銀、フェノール、過酸化水素、過マンガン酸カリウム等の医薬品が混入すると、沈殿が生ずるので注意してください。本剤は色調の濃淡に差があることがあります。また、寒冷時にはわずかに混濁することがありますが、殺菌効果に影響はありません。温めることにより混濁は溶解しま</p>
	2655702N1027 662650090 ニトコナゾンクリー ム 1 %	1 クリーム剤	<p>皮ふ・手指・爪に増殖したカビ（皮ふ糸状菌・カンジダ菌）を殺す薬です。水虫や皮ふカンジダ症等の治療に用います。</p>	<p>目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。この薬を性器周辺に使用した場合、避妊用ラテックスゴム製品（コンドーム、ペッシャリー）を使用すると、避妊用ラテックスゴム製品の品質が劣化し、破損する可能性があるので、避妊用ラテックスゴム製品の使用はさけてください。</p>

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2655709N1037 620000386 	1 クリーム剤 ニトラゼンクリーム 2% 色：白色チューブの色：白色（帯：黄褐色）キャップの色：白色 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	・水虫やカンジダ症などの原因となる真菌（カビの一種）の増殖を抑える作用があります。 ・脂漏性皮膚炎（頭や顔、胸や脇の下など皮脂を多く分泌するところや擦れやすいところにフケのようなものが付着し、炎症を起こしている状態）の治療に用います。	・この薬を（同じ一つのチューブを）他の人と一緒に使わないで下さい。 ・小児の手の届かない所に保管して下さい。
2171700R1026 662170014 	1 スプレー ニトロールスプレー 163.5mg 10g エーザイ株式会社 エーザイ株式会社	心臓の血管を広げて血液の流れを増やし、心臓の筋肉の酸素不足を改善するとともに、体の血管を広げて心臓の負担を減らします。胸の重苦しい圧迫感やしめつけられるような胸痛（狭心症）を速やかに抑えます。薬を口の粘膜から吸収させて働くスプレー剤です。	・生活上注意することはこの薬により頭痛やめまい、立ちくらみをおこした時は、自動車の運転などの危険をともなう機械の操作をさけてください。飲酒によって、頭痛やめまい、立ちくらみ等がおこることがありますので、注意してください。バイアグラやレビトラは使用しないでください。命にかかる重い副作用を起こすことがあります。
2171701S2029 662170011 	1 貼付剤（はりぐすり） ニトロダームTTS 25mg 10cm 2 日本チバガイギー株 ノバルティス ファ	貼付剤の色：うすいだいだい色 上面の記載：CGDOD ・狭心症の発作（主に心臓の部分に起る胸痛）を予防します。ただし、起こってしまった発作そのものをなおすものではありません。	・頭痛などが起こることがありますので、車の運転や危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。 ・急に立ち上がりると、めまい、ふらつきなどを起こすことがありますので、ゆっくり立ち上がりください。 ・使用するまでは、包装を開けず高温をさけて保管してください。
1319740Q1021 660432010 	1 点眼剤（5mLプラスチック容器） ニプラノール点眼液 0.25% ティカ製薬株式会社 ティカ製薬株式会社	点眼液の色：無色透明 キャップの色：若草色 ・緑内障における視力の悪化をおさえるために眼圧を下げます。	コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使用する前に主治医に相談してください。
1319724Q1022 661310237 	1 点眼液 ニフラン点眼液 0.1% 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	点眼瓶の色：褐色キャップの色：淡青色キャップ 天面：NF ・眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、目の手術後の炎症などをおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1311702Q1036 661310098 	1 点眼剤 ネオシネジンコーワ 5%点眼液 興和株式会社 興和株式会社	溶液の色：無色透明 キャップの色：白色 ・診断・治療のために、瞳孔を広げます。	・生活上注意することは、点眼後外出するような場合はサングラスを用いるなど強い光を直接見ないよう注意してください。 ・視力が元に戻るまでは、車の運転その他危険を伴う機械の操作は避けてください。
2619805X1023 662610055 	1 液 ネオ消アル「ヨシダ」 吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社	青色透明 ・殺菌消毒剤です	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319807M1025 661310099  ネオメドロールE E 軟膏	1 眼軟膏 軟膏の色：淡黄色半透明 チューブの色：白色 キャップの色：白色	・目、耳、鼻、およびそのまわりの炎症症状（かゆい、赤くなるなど）を改善する眼科および耳鼻科用の塗り薬です。	特にありません。
1319807M1025 661310099  ネオメドロールE E 軟膏	2 眼軟膏 軟膏の色：淡黄色半透明 チューブの色：白色 キャップの色：白色	・目、耳、鼻、およびそのまわりの炎症症状（かゆい、赤くなるなど）を改善する眼科および耳鼻科用の塗り薬です。	特にありません。
2612701Q3059 662610053  ネオヨジン液 0%	1 液剤 赤褐色	・手指や皮膚の消毒に用います。・傷口や火傷をした皮膚の消毒に用います。	・皮膚や衣類に付いた場合は水で洗い落とせますので心配いりません。・栓をして、直射日光が当たらないように保存して下さい。
2260701F1069 662230012  ネオヨジンガーグル 7%	1 液剤 色：赤褐色キャップの 色：赤色	・口腔内及びのどを殺菌・消毒・洗浄します。また、口臭を除去します。	・皮膚や衣類に付いた場合は水で洗い落とせますので心配いりません。・歯を抜いた後は、強くうがいをしないで下さい。・銀が変色することがあります。・直射日光を避けて保存して下さい。
2612701Q2036 662610280  ネオヨジングル 0%	1 軟膏 赤褐色	・傷口や火傷した皮膚にいる菌を殺菌・消毒します。	・皮膚や衣類に付いた場合は水で洗い落とせますので心配いりません。・直射日光をさけて保存して下さい。
2612701Q1080 660453026  ネオヨジンスクラブ 7.5%	1 液剤 赤褐色	・手指や皮膚の消毒に用います。・傷口や火傷をした皮膚の消毒に用います。	・衣類に付いた場合は水で洗い落とせますので心配いりません。・栓をして、直射日光が当たらないように保存して下さい。
2612701Q4039 660406075  ネオヨジンフィール ド 10%	1 液剤 赤褐色	・手指や皮膚の消毒に用います。・傷口や火傷をした皮膚の消毒に用います。	・衣類に付いた場合は水で洗い落とせますので心配いりません。・栓をして、直射日光が当たらないように保存して下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2399701E1020 662310014 ネオ・ロイコマイシントローチH g 旭化成ファーマ株式 旭化成ファーマ株式	1 錠剤（直径 18.0 mm） だいだい色 T O Y O 6 5 0	・口内炎の原因となる細菌（ばい菌）を殺すはたらきがあります。	
2612701Q3067 662610296 ネグミン液 10% 暗赤褐色 メルク・ホエイ株式 花王株式会社	3 液剤 メルク・ホエイ株式	・手術部位の皮膚・粘膜の消毒をします。・皮膚・粘膜の傷の消毒をします。・やけどの消毒をします。・細菌に感染した皮膚を消毒します。	
2612701Q3067 662610296 ネグミン液 10% 暗赤褐色 メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式	2 液剤 メルク・ホエイ株式	・手術部位の皮膚・粘膜の消毒をします。・皮膚・粘膜の傷の消毒をします。・やけどの消毒をします。・細菌に感染した皮膚を消毒します。	
2612701Q3067 662610296 ネグミン液 10% 暗赤褐色 メルク・ホエイ株式 サラヤ株式会社	1 液剤 メルク・ホエイ株式	・手術部位の皮膚・粘膜の消毒をします。・皮膚・粘膜の傷の消毒をします。・やけどの消毒をします。・細菌に感染した皮膚を消毒します。	
2260701F1077 662230023 ネグミンガーグル 7% メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式	4 液剤 メルク・ホエイ株式	・殺菌・消毒作用により、咽頭炎、扁桃炎、口内炎、口腔の傷の感染予防をします。・消毒作用により、口腔内を消毒します。	
2260701F1077 662230023 ネグミンガーグル 7% メルク・ホエイ株式 ニプロファーマ株式	3 液剤 メルク・ホエイ株式	・殺菌・消毒作用により、咽頭炎、扁桃炎、口内炎、口腔の傷の感染予防をします。・消毒作用により、口腔内を消毒します。	
2260701F1077 662230023 ネグミンガーグル 7% メルク・ホエイ株式 ニプロファーマ株式	2 液剤 メルク・ホエイ株式	この薬は菌やウイルスを殺すうがい用にのみ使うこと。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2260701F1077 662230023 ネグミンガーグル 7 %	1 液剤 暗赤褐色	・殺菌・消毒作用により、咽頭炎、扁桃炎、口内炎、口腔の傷の感染予防をします。 ・消毒作用により、口腔内を消毒します。	
メルク・ホエイ株式 花王株式会社			
2612701Q2079 660453027 ネグミングル 0 %	1 軟膏剤 暗褐色	キズや火傷(やけど)の皮膚などの細菌、真菌、ウイルスを消毒する薬です。	・衣服等についてしまった場合は、水で洗ってください。
メルク・ホエイ株式 7 メルク・ホエイ株式	識別コード：MH - 71		
2699801V1068 660433054 ネグミンシュガー軟 膏	3 軟膏 褐色	・褥瘡(床ずれ)や皮膚潰瘍の治療に用います。患部の雑菌を殺し、汚れた水分を吸収して創傷治癒を促進させるはたらきがあります。	
メルク・ホエイ株式 日医工株式会社			
2699801V1068 660433054 ネグミンシュガー軟 膏	4 軟膏 褐色	・褥瘡(床ずれ)や皮膚潰瘍の治療に用います。患部の雑菌を殺し、汚れた水分を吸収して創傷治癒を促進させるはたらきがあります。	
メルク・ホエイ株式 ニプロファーマ株式			
2699801V1068 660433054 ネグミンシュガー軟 膏	1 軟膏 褐色	・褥瘡(床ずれ)や皮膚潰瘍の治療に用います。患部の雑菌を殺し、汚れた水分を吸収して創傷治癒を促進させるはたらきがあります。	
メルク・ホエイ株式 花王株式会社			
2699801V1068 660433054 ネグミンシュガー軟 膏	5 軟膏剤(パスタ) 包装：チューブ100g ボトル100g, 50 0 g	この薬は床ずれや皮膚潰瘍部分に使用することにより、感染を予防し肉芽を盛り上げる作用があります。これらの作用により潰瘍を小さくしたり、なおします。	・直射日光又は高温を避けて、室温で保存して下さい。 ・ボトル、チューブ；使用後は乾燥を防ぐため、フタをしっかりと閉めて下さい。
メルク・ホエイ株式 日医工株式会社			
2699801V1068 660433054 ネグミンシュガー軟 膏	6 軟膏剤(パスタ)	この薬は床ずれや皮膚潰瘍部分に使用することにより、感染を予防し肉芽を盛り上げる作用があります。これらの作用により潰瘍を小さくしたり、なおします。	
メルク・ホエイ株式 日医工株式会社			


薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2699801V1068 660433054 ネグミンシュガー軟膏 メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式	7 軟膏 褐色 メルク・ホエイ株式 ニプロファーマ株式	・褥瘡（床ずれ）や皮膚潰瘍の治療に用います。患部の雑菌を殺し、汚れた水分を吸収して創傷治癒を促進させるはたらきがあります。	
2699801V1068 660433054 ネグミンシュガー軟膏 メルク・ホエイ株式 ニプロファーマ株式	2 軟膏剤 褐色 メルク・ホエイ株式 包装の記載：M H - 1 9 2 ニプロファーマ株式	・この薬は床ずれ等の皮膚の潰瘍に用いる薬です。・この薬は患部の雑菌を殺し、汚れた水分を吸着する働きがあります。	
1147700J3068 661140204 ネリオジン坐剤 50 50mg メルク・ホエイ株式	1 坐剤 白色～淡黄色 プラスチックコンテナの 記載：ネリオジン坐剤 5 0 50mg TKS1	・炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。・熱を下げる作用があります。	・ねむけ、めまい、目のかすみがおこった場合には、車の運転や高所での作業、危険を伴う機械の操作はさけてください。・タバコ、飲酒、コーヒー類はこの薬の胃腸障害を強めるおそれがありますので、量をひかえるように心がけてください。
2559814J1038 620000390 ネリコルト坐剤 大正薬品工業株式会 大正薬品工業株式会	1 坐剤 白色～微黄色 包装の記載：T Y K - 3 6 7 ネリコルト坐剤	・「痔」の痛み、出血、腫れを抑えます	入浴を心がけ、血行を良くし、患部を清潔に保って下さい。規則正しい排便習慣を身に付け、便秘しないようにしましょう
2559814J1038 620000390 ネリコルト坐剤 大正薬品工業株式会 ジェイドルフ株式会	2 坐剤 白色～微黄色 包装の記載：T Y K - 3 6 7 ネリコルト坐剤	・「痔」の痛み、出血、腫れを抑えます	入浴を心がけ、血行を良くし、患部を清潔に保って下さい。規則正しい排便習慣を身に付け、便秘しないようにしましょう
2559814M1034 620000391 ネリコルト軟膏 大正薬品工業株式会 大正薬品工業株式会	1 クリーム状の軟膏 白色～帯黄白色 大正薬品工業株式会 ジェイドルフ株式会	・「痔」の痛み、出血、腫れを抑えます	入浴を心がけ、血行を良くし、患部を清潔に保って下さい。規則正しい排便習慣を身に付け、便秘しないようにしましょう
2559814M1034 620000391 ネリコルト軟膏 大正薬品工業株式会 ジェイドルフ株式会	2 クリーム状の軟膏 白色～帯黄白色 大正薬品工業株式会 ジェイドルフ株式会	・「痔」の痛み、出血、腫れを抑えます	入浴を心がけ、血行を良くし、患部を清潔に保って下さい。規則正しい排便習慣を身に付け、便秘しないようにしましょう

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646700N1070 662640518 	1 クリーム ネリゾナクリーム 0.1% インテンディス株式 インテンディス株式	・皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する薬です。 クリームの色：白色 チューブ表面の色：青色の帯	・患部を清潔に保ち、かいたり、直接刺激を与えないようにしてください。・化粧下、ひげそり後にはぬらないようにしてください。・おむつのあたるところにぬっている場合は特に注意してください。・小児の手のとどかないところに保管してください。
2646700Q1025 662640796 	1 液剤 ネリゾナソリューション 0.1% インテンディス株式 インテンディス株式	・皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する薬です。 無色容器表面の色：白色	・患部を清潔に保ち、かいたり、直接刺激を与えないでください。・化粧下、ひげそり後にはぬらないようにしてください。・おむつのあたるところにぬっている場合は特に注意してください。・小児の手のとどかないところに保管してください。
2646700M1074 662640228 	1 軟膏 ネリゾナ軟膏 0.1% インテンディス株式 インテンディス株式	・皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する薬です。 軟膏の色：白色から僅かな黄白色チューブ表面の色：白地に黄色	・患部を清潔に保ち、かいたり、直接刺激を与えないでください。・化粧下、ひげそり後にはぬらないようにしてください。・おむつのあたるところにぬっている場合は特に注意してください。・小児の手のとどかないところに保管してください。
2646700N1088 662640227 	1 クリーム状の軟膏 ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1% インテンディス株式 インテンディス株式	・皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する薬です。 軟膏の色：白色から僅かな黄白色チューブ表面の色：緑色の帯	・患部を清潔に保ち、かいたり、直接刺激を与えないでください。・化粧下、ひげそり後にはぬらないようにしてください。・おむつのあたるところにぬっている場合は特に注意してください。・小児の手のとどかないところに保管してください。
2559814J1020 662550035 	1 坐剤（外径10.2m m） ネリプロクト坐剤 インテンディス株式 インテンディス株式	・「痔」の痛み、出血、腫れをしずめます。 白色から微かな黄色 シート表面の記載：N E R I P R O C T	・毎日入浴して血行をよくし患部を清潔にしてください。また、規則正しい排便習慣を身につけて便秘しないよう注意しましょう。・高温になるところに、また冷凍庫に保管するのは避けてください。・小児の手のとどかないところに保管してください。
2559814M1026 662550036 	1 軟膏 ネリプロクト軟膏 インテンディス株式 インテンディス株式	・「痔」の痛み、出血、腫れをしずめます。 軟膏の色：白色から僅かな黄白色チューブ表面の色：紫色の帯	・毎日入浴して血行をよくし患部を清潔にしてください。また、規則正しい排便習慣を身につけて便秘しないよう注意しましょう。・小児の手のとどかないところに保管してください。
1319708Q1066 661310100 	1 点眼液 ノイチオン点眼用 2% 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・老人性白内障の進行をおさえます。・角膜の修復に用います。 点眼瓶の色：無色上部 キャップの色：緑色	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1319707Q2033 661310282 ノイボルミチン 1% 5mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) ノイボルミチン 点眼剤の色：無色～微黄色 澄明キャップの色：極度の赤い 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	・アレルギー性結膜炎の治療に用いる目薬で、目のアレルギー反応や炎症を抑えます。	
 2399710E1038 660463023 ノードマントローチ 0.25mg 大洋薬品工業株式会社 大洋薬品工業株式会社	1 トローチ (外径 18.1 mm) ノードマントローチ 青色 シートの記載 : t 92 7 - 0.25mg 大洋薬品工業株式会社 大洋薬品工業株式会社	口やのどの細菌を殺す働きがあります。	
 2646705M1077 662640229 ノギロンV軟膏 0.1% メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式	1 軟膏 ノギロンV軟膏 白色 メルク・ホエイ株式 識別コード : h - 196 メルク・ホエイ株式	皮膚の化膿や炎症を抑える塗り薬です。	
 2646705N1064 662640519 ノギロンクリーム 0.1% メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式	1 クリーム ノギロンクリーム 白色 メルク・ホエイ株式 識別コード : h - 195 メルク・ホエイ株式	皮膚の化膿や炎症を抑える塗り薬です。	
 1319717Q1073 661310311 ノスラン点眼液 0.05mL 科研製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	2 液剤 (点眼液) ノスラン点眼液 (成分) 無色～微黄色 透明 (容器) キャップ - 桃色 本体 - 透明 科研製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・この薬は、アレルギーを引き起こす物質が産生されないように作用して、アレルギー反応を抑えます。アレルギー性結膜炎、春季力タルによる眼のかゆみを和らげます。	・生活習慣として、タバコ、アルコール類、刺激味のある食べ物はなるべく控えましょう。 ・お薬を衛生的にお使いいただくために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまづけに触れない様に注意してください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、一度レンズをはずしてから点眼し、5～10分間位してから再び使用してください。
 1319717Q1073 661310311 ノスラン点眼液 0.05mL 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 液剤 (点眼液) ノスラン点眼液 (成分) 無色～微黄色 透明 (容器) キャップ - 桃色 本体 - 透明 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	・この薬は、アレルギーを引き起こす物質が産生されないように作用して、アレルギー反応を抑えます。アレルギー性結膜炎、春季力タルによる眼のかゆみを和らげます。	・生活習慣として、タバコ、アルコール類、刺激味のある食べ物はなるべく控えましょう。 ・お薬を衛生的にお使いいただくために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、容器の先端が直接目やまづけに触れない様に注意してください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、一度レンズをはずしてから点眼し、5～10分間位してから再び使用してください。
 1329700Q1040 661320020 ノスラン点鼻液 0.05mL 科研製薬株式会社 昭和薬品化工株式会社	1 外用液剤 ノスラン点鼻液 無色～微黄色 透明 科研製薬株式会社 該当なし 昭和薬品化工株式会社	・アレルギーを引き起こす物質が産生されないように作用して、アレルギー性鼻炎に伴う鼻水・くしゃみ・鼻づまりなどの症状をやわらげます。	・キャップとストッパーリングをはめて、直射日光を避け、室温で保管してください。 ・開封後は1ヶ月以内にご使用ください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1329700Q1040 661320020 ノスラン点鼻液 1 90mg 9.5mL	2 液剤(点鼻液) 色: (成分)無色~微黄 (容器)白色	・この薬は、アレルギーを引き起こす物質が産生されないように作用して、アレルギー反応を抑えます。アレルギー性鼻炎の、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、かゆみといった症状を和らげます。	・生活習慣として、タバコ、アルコール類、刺激味のある食べ物はなるべく控えましょう。
ノスラン点鼻液 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社			
1329700Q1040 661320020 ノスラン点鼻液 1 90mg 9.5mL	3 液剤(点鼻液) 色: (成分)無色~微黄 (容器)白色	・この薬は、アレルギーを引き起こす物質が産生されないように作用して、アレルギー反応を抑えます。アレルギー性鼻炎の、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、かゆみといった症状を和らげます。	・生活習慣として、タバコ、アルコール類、刺激味のある食べ物はなるべく控えましょう。
ノスラン点鼻液 科研製薬株式会社 昭和薬品化工株式会社			
1319727Q1115 660433055 ノフロキサン点眼液 無色透明 0.3%	1 水性点眼液(無菌)	この薬は、菌を殺し感染症を治療する目薬です。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
ノフロキサン点眼液 日医工株式会社 日医工株式会社			
1319727Q1026 661310242 ノフロ点眼液 0.3%	1 点眼剤 点眼液の色:無色キャップの型・色:ハート型・淡緑色点眼瓶の色:白色	この薬は目の炎症を引き起こしている細菌を殺菌する働きがあります。この薬は原因である感染そのものを治療するための薬です。	(保存方法を含む)・コンタクトレンズをしている人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。・光をさけて保存してください。・この薬は長期間低温(冷蔵庫など)で保存しないでください。
ノフロ点眼液 万有製薬株式会社 万有製薬株式会社			
2646701N2070 662640520 ノルコットクリーム 白色~微黄色 0.12%	1 クリーム	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	・この薬は、光のあたらない場所で、40以下で保管してください。
ノルコットクリーム 辰巳化学株式会社			
2646701N2070 662640520 ノルコットクリーム 白色~微黄色 0.12%	2 クリーム	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	・この薬は、光のあたらない場所で、40以下で保管してください。
ノルコットクリーム 辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社			
2649831S1028 662640663 ハーネシップ シオ工製薬株式会社 日本新薬株式会社	1 パップ剤(14cm×10cm) 淡黄赤色~淡赤褐色 本体識別コード: S20 6包装識別コード: HS	・貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。サリチル酸系の鎮痛・消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。・次のような病気や症状の痛み、は腫れのある人に効果があります。打撲、捻挫、筋肉痛、関節痛、骨折痛	


薬剤情報雑形マスター一覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646721N1047 660422045 ハーコロンクリーム 0.1%	1 クリーム 白色～微黄色	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
	辰巳化学株式会社 共和薬品工業株式会社		
2646721N1047 660422045 ハーコロンクリーム 0.1%	3 クリーム 白色～微黄色	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
	辰巳化学株式会社 宇治製薬株式会社		
2646721N1047 660422045 ハーコロンクリーム 0.1%	2 クリーム 白色～微黄色	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
	辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社		
2646721M1033 660422046 ハーコロン軟膏 0.1%	3 軟膏剤 白色～微黄色	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
	辰巳化学株式会社 共和薬品工業株式会社		
2646721M1033 660422046 ハーコロン軟膏 0.1%	2 軟膏剤 白色～微黄色	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
	辰巳化学株式会社 宇治製薬株式会社		
2646721M1033 660422046 ハーコロン軟膏 0.1%	1 軟膏剤 白色～微黄色	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
	辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社		
2659705Q1034 662650034 ハイアラーゾン液 2%	1 液剤 液剤の色：無色容器の 色：(キャップ)青色， (ボディ)白色	・水虫などの原因菌を殺します。	
	山之内製薬株式会社 アステラス製薬株式	容器表面の記載：Hi - A l a r z i n , 水 水虫 治療剤，日本薬局方 トル	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2659705Q1034 662650034	2 液剤	・水虫などの原因菌を殺します。	
	ハイアラージン液 2 % アステラス製薬株式 アステラス製薬株式	液剤の色：無色容器の 色：(キャップ)青色， (ボディ)白色 容器表面の記載：H i - A l a r z i n , 水 水虫 治療剤，日本薬局方 トル	
	2659705M1024 662650035	1 軟膏	・水虫などの原因菌を殺します。
	ハイアラージン軟膏 2 % 山之内製薬株式会社 アステラス製薬株式	容器表面の記載：水虫治 療剤，ハイアラージン軟 膏，(トルナフタート軟	
	2619716Q1070 662610532	1 液体	・この薬は手指・皮膚、医療用 具、傷口、粘膜、部屋・家具・ 器具・物品などを消毒します。
	ハイジール液 0 % 株式会社伏見製薬所 丸石製薬株式会社	1 帯黄色	・必ず希釈し、濃度に注意して 使用してください。
	2529706H1034 662520001	1 膀胱錠剂（直径 15 . 3 mm）	・トリコモナスという原虫の発 育を抑制して膀胱炎を治療しま す。
	ハイシジン膀胱錠 0 0 m g 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	2 白色 シート記載：2 0 0 m g ハイシジン膀胱錠	
	2649859R1020 662640233	1 エアゾール式外用剤	・直接筋肉や関節部等に噴霧し て炎症や痛みをとります。
	ハイシップS 日本臓器製薬株式会 日本臓器製薬株式会	白い缶、噴霧時：ほとん ど無色透明の液 パック裏面の記載：なし	
	2639802M1034 660406076	1 軟膏	・皮膚の炎症を抑え、症状を改 善します。
	ハイセチンP軟膏 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	乳白色	
	2521701H1033 662550028	1 膀胱錠剂（直径 15 . 1 m m）	・細菌の発育を抑え、膀胱炎を治 療します。
	ハイセチン膀胱錠 0 0 m g 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	1 白色 1 0 0 m g ハイセチン 膀胱錠	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	1319740Q1030 660432011 ハイバジールコーワ 無色透明 点眼液 0.25%	1 点眼剤 緑内障における視力の悪化をおさえるために眼圧を下げます。	・生活上注意することは・コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。
興和株式会社 ノバルティス ファ			
	1319740Q1030 660432011 ハイバジールコーワ 無色透明 点眼液 0.25%	2 点眼剤 緑内障における視力の悪化をおさえるために眼圧を下げます。	・生活上注意することは・コンタクトレンズを使用している人は、この薬を使う前に主治医に相談してください。
興和株式会社 興和株式会社			
	2619819X1033 662610533 ハイポエタノール 無色 2%「ヨシダ」	1 液 ・ヨードの脱色に使います。	
吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社			
	1149701J1021 661140183 バキソ坐剤 2.0m g	1 坐剤（長さ約32mm） パック表面の記載：【コルベンマーク】196	・炎症をしずめ、痛みをやわらげる作用があります。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。
富山化学工業株式会社 大正富山医薬品株式			
	2649730M1026 662640591 バキソ軟膏 0.5%	1 軟膏剤 パック表面の記載：【コルベンマーク】19	・炎症をしずめ、痛みをやわらげる作用があります。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。
富山化学工業株式会社 大正富山医薬品株式			
	1319727Q1034 661310243 バクシダール点眼液 0.3%	2 点眼剤 液の色：無色容器の色 キャップ：ワインレッド 点眼瓶：半透明遮光袋：	細菌による目の感染症の治療に用いられます。 ・生活上注意することは用いられます。
杏林製薬株式会社 武田薬品工業株式会社			
	1319727Q1034 661310243 バクシダール点眼液 0.3%	1 点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：ワインレッド	・結膜炎やものもらい等の眼感染症を引き起こしている細菌を殺菌します。 コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
7121700X1050 667120034 白色軟膏	2 軟膏剤 白色	・皮膚を保護します。	
7121700X1050 667120034 白色軟膏	3 軟膏 白色	・この薬は皮膚を保護する働きがあります。また、いろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。	
7121700X1050 667120034 白色軟膏	1 軟膏 白色	・皮膚を保護します	
7121703X1178 667120033 白色ワセリン	2 ワセリン 白色～微黄色	・皮膚を保護します。・軟膏の基剤です。	
7121703X1178 667120033 白色ワセリン	4 軟膏 白色～微黄色	・この薬は皮膚を保護する働きがあります。また、いろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。	
7121703X1178 667120033 白色ワセリン	5 軟膏剤 白色～微黄色	手足のヒビ、アカギレ、皮膚のあれ、その他皮膚の保護をします。	目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流してください。
7121703X1178 667120033 白色ワセリン	3 軟膏剤 白色～微黄色	・皮膚を保護します。	
		本体識別コード：包装識別コード：	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
7121703X1364 667120033 白色ワセリン	1 ワセリン 白色～微黄色	・皮膚を保護します。 ・軟膏の基剤です。	
株式会社フヂミ製薬 メルク・ホエイ株式			
7121703X1178 667120033 白色ワセリン	1 軟膏 白	・皮膚を保護します	
株式会社フヂミ製薬 メルク・ホエイ株式			
7121703X1178 667120033 白色ワセリン	6 軟膏剤 白色～微黄色	手足のヒビ、アカギレ、皮膚のあれ、その他皮膚の保護をします。	目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流してください。
株式会社フヂミ製薬 メルク・ホエイ株式			
2655700Q1024 662650081 ハクセリンゲル 1%	1 ゲル剤 無色透明	水虫、たむし効く薬です。	治療は毎日行ってください。患部や靴下など通気性をよくし、清潔にしてください。
久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	容器の記載：H P 2 2 0 G		
2655700M1049 662650080 ハクセリン軟膏 1%	1 軟膏剤 白色半透明	水虫、たむし効く薬です。	治療は毎日行ってください。患部や靴下など通気性をよくし、清潔にしてください。
久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	容器の記載：H P 2 2 1 O		
6119700M1027 660408270 バクトロパン鼻腔用 軟膏 2%	1 軟膏剤 白色	患者、もしくは医療従事者が鼻腔内にM R S A（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）を保菌している場合（保菌者）、その菌によって患者が重篤な感染症を起したり、保菌者はその菌を他の患者、医療従事者に伝播させることができます。本剤（軟膏）をM R S Aの鼻腔保菌者の鼻の穴の中（鼻毛のはえているところ）に塗布することにより、保菌しているM R S Aを除菌し、感染症の発症や伝播を予防することができます。	・生活上注意することは主治医の指示に従って下さい。
グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク	チューブの記載：S B 1 5		
7121703X1283 660441024 ハクワセホワイト	1 軟膏 白色～微黄色	・手足のひび、あかぎれ、皮膚のあれなどに用いて、皮膚を保護します。	
山田製薬株式会社 岩城製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646708M1100 662640522 	1 軟膏剤 ハケロン軟膏 0.5% 辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	・この薬は光のあたらない場所で、40℃以下で保管してください。
2669701M1049 662660007 	1 クリーム パスタロン 10% 白色 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	皮膚の角質層に水分を保ち、皮膚の乾燥を防いで皮膚を柔らかく、なめらかに保ちます。	
2669701Q1024 662660030 	1 ローション パスタロン 10% ローション 白色 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	皮膚の角質層に水分を保ち、皮膚の乾燥を防いで皮膚を柔らかく、なめらかに保ちます。	
2669701M2045 662660028 	1 クリーム パスタロン 20% 白色 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	皮膚の角質層に水分を保ち、皮膚の乾燥を防いで皮膚を柔らかく、なめらかに保ちます。	
2669701N2024 662660058 	2 クリーム パスタロン 20% ソフト 白色 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	皮膚の角質層に水分を保ち、皮膚の乾燥を防いで皮膚を柔らかく、なめらかに保ちます。	
2669701N2024 662660058 	1 クリーム パスタロン 20% ソフト 白色 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	皮膚の角質層に水分を保ち、皮膚の乾燥を防いで皮膚を柔らかく、なめらかに保ちます。	
2669701N1028 662660027 	1 クリーム パスタロンソフト 10% 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	皮膚の角質層に水分を保ち、皮膚の乾燥を防いで皮膚を柔らかく、なめらかに保ちます。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649716M1034 660453028 ハスレン軟膏 0.0 33%	1 軟膏 大洋薬品工業株式会 大洋薬品工業株式会	湿疹、やけど、皮ふのたれや 潰瘍などを治療する薬です。	目に入らないように注意してく ださい。入ってしまった場合は すぐに洗い、異常を感じた時は 眼科医の診察を受けてください。
2171701S7039 660453029 バソレーターーテープ 2 2	1 テープ剤 (縦 32 mm 横 45 mm) 白色 27mg 14cm 株式会社三和化学研 株式会社三和化学研	・この薬は胸が重苦しく圧迫感 があつたり、または締めつけら れるような胸痛（狭心症）の発 作の予防に用いる貼り薬です。	お酒は控えて下さい。（血圧低 下作用が増強することがあります） 自動車の運転などの危険を伴 う機械の操作は控えて下さ い。（注意力、集中力、反射運 動能力などが低下することがあ ります）
2171701M1031 662170008 バソレーター軟膏 2%	1 軟膏剤 株式会社三和化学研 株式会社三和化学研	この薬は心臓に栄養を送る血 管である冠状動脈を拡げ、血液 の流れを良くして狭心症の症状 を改善します。また、血管の抵 抗を減らして心臓の負担を軽く します。胸が重苦しく圧迫感が あつたり又は締めつけられるよ うな胸痛（狭心症）の発作の予 防に用います。	・生活上注意することは お酒 は控えて下さい。（血圧低下作 用が増強することがあります） 自動車の運転などの危険を伴 う機械の操作は控えて下さ い。（注意力、集中力、反射運動 能力などが低下することがあ ります）
2649729S1103 660412040 パッペンK m × 14 cm	1 貼付剤 佐藤製薬株式会社 佐藤製薬株式会社	貼ったところの関節や筋肉の炎 症を抑え、痛みをやわらげま す。	・光によってかぶれることがあ るので、貼っている時や貼り終 わった後もしばらくは、貼った ところを濃い色の衣服やサポー ター等でおおい、天気にかかわ らず、日光（紫外線）にあてな いようにしてください。（白や 薄い服は紫外線を通してしま うおそれがあります）・外での運 動などの活動を避けてください。
2659703Q1027 662650039 バトラフェン液 1%	1 液剤 アルフレッサファー 容器の記載：N F 5 4 6 アルフレッサファー	・真菌（カビ）によって起る 白癬症（水虫など）やカンジダ 症などの皮膚病を治療します。	・火気を避けて保存してく ださい。
2659703N1020 662650038 バトラフェンクリー ム 1%	1 クリーム アルフレッサファー チューブ底面の記載：N F 5 4 7 アルフレッサファー	・真菌（カビ）によって起る 白癬症（水虫など）やカンジダ 症などの感 染症を治療しま す。	特になし
1317710Q1026 661310102 パニマイシン点眼液 3 mg	1 点眼剤 明治製菓株式会社 明治製菓株式会社	病気の原因となる細菌を殺す働 きがあります。	・生活上注意することは ・ソ フトコンタクトレンズの装着液 として、またソフトコンタクト レンズを装着したまま使用しな いでください。・点眼にのみ 使用してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1141700J2084 660453032	1 坐剤 パラセタ坐剤 100 乳白色 100mg	・熱を下げる効果があります。	
シオ工製薬株式会社 日本新薬株式会社	本体識別コード：包装識別コード：S106		
1141700J3072 660453033	1 坐剤 パラセタ坐剤 200 乳白色 200mg	・熱を下げる効果があります。	
シオ工製薬株式会社 日本新薬株式会社	本体識別コード：包装識別コード：S107		
2655701Q1045 662650043	1 液剤 パラベール液 1% 無色澄明	水虫治療の外用薬です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。
株式会社大塚製薬工 大塚製薬株式会社			
2655701N1049 662650042	1 クリーム剤 パラベールクリーム 白色 1%	水虫治療の外用薬です。	この薬に含まれている油脂性成分为、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化・破損する可能性があるため、これらとの接触を避けてください。主治医からの生活上の指導に従ってください。
株式会社大塚製薬工 大塚製薬株式会社			
2639805M1020 662630027	1 軟膏剤 バラマイシン軟膏 (BTRC250単位FRM2mg)	・けがや火傷などの時に化膿することを防ぎます。 ・わきがを抑えます。	・特にありません
東洋製薬化成株式会 小野薬品工業株式会	チューブの記載：バラマイシン軟膏		
2639805M1020 662630027	2 軟膏剤 バラマイシン軟膏 (BTRC250単位FRM2mg)	・けがや火傷などの時に化膿することを防ぎます。 ・わきがを抑えます。	・特にありません
東洋製薬化成株式会 小野薬品工業株式会	チューブの記載：バラマイシン軟膏		
2529708J1035 660406078	1 膣用錠剤（長径20.2mm、短径11.0mm） バリナスチンV 100 100mg	カビの一種であるカンジダの発育を抑制して、外陰部や膣の炎症を治療します。	子供の手の届かないところに保管してください。
富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	バリナスチンV 100 100mg		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2529708J2031 660406079 バリナスチンV 30 0 300mg	1 膣用錠剤（長径 20.2 mm、短径 11.0 mm） 白色	カビの一種であるカンジダの発育を抑制して、外陰部や膣の炎症を治療します。	子供の手の届かないところに保管してください。
富士製薬工業株式会社 富士製薬工業株式会社	シート記載：バリナスチンV 100 300mg		
2649834S1021 662640240 ハリホット 4.8 cm x 6 cm	1 硬膏剤 褐色	・痛みと炎症を抑える貼り薬です。筋肉痛、関節痛、骨折痛、捻挫、打撲に用います。	直射日光を避け、なるべく涼しいところに保管してください。 使用後、残った薬は必ず袋にしまって開封口を閉めてください。
大協薬品工業株式会社 ゼリア新薬工業株式	硬膏剤記載：なし		
2646722N1025 662640871 バルデスクリーム	2 クリーム剤 色：白色チューブの色： 0.05% 白色（帯：淡緑色） キャップの色：淡黄色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社			
2646722N1025 662640871 バルデスクリーム	1 クリーム剤 色：白色チューブの色： 0.05% 白色（帯：淡緑色） キャップの色：淡黄色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2646722M1054 662640872 バルデス軟膏 0.05%	2 軟膏剤 色：白色～微黄色・半透明チューブの色：淡青色 (帯：淡緑色) キャップ	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	・この薬の油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化・破損する可能性があるので、これらとの接触を避けてください。
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
2646722M1054 662640872 バルデス軟膏 0.05%	1 軟膏剤 色：白色～微黄色・半透明チューブの色：淡青色 (帯：淡緑色) キャップ	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	・この薬の油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化・破損する可能性があるので、これらとの接触を避けてください。
岩城製薬株式会社			
2646722Q1021 662640873 バルデスローション 0.05%	1 ローション剤 色：乳白色容器の色：白色 キャップの色：淡緑色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
岩城製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2290701G1020 660451009 パルミコート 100 タービュヘイラー 11.2mg (10) アストラゼネカ株式 アストラゼネカ株式	1 ドライパウダー式吸入剤 白色～微黄白色 本体：白色、回転グリップ部：茶色	・気道の炎症を抑えることにより喘息発作を起こりにくくします。毎日規則正しく使用することによって効果があらわれます。	・この薬は発作が起ったときに発作をしめる薬ではありません。主治医から指示された吸入回数を守ってください。・他の医療機関を受診する場合や薬局で薬を買う場合は、この薬を吸入していることを伝えてください。
2290701G2027 660451010 パルミコート 200 タービュヘイラー 11.2mg (20) アストラゼネカ株式 アストラゼネカ株式	1 ドライパウダー式吸入剤 白色～微黄白色 本体：白色、回転グリップ部：こげ茶色	・気道の炎症を抑えることにより喘息発作を起こりにくくします。毎日規則正しく使用することによって効果があらわれます。	・この薬は発作が起ったときに発作をしめる薬ではありません。主治医から指示された吸入回数を守ってください。・他の医療機関を受診する場合や薬局で薬を買う場合は、この薬を吸入していることを伝えてください。
2290701G3023 660451011 パルミコート 200 タービュヘイラー 22.4mg (20) アストラゼネカ株式 アストラゼネカ株式	1 ドライパウダー式吸入剤 白色～微黄白色 本体：白色、回転グリップ部：こげ茶色	・気道の炎症を抑えることにより喘息発作を起こりにくくします。毎日規則正しく使用することによって効果があらわれます。	・この薬は発作が起ったときに発作をしめる薬ではありません。主治医から指示された吸入回数を守ってください。・他の医療機関を受診する場合や薬局で薬を買う場合は、この薬を吸入していることを伝えてください。
1319724Q1073 660444033 バルライザー点眼液 0.1%	1 点眼液 点眼瓶の色：無色透明 キャップの色：淡青色	・眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、目の手術後の炎症などをおさえます。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。・保存方法は室温で、添付の投薬袋に入れ、遮光して保存してください。
2646721N1020 662640253 パンデルクリーム 0.1%	1 クリーム剤 白色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみ等の症状をとります。また、湿しんや皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされ等に用いたりします。	
大正製薬株式会社 大正富山医薬品株式	チューブ記載：T A I S H O 4 9 1		
2646721M1025 662640254 パンデル軟膏 0.1%	1 軟膏剤 無色～白色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみ等の症状をとります。また、湿しんや皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされ等に用いたりします。	
大正製薬株式会社 大正富山医薬品株式	チューブ本体の記載：T A I S H O 4 9 0		
2646721Q1027 662640619 パンデルローション 0.1%	1 ローション剤 乳白色	・炎症を抑える働きがあり発赤、はれ、かゆみ等の症状をとります。また、湿しんや皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされ等に用いたりします。	
大正製薬株式会社 大正富山医薬品株式	ラベル面の記載：T A I S H O 4 8 9		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	1319720Q3027 660407004 ヒアレイン 0 . 1 0 . 1 % 5 mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色 : 無色透明 キャップの色 : 極うすい青	・角膜（黒目）の傷が治るのを助けます。・涙を保持し安定させて目の乾燥を防ぎます。
	1319720Q4023 660407005 ヒアレインミニ 0 . 1 0 . 1 % 0 . 4 mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (0 . 4 mL プラスチック容器) 点眼剤の色 : 無色透明容器の色 : 無色	・角膜（黒目）の傷が治るのを助けます。・涙を保持し安定させて目の乾燥を防ぎます。
	1319720Q5020 660407006 ヒアレインミニ 0 . 3 0 . 3 % 0 . 4 mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (0 . 4 mL プラスチック容器) 点眼剤の色 : 無色透明容器の色 : 青色	・角膜（黒目）の傷が治るのを助けます。・涙を保持し安定させて目の乾燥を防ぎます。
	1319720Q3043 660453034 ヒアルロンサン 0 . 1 0 . 1 % 5 mL 東亜薬品株式会社 日東メディック株式	1 点眼液 (5 mL プラスティック容器) 点眼剤の色 : 無色透明キャップの色 : 淡空色	・角膜（黒目）の表面の傷をおします。目の乾燥を防ぎます。 ・ソフトコンタクトレンズをつけたまま点眼しないでください。・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
	2655708Q1071 660407106 ピクロノール液 1 % 岩城製薬株式会社	2 液剤 色 : 無色 ~ 淡黄色透明容器の色 : 白色キャップの色 : 紺色	・水虫やカンジダ症などの原因となる真菌（カビの一種）を殺菌する作用があります。 ・合成樹脂を軟らかくしたり、塗料が溶けたりすることがあります。・光が当たらないように、また火気をさせて保存して下さい。・患部の清潔と乾燥に心がけて下さい。
	2655708Q1071 660407106 ピクロノール液 1 % 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 液剤 色 : 無色 ~ 淡黄色透明容器の色 : 白色キャップの色 : 紺色	・水虫やカンジダ症などの原因となる真菌（カビの一種）を殺菌する作用があります。 ・合成樹脂を軟らかくしたり、塗料が溶けたりすることがあります。・光が当たらないように、また火気をさせて保存して下さい。・患部の清潔と乾燥に心がけて下さい。
	2655708N1105 660407107 ピクロノールクリー ム 1 % 岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社	2 クリーム剤 色 : 白色チューブの色 : 白色（帯 : 淡青緑色）キャップの色 : 白色	・水虫やカンジダ症などの原因となる真菌（カビの一種）を殺菌する作用があります。 ・患部の清潔と乾燥に心がけて下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2655708N1105 660407107 	1 クリーム剤 ビクロノールクリー ム 1 % 色：白色チューブの色： 白色（帯：淡青緑色） キャップの色：白色	・水虫やカンジダ症などの原因となる真菌（カビの一種）を殺菌する作用があります。	・患部の清潔と乾燥に心がけて下さい。
岩城製薬株式会社			
2619716Q1134 660422050 	1 液剤（粘性） ヒシパンチ液 1 0 % 帶黄色	この薬は菌を殺す消毒剤です。	石けん類はこの薬の殺菌作用を弱めるので、石けん成分を洗い落としてから使用する。
ニプロファーマ株式 ニプロファーマ株式			
1315701Q1065 661310104 	1 点眼液 ビジュアリン 0 . 0 2 %点眼液 点眼瓶の色：褐色キャップ の色：白色キャップ天 面：V I S 0 . 0 2	・眼瞼炎、結膜炎、角膜炎などの炎症をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社			
1315701Q2045 661310206 	1 点眼液 ビジュアリン 0 . 0 5 %点眼液 点眼瓶の色：褐色キャップ の色：白色キャップ天 面：V I S 0 . 0 5	・眼瞼炎、結膜炎、角膜炎などの炎症をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社			
1315701Q4021 661310312 	2 耳鼻科用液 ビジュアリン 0 . 1 %液 点眼瓶の色：褐色	・外耳炎、中耳炎、アレルギー性鼻炎などの炎症をおさえます。	
千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	キャップの色：白色 キャップ天面：V I S 0 . 1		
1315701Q4021 661310312 	1 点眼液 ビジュアリン 0 . 1 %液 点眼瓶の色：褐色キャップ の色：白色キャップ天 面：V I S 0 . 1	・眼瞼炎、結膜炎、角膜炎などの炎症をおさえます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社			
2612701Q3083 662610305 	1 液剤 ヒシヨード液 1 0 % 赤褐色	・手指や皮膚の消毒に用います。 ・傷口ややけどをした皮膚の消毒に用います。	・衣類についた場合は、水で容易に洗い落とせますので心配いりません。
ニプロファーマ株式 ニプロファーマ株式			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2655708Q1047 660407109 	1 チューブ ビスコポール液 1 %	カビの一種であるはくせん菌、カンジダ、ばんふう菌によっておこる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	・生活上注意することは本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。
メルク・ホエイ株式	識別コード：R144		
2655708N1075 660407110 	1 チューブ ビスコポールクリー ム 1 %	カビの一種であるはくせん菌、カンジダ、ばんふう菌によっておこる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	・生活上注意することは本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。
メルク・ホエイ株式	識別コード：R145		
1319727Q1123 660433058 	1 点眼液（5mLプラスティック容器） ビスコレット点眼液 0.3 %	・目の炎症を引き起こしている細菌を殺菌します。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
株式会社富士薬品 日東メディック株式			
2646703N1090 662640874 	1 クリーム ヒズボットクリーム 0.064 %	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	・この薬は、光のあたらない場所に保管してください。
辰巳化学株式会社			
2646703M1116 662640875 	1 軟膏剤 ヒズボット軟膏 0.064 %	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	・この薬は、光のあたらない場所に保管してください。
辰巳化学株式会社			
6250701M1043 660453035 	1 軟膏剤 ビゾクロス軟膏 5 %	・単純ヘルペスウイルスの感染で引き起こされる病気を治します。ウイルスの増殖を抑え、病気の回復を早める働きを持っています	
大正薬品工業株式会 大正薬品工業株式会			
2234700G1027 662230032 	1 吸入液 ビソルボン吸入液 0.2 %	・痰を柔らかくし、排出させやすくすることにより、咳の回数・強さを軽減します。	・生活上注意することは
日本ベーリングガーイ 日本ベーリングガーイ	該当しない		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1319710Q2060 660463028 ビタコバール点眼液 0.02% 5mL	1 点眼液 (5mL プラスティック容器) 点眼剤の色: 紅色 澄明 キャップの色: 紅色	・目の中の調節を行う筋肉の働きを活発にし、目の疲れを改善します。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
東亜薬品株式会社 日東メディック株式			
 1319714Q3064 661310294 ビタスト 0.05% 点眼液 5mL	1 点眼液 点眼瓶の色: 無色キャップの色: 白色キャップ 面: VB20.05	・ビタミンB2の欠乏や代謝障害が関与すると思われる角膜炎、眼瞼炎を治します。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社			
 1319714Q4028 661310295 ビタスト 0.1% 点眼液 5mL	1 点眼液 点眼瓶の色: 無色キャップの色: 白色キャップ 面: VB20.1	・ビタミンB2の欠乏や代謝障害が関与すると思われる角膜炎、眼瞼炎を治します。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社			
 6250700M1103 660444035 ビダラビン軟膏 M E E K 3%	1 軟膏剤 白色	この薬は病気の原因であるウイルスの増殖を抑制し、皮膚症状を治す働きがあります。 帯状疱疹や単純疱疹に用いたりします。	目や口に入らないように注意してください。化粧下やひげそり後などに化粧用として使用しないでください。この薬の基剤として使用されている油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製の品質を劣化・破損する可能性があるため、これらとの接触を避けてください。直射日光と湿気を避けて、室温(30℃以下)で保存してください。子どもの手の届かないところに置いてください。使用後は必ずキャップをよくしめて下さい。
小林化工株式会社 小林化工株式会社	KN718		
 6250700M1103 660444035 ビダラビン軟膏 M E E K 3%	2 軟膏剤 白色	この薬は病気の原因であるウイルスの増殖を抑制し、皮膚症状を治す働きがあります。 帯状疱疹や単純疱疹に用いたりします。	目や口に入らないように注意してください。化粧下やひげそり後などに化粧用として使用しないでください。この薬の基剤として使用されている油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製の品質を劣化・破損する可能性があるため、これらとの接触を避けてください。直射日光と湿気を避けて、室温(30℃以下)で保存してください。子どもの手の届かないところに置いてください。使用後は必ずキャップをよくしめて下さい。
小林化工株式会社 明治製菓株式会社	KN718		
 2646727M1030 660453036 ピトラ軟膏 0.1%	1 軟膏剤 色: 白色~微黄色・半透明チューブの色: 淡青色 (帶: 薄桃色) キャップ	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	目や口に入らないように注意してください。化粧下やひげそり後などに化粧用として使用しないでください。この薬の基剤として使用されている油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製の品質を劣化・破損する可能性があるため、これらとの接触を避けてください。直射日光と湿気を避けて、室温(30℃以下)で保存してください。子どもの手の届かないところに置いてください。使用後は必ずキャップをよくしめて下さい。
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1311707Q1020 661310238 ピバレフリン 0.04% 4%	1 点眼剤（用時溶解型） 点眼剤の色：（溶解前） 白色の粉末（ガラス瓶）、無色透明（5ml）	・緑内障や高眼圧症の治療に用いる目薬で、眼圧（目の中の圧力）を下げる作用があります。	・点眼後、まぶしく感じたり、物がかすんで見えたりする場合があります。このような場合は症状がなまるまで、「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。また、日光やその他の明るい光から目を守るために、昼間の外出時はサングラスをかけるなどしてください。
 1311707Q2027 661310239 ピバレフリン 0.1%	1 点眼剤（用時溶解型） 点眼剤の色：（溶解前） 白色の粉末（ガラス瓶）、無色透明（5ml）	・緑内障や高眼圧症の治療に用いる目薬で、眼圧（目の中の圧力）を下げる作用があります。	・点眼後、まぶしく感じたり、物がかすんで見えたりする場合があります。このような場合は症状がなまるまで、「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。また、日光やその他の明るい光から目を守るために、昼間の外出時はサングラスをかけるなどしてください。
 2619702Q4026 662610297 ヒビディール液 0.05% 25mL	1 液剤 青色	傷口を消毒し、感染を予防します。	このくすりが付着した衣類などを塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミになることがありますので、漂白には酸素系漂白剤をご使用下さい。
 2619713Q1084 662610460 ヒビテン・グルコ ネート液 20%	1 液剤 無色	傷口、手指などの皮膚、器具、家具、物品、部屋などを消毒し、感染を予防します。	このくすりが付着した衣類などを塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミになることがありますので、漂白には酸素系漂白剤をご使用下さい。
 6250700M1057 660433059 ビフビン軟膏 3%	1 3 軟膏剤 白色	・ヘルペスウイルスの増殖を抑えて、皮膚の症状を改善します。	この薬に含まれる油脂成分はコンドームなどの避妊用ラテックス製品の品質を劣化させるため、これらの接触を避けてください。
 6250700M1057 660433059 ビフビン軟膏 3%	2 3 軟膏剤 白色	・ヘルペスウイルスの増殖を抑えて、皮膚の症状を改善します。	この薬に含まれる油脂成分はコンドームなどの避妊用ラテックス製品の品質を劣化させるため、これらの接触を避けてください。
 6250700M1057 660433059 ビフビン軟膏 3%	3 軟膏剤 白色	・帯状疱疹や単純疱疹の原因となるウイルスの増殖を抑え、皮膚症状を改善します	
富士製薬工業株式会社 富士製薬工業株式会社	チューブ表面等の記載： ビフビン軟膏		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1317712M1023 661310244	1 眼軟膏 ピマリシン 1 %眼軟膏「センジュ」 1 0 mg 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・角膜の病気を引き起こしている真菌を殺菌します。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1317712Q1025 661310215	1 点眼液 ピマリシン 5 %点眼液「センジュ」 5 0 mg 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・角膜の病気を引き起こしている真菌を殺菌します。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
2661702X1190 662660011	1 液または結晶 氷酢酸 無色透明または無色もしくは白色 株式会社フヂミ製薬 メルク・ホエイ株式	・洗浄液、収れん液の調剤に用います。 ・矯味の目的で用います。	
2661702X1157 662660011	1 液または結晶 氷酢酸 無色透明または無色もしくは白色 東豊薬品株式会社 メルク・ホエイ株式	・洗浄液、収れん液の調剤に用います。 ・矯味の目的で用います。	
2661702X1327 662660011	1 液または結晶塊 氷酢酸 液：無色透明結晶塊：無色または白色 丸石製薬株式会社	・この薬は洗浄したり、傷口を治すために使用します。 ・また、他の薬のpHを調節し、味を変え飲みやすくするために混ぜて使用します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。
2661702X1041 660431066	1 液または結晶 氷酢酸・O.I. 無色透明または白色（刺激臭） 岩城製薬株式会社	・洗浄液、収れん液の調剤に用います。 ・緩衝、矯味の目的で調剤に用います。	・火気厳禁（引火点が約440と低いので注意して下さい。）
2659710Q1060 620003050	1 外用液剤 ビラス液 1 % 無色～微黄色透明 東和薬品株式会社 東和薬品株式会社	水虫やインキンタムシ、カンジタなどの皮膚感染症を治します。	・この薬はアルコールが含まれていますので、室温で保存し、火に近づけないでください。 ・治療は毎日継続して行うことが大切です。 ・清潔にすることが肝心です。靴、靴下、衣服なども清潔にしてください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2659710N1098 620003051 ビラスクリーム1% 	1 クリーム状軟膏 ビラスクリーム 1% 白色	水虫やインキンタムシ、カンジタなどの皮フ感染症を治します。	・治療は毎日継続して行うことが大切です。・清潔にすることが肝心です。靴、靴下、衣服なども清潔にして下さい。
東和薬品株式会社 東和薬品株式会社			
2655705N1020 662650072 ピルツシンクリーム 1% 	1 クリーム ピルツシンクリーム 白色	・水虫のようなカビで起こる皮膚病を治す塗り薬です。	・小児の手の届かない所に保管してください。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	・商品名等：チューブに 印刷		
3339950M1021 663330002 ヒルドイド 	1 軟膏 ヒルドイド 白色	・使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。また皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのを避けてください。
マルホ株式会社 マルホ株式会社	チューブの記載：ヒルド イド		
2649950M1020 663330007 ヒルドイドゲル 	1 ゲル ヒルドイドゲル 透明なうすい黄色	・使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのを避けてください。
マルホ株式会社 マルホ株式会社	チューブの記載：ヒルド イドゲル		
3339950M1080 660407104 ヒルドイドソフト 	1 軟膏 ヒルドイドソフト 白色	・皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。また使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのを避けてください。
マルホ株式会社 マルホ株式会社	チューブの記載：ヒルド イドソフト		
6250701N1022 660453038 ビルヘキサルクリー ム 5% 	2 クリーム ビルヘキサルクリー ム 5% サンド株式会社 富士製薬工業株式会社	・ヘルペスウイルスの増殖を抑えて、皮膚の症状を改善します。	
6250701N1022 660453038 ビルヘキサルクリー ム 5% 	3 クリーム剤 ビルヘキサルクリー ム 5% サンド株式会社 富士製薬工業株式会社	・単純疱疹の原因となるウイルスの増殖を抑え、皮膚症状を改善します	
	チューブ表面等の記載： ビルヘキサルクリーム 5%		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
6250701N1022 660453038	1 クリーム剤 ビルヘキサルクリー ム 5 %	・単純疱疹の原因となるウイルスの増殖を抑え、皮膚症状を改善します	
サンド株式会社 サンド株式会社	チューブ表面等の記載： ビルヘキサルクリーム 5 %		
2655708N1032 660407113	1 クリーム剤 ビルミチンクリーム 白色 1 %	・カビの一種である白癬菌、カ ンジダ、などによって起こる皮 膚病、水虫、たむし等に効く薬 です	水虫の原因菌は、多湿を好みま す。半部に汗や脂がついたら、 きれいに洗ってよく乾かし、靴 下は通気性の良いものを毎日取 り替えましょう
大正薬品工業株式会 大正薬品工業株式会			
1319722Q1082 660453039	1 点眼剤 ファルキサシン点眼 微黄色～淡黄色透明 液 0 . 3 %	目の炎症を引き起こしている細 菌を殺します。	・生活上注意することは ・コンタクトレンズを使用している 人は、主治医に相談してください。
東洋ファルマー株式 興和株式会社	キャップの色：橙色、本 体記号：P H 0 1 0		
2649731S1062 660433060	1 貼付剤 (1 0 × 1 4 c m) ファルジー 1 0 c (膜体) わずかに黄色 m × 1 4 c m (不織布) 白色	・筋肉や関節の炎症や痛みをや わらげます。	
沢井製薬株式会社 沢井製薬株式会社	S W - 4 7 1		
1319702Q2073 660412044	1 点眼剤 ファルチモ点眼液 0 . 5 0 . 5 %	・目の中の圧力（眼圧）を下げ て、緑内障による視力の悪化を 抑えます。	(保存方法を含む) ・コンタク トレンズをしている人は、主治 医に相談してください。・遮光 袋に入れて保存してくださ い。・ふたを開けて1ヶ月経つ たものは使用しないでくださ い。
東洋ファルマー株式 株式会社ニデック	キャップの色：緑色		
2646732M1023 660421110	1 軟膏（ゲル） ファルネゾンゲル 1 . 4 %	・成分を皮膚（ひふ）から浸透 させ、炎症を抑えることによ り、患部のはれ痛みを和らげま す。	・指関節に使用した場合には薬 をすりこんだ後、60分ぐら いは水洗いなどの仕事はしない でください。・小児の手の届か ない所に保管してください。・ 使用的つど、必ずキャップをき ちんと閉めて保管してくださ い。・直射日光を避け、なるべ く涼しい場所に保管してくださ い。ただし、冷蔵庫などの5 以下の場所には保管しないでく ださい。・火気の近くで保管し ないでください。・アルコール 類に溶けるおそれのあるもの (メガネのわく、塗装家具、革 製品等)に、薬がつかないよう 注意してください。・他の医師 を受診するときはこの薬を使っ ていることを伝えてください。
大鵬薬品工業株式会 大鵬薬品工業株式会	チューブの記載：ファル ネゾンゲル T C 2 6 6		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646732M1031 660421111  ファルネラートゲル 1.4%	1 軟膏(ゲル) 無色～微黄色透明	・成分を皮膚から浸透させ、炎症を抑えることにより、患部のはれ、痛みを和らげます。	・指關節に使用した場合には薬をすりこんだ後、60分ぐらいは水洗いなどの仕事はしないでください。 ・小児の手の届かないところに保管してください。 ・使用のつど、必ずキャップをきちんと閉めて保管してください。 ・直射日光をさけ、なるべく涼しい場所に保管してください。ただし、冷蔵庫などの5以下の場合には保管しないでください。 ・火気の近くで保管しないでください。 ・アルコール類に溶けるおそれのあるもの（メガネのわく、塗装家具、革製品等）に、薬がつかないよう注意してください。 ・他の医師を受診するときはこの薬を使っていることを伝えてください。
2646732M1031 660421111  ファルネラートゲル 1.4%	2 軟膏(ゲル) 無色～微黄色透明	・成分を皮膚から浸透させ、炎症を抑えることにより、患部のはれ、痛みを和らげます。	・指關節に使用した場合には薬をすりこんだ後、60分ぐらいは水洗いなどの仕事はしないでください。 ・小児の手の届かないところに保管してください。 ・使用のつど、必ずキャップをきちんと閉めて保管してください。 ・直射日光をさけ、なるべく涼しい場所に保管してください。ただし、冷蔵庫などの5以下の場合には保管しないでください。 ・火気の近くで保管しないでください。 ・アルコール類に溶けるおそれのあるもの（メガネのわく、塗装家具、革製品等）に、薬がつかないよう注意してください。 ・他の医師を受診するときはこの薬を使っていることを伝えてください。
2699710R1028 660451000  フィプラスストスプ レー250 250 μg(溶解液付)	1 外用液剤(噴霧剤) (成分)粉末・白色、溶 液・無色澄明(容器)ガ ラス瓶・無色透明スプ	・この薬は、傷が治る過程で重要な働きをしている細胞に作用して、褥瘡(床ずれ)や皮膚潰瘍の治癒を早めます。	・この薬は、傷が治る過程で重要な働きをしている細胞に作用して、褥瘡(床ずれ)や皮膚潰瘍の治癒を早めます。
2699710R2024 660451001  フィプラスストスプ レー500 500 μg(溶解液付)	1 外用液剤(噴霧剤) (成分)粉末・白色、溶 液・無色澄明(容器)ガ ラス瓶・無色透明スプ	・この薬は、傷が治る過程で重要な働きをしている細胞に作用して、褥瘡(床ずれ)や皮膚潰瘍の治癒を早めます。	・この薬は、傷が治る過程で重要な働きをしている細胞に作用して、褥瘡(床ずれ)や皮膚潰瘍の治癒を早めます。
2649727N1038 662640621  フエナゾールクリー ム 5%	1 クリーム状軟膏剤 アボットジャパン株 アボットジャパン株	・この薬は皮膚の炎症や痛みを抑える効果があります。	該当しません

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 形
診療コード 色
名称 製造会社
販売会社 記号

効能効果

注意事項

 	2649727N1038	2	クリーム状軟膏剤	・この薬は皮膚の炎症や痛みを抑える効果があります。	該当しません
	662640621		フェナゾールクリー ム 5%		
 	アボットジャパン株	チューブの記載：H C 8 1	アボットジャパン株	・この薬は皮膚の炎症や痛みを抑える効果があります。	該当しません
	アボットジャパン株	チューブの記載：H C 8 0	アボットジャパン株		
 	2649727M1032	2	軟膏剤	・この薬は皮膚の炎症や痛みを抑える効果があります。	該当しません
	662640273		フェナゾール軟膏 5%		
 	アボットジャパン株	チューブの記載：H C 8 1	アボットジャパン株	・この薬は皮膚の炎症や痛みを抑える効果があります。	該当しません
	アボットジャパン株	チューブの記載：H C 8 0	アボットジャパン株		
 	1147700J2126	1	坐剤（全長24mm）	熱を下げたり、痛みや炎症を抑えます。（ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。）	・ねむけやめまい、目のかすみが起ることがありますので、車の運転など危険をともなう機械の作業に十分注意してください。
	661140271		フェニタレン坐剤 2 5 25mg		
F T S 2 5 (表)					
 	1147700J3149	1	坐剤（全長25mm）	熱を下げたり、痛みや炎症を抑えます。（ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。）	・ねむけやめまい、目のかすみが起ることがありますので、車の運転など危険をともなう機械の作業に十分注意してください。
	661140272		フェニタレン坐剤 5 0 50mg		
シート裏面の記載：F T S 5 0 (表)					
 	2649804X1117	2	のり状	この薬は軽度の炎症やかゆみを抑える塗り薬です。	・ふきとる際はぬるま湯に浸した脱脂綿でぬぐって下さい。
	662640274		フェノール・亜鉛華 白色 リニメント		
 	2649804X1117	1	リニメント剤	皮膚のかゆみ、あせも、じんま疹、虫さされのお薬です。	1. 傷および粘膜には使用しないで下さい。2. 長期間または広範囲に使用しないで下さい。3. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い流して下さい。
	662640274		フェノール・亜鉛華 白色 リニメント		
無し					

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649804X1168  660408093 フェノール・亜鉛華 白色 リニメント・YI	1 のり状	・湿疹、汗疹、じんま疹や毒虫に刺された時の痒みや炎症を抑えます。	・粘膜や、頭、毛が生えているところには塗らないように注意して下さい。
2649804X1192  662640834 フェノール・亜鉛華 白色 リニメント(日興製薬) 日興製薬株式会社 丸石製薬株式会社	1 のり状	・この薬は軽度の炎症やかゆみを抑える働きがあります。	・口に入れたり飲むことはやめてください。・ただれたり、かさぶたになっていたり、損傷のあるような皮膚または粘膜には使用しないでください。・目には使用しないでください。・長期間または広い範囲に使用しないでください。
2649804X1109  660431059 フェノール・亜鉛華 白色 リニメント ハチ	1 リニメント剤	・皮膚のかゆみ、あせも、じんましん、虫さされの薬です。	・取扱上の注意 使用後はキャップをしっかりと閉めて保管してください。
2649804X1109  660431059 フェノール・亜鉛華 白色 リニメント ハチ 東洋製薬化成株式会社 小野薬品工業株式会社	2 リニメント剤	・皮膚のかゆみ、あせも、じんましん、虫さされの薬です。	・取扱上の注意 使用後はキャップをしっかりと閉めて保管してください。
2619707X1113  662610478 フェノール水(日興 製薬) 無色澄明 日興製薬株式会社 丸石製薬株式会社	1 液体	・この薬は手指・皮膚・医療用具、部屋・家具・器具・物品、排泄物などを消毒します。・この薬はかゆみを抑える働きがあります。	・必ず薄めて使用してください。・口に入れたり飲むことはやめてください。また、他の人が飲むこともないように十分注意して保管、取り扱いしてください。・原液や高濃度液が皮膚についた場合には刺激を起こすので、すぐに拭き取り、水などで洗い流してください。
2619704X1225  662610465 フェノール(日興製 薬) 無色またはわずかに赤色 日興製薬株式会社 丸石製薬株式会社	1 結晶または結晶性の塊	・この薬は手指・皮膚・医療用具、部屋・家具・器具・物品、排泄物などを消毒します。・この薬はかゆみを抑える働きがあります。	・必ず薄めて使用してください。・口に入れたり飲むことはやめてください。また、他の人が飲むこともないように十分注意して保管、取り扱いしてください。・原液や高濃度液が皮膚についた場合には刺激を起こすので、すぐに拭き取り、水などで洗い流してください。
2473700S3021  660443011 フェミエスト2.1 無色半透明 7mg 7.25cm m2 株式会社ヤクルト本社 なし 武田薬品工業株式会社	3 貼付剤(貼り薬)(円形; 直径約3cm)	・天然型女性ホルモンを皮膚から持続的に補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗などを改善します。	・薬を貼ったまま入浴できますが、はがれることがあるので薬の上から強く洗ったり、こすったりしないでください。・この薬を使用すると月経のような出血が周期的に起こることがあります。主治医から説明を受けた以外の時期に出血が起きたり、不規則に出血が起こる場合、または量が多い場合にはすぐに主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	<p>2473700S3021 2 貼付剤(貼り薬)(円形; 直径約3cm) 660443011 フェミエスト2.1 無色半透明 7mg 7.25cm m2</p> <p>株式会社ヤクルト本 なし 住友製薬株式会社</p>	・天然型女性ホルモンを皮膚から持続的に補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗などを改善します。	・薬を貼ったまま入浴できますが、はがれることがあるので薬の上から強く洗ったり、こすったりしないでください。・この薬を使用すると月経のような出血が周期的に起こることがあります。主治医から説明を受けた以外の時期に出血が起きたり、不規則に出血が起こる場合、または量が多い場合にはすぐに主治医に相談してください
	<p>2473700S3021 4 貼付剤(貼り薬)(円形; 直径約3cm) 660443011 フェミエスト2.1 無色半透明 7mg 7.25cm m2</p> <p>株式会社ヤクルト本 なし 大日本住友製薬株式</p>	・天然型女性ホルモンを皮膚から持続的に補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗などを改善します。	・薬を貼ったまま入浴できますが、はがれることがあるので薬の上から強く洗ったり、こすったりしないでください。・この薬を使用すると月経のような出血が周期的に起こることがあります。主治医から説明を受けた以外の時期に出血が起きたり、不規則に出血が起こる場合、または量が多い場合にはすぐに主治医に相談してください
	<p>2473700S3021 1 貼付剤(貼り薬)(円形; 直径約3cm) 660443011 フェミエスト2.1 無色半透明 7mg 7.25cm m2</p> <p>株式会社ヤクルト本 なし 株式会社ヤクルト本</p>	・天然型女性ホルモンを皮膚から持続的に補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗などを改善します。	・薬を貼ったまま入浴できますが、はがれることがあるので薬の上から強く洗ったり、こすったりしないでください。・この薬を使用すると月経のような出血が周期的に起こることがあります。主治医から説明を受けた以外の時期に出血が起きたり、不規則に出血が起こる場合、または量が多い場合にはすぐに主治医に相談してください
	<p>2473700S4028 1 貼付剤(貼り薬)(円形; 直径約4.3cm) 660443012 フェミエスト4.3 無色半透明 3mg 14.5cm m2</p> <p>株式会社ヤクルト本 なし 大日本住友製薬株式</p>	・天然型女性ホルモンを皮膚から持続的に補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗などを改善します。	・薬を貼ったまま入浴できますが、はがれることがあるので薬の上から強く洗ったり、こすったりしないでください。・この薬を使用すると月経のような出血が周期的に起こることがあります。主治医から説明を受けた以外の時期に出血が起きたり、不規則に出血が起こる場合、または量が多い場合にはすぐに主治医に相談してください
	<p>2473700S4028 2 貼付剤(貼り薬)(円形; 直径約4.3cm) 660443012 フェミエスト4.3 無色半透明 3mg 14.5cm m2</p> <p>株式会社ヤクルト本 なし 武田薬品工業株式会</p>	・天然型女性ホルモンを皮膚から持続的に補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗などを改善します。	・薬を貼ったまま入浴できますが、はがれることがあるので薬の上から強く洗ったり、こすったりしないでください。・この薬を使用すると月経のような出血が周期的に起こることがあります。主治医から説明を受けた以外の時期に出血が起きたり、不規則に出血が起こる場合、または量が多い場合にはすぐに主治医に相談してください
	<p>2473700S4028 3 貼付剤(貼り薬)(円形; 直径約4.3cm) 660443012 フェミエスト4.3 無色半透明 3mg 14.5cm m2</p> <p>株式会社ヤクルト本 なし 株式会社ヤクルト本</p>	・天然型女性ホルモンを皮膚から持続的に補い、更年期障害や卵巣摘出による顔のほてり、のぼせ、異常な発汗などを改善します。	・薬を貼ったまま入浴できますが、はがれることがあるので薬の上から強く洗ったり、こすったりしないでください。・この薬を使用すると月経のような出血が周期的に起こることがあります。主治医から説明を受けた以外の時期に出血が起きたり、不規則に出血が起こる場合、または量が多い場合にはすぐに主治医に相談してください

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2473700S4028 660443012 フェミエスト4.3 3mg 14.5cm m2 株式会社ヤクルト本 住友製薬株式会社	4 貼付剤(貼り薬)(円 形; 直径約4.3cm) 無色半透明 なし	・天然型女性ホルモンを皮膚か ら持続的に補い、更年期障害や 卵巣摘出による顔のほてり、の ぼせ、異常な発汗などを改善し ます。	・薬を貼ったまま入浴できます が、はがれることがあるので薬 の上から強く洗ったり、こすっ たりしないでください。・この 薬を使用すると月経のような出 血が周期的に起こることがあり ますが、主治医から説明を受け た以外の時期に出血が起きた り、不規則に出血が起こる場 合、または量が多い場合にはす ぐに主治医に相談してください
1149701J1030 661140185 フェルデンサポジト リ 20mg ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	1 肛門坐剤(長径29.0 mm) 白色不透明 Feldene-Sup p o. 20mg	・炎症やはれを抑え、こわば り、関節や筋肉の痛みをやわら げます。ただし、病気の原因そ のものを治すものではありません。	・タバコ、アルコール類、コー ヒー等、胃腸障害を強めるおそれ があるものは、量を控えるか さけるよう心がけてください。 ・包装されたまま15以下 のところに保存して下さい。また、子供の手の届かない ところに置いてください。
2649730M1034 662640592 フェルデン軟膏 0.5% ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	1 軟膏 軟膏の色: 淡黄色澄明 チューブの色: 白色 キャップの色: 白色	・炎症やはれを抑え、関節や筋 肉の痛みをやわらげます。ただし、病気の原因そのものを治す ものではありません。	特にありません。
2399700X1167 662310022 複方ヨード・グリセ リン	1 液剤 複方ヨード・グリセ リン	・のどの細菌を殺す働きがあり ます。	・目に入らないように注意して 下さい。万一、目に入った場合 には水またはぬるま湯で洗い流 して下さい。
2399700X1167 662310022 複方ヨード・グリセ リン	3 液 複方ヨード・グリセ リン	・殺菌・消毒により、咽頭、喉 頭、扁桃の炎症による症状を改 善します。	
2399700X1167 662310022 複方ヨード・グリセ リン	4 液体 複方ヨード・グリセ リン	・この薬はのどの細菌やウイル スを殺す働きがあります。	・衣服などについてしまった場 合は、なかなか落ちませんので つかないように注意してください。 ついてしまった場合はハイ ポアルコールなどで拭いてくだ さい。
2399700X1167 662310022 複方ヨード・グリセ リン	6 液剤 複方ヨード・グリセ リン	のどの細菌を殺す働きがありま す。	目に入らないように注意して下 さい。万一、目に入った場合に は水またはぬるま湯で洗い流し て下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2399700X1167 662310022	5 液剤 複方ヨード・グリセリン	・のどを殺菌・消毒し、のどの痛みやはれをおさえます。	
		本体識別コード：包装識別コード：	
2399700X1167 662310022	2 粘稠性の液 複方ヨード・グリセリン	この薬はのどを殺菌・消毒し、のどの痛みや腫れを抑える薬です。（口の中の薬）	
			
2399700X1230 660408244	1 液剤 複方ヨード・グリセリン・YI	・のどに炎症がある場合に直接患部に塗布し、殺菌・消毒をします。	・栓をして、光が当たらないようにして保管して下さい。
		山田製薬株式会社 岩城製薬株式会社	
2399700X1280 662310041	1 液 複方ヨード・グリセリン「ヨシダ」	・のどを殺菌・消毒し、のどの痛みやはれをおさえます	
		吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社	
1319730Q1060 660422054	1 点眼液（5mLプラスティック容器） フサコール点眼液 3.45mg 5mL	・アレルギー性結膜炎の現れた症状をやわらげます。 点眼剤の色：無色～微黄色 透明キャップの色：若草色	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
		メディサ新薬株式会 日東メディック株式	
1319730Q1060 660422054	2 点眼剤 フサコール点眼液 3.45mg 5mL	・花粉症などによるアレルギー性結膜炎の症状を抑えます。 無色～微黄色透明	（保存方法を含む）・コンタクトレンズをしている人は、主治医に相談してください。・ふたを開けて1ヶ月経ったものは使用しないでください。
		メディサ新薬株式会 株式会社ニデック	
1329705Q1050 660422055	1 点鼻液（8mLプラスティック噴霧器） フサコール点鼻液 6.048mg 8mL	・アレルギー性鼻炎のくしゃみ、鼻づまり、鼻水などの症状をやわらげます。 点鼻剤の色：無色～微黄色 透明キャップの色：淡緑色	・眠気が現れる場合は、「車の運転」、「危険を伴う機械の操作」などは行わないでください。
		メディサ新薬株式会 日東メディック株式	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2634708M1029 1 軟こう剤 662630029 フシジンレオ軟膏 20mg	・皮膚感染症の原因となっている細菌を殺す働きがあります。・きず・やけどや手術後の皮膚の二次感染に使用します。	
	三共株式会社 チューブ上の記載(記号): F - L 三共株式会社		
	2499701R2024 1 点鼻剤(淡い鼻用定量噴霧器入り) 660463029 フセット点鼻液 5.75mg 9mL	鼻腔内に噴霧後1~2週間で性ホルモンの分泌を抑え始め、以後使用を継続して抑え続けることにより、性ホルモンに依存する子宮内膜症や中枢性思春期早発症、子宮筋腫による種々の症状を改善します。	使用中は牛乳の摂取、適度の運動日光浴などを心がけてください。
	メルク・ホエイ株式 富士カプセル株式会社		
	2499701R2024 2 点鼻剤(淡い鼻用定量噴霧器入り) 660463029 フセット点鼻液 5.75mg 9mL	鼻腔内に噴霧後1~2週間で性ホルモンの分泌を抑え始め、以後使用を継続して抑え続けることにより、性ホルモンに依存する子宮内膜症や中枢性思春期早発症、子宮筋腫による種々の症状を改善します。	使用中は牛乳の摂取、適度の運動日光浴などを心がけてください。
	株式会社模範薬品研 メルク・ホエイ株式		
	2499701R1044 1 点鼻薬 660444036 ブセレキュア 5.75mg 10mL	・ホルモンの分泌を抑えて子宮内膜症の不快な症状を改善します。・ホルモンの分泌を抑えて子宮筋腫を縮小し、不快な症状を改善します。	この薬を使用中は、コンドームなどの避妊用具で避妊してください。
	富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会		
	1319730Q1168 1 水性点眼液(無菌) 660433065 スマルフェン点眼液 3.45mg 5mL	この薬は、目のアレルギーを抑える目薬です。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
	日医工株式会社 日医工株式会社		
	2529707H1047 1 錠剤(直径約15.0mm) 662550018 フラジール腔錠 50mg	・トリコモナスという原虫が膣内で増えるのをおさえる薬です。	・湿気を避けて、直接光のあたらない所に保管してください。 ・小児の手の届かない所に保管してください。
	塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	フラジール腔錠 250mg	
	2646725N1088 1 クリーム剤 660406087 プラバスタクリーム 0.05%	炎症を抑える働きがあり発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされなどに用います。	目に入らないように注意してください。化粧下やひげそり後などに化粧用として使用しないでください。にぎび、ただのかゆみには使用しないでください。直射日光と湿気を避けて、室温(30以下)で保存してください。子どもの手の届かないところに置いてください。使用後は必ずキャップをよくしめて下さい。
	小林化工株式会社 小林化工株式会社		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646725M1090 660406088 	1 軟膏剤 プラバスタ軟膏 0.05%	炎症を抑える働きがあり発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹や皮膚炎、皮膚のかゆみ、虫さされなどに用います。	目に入らないように注意してください。化粧下やひげそり後などに化粧用として使用しないでください。にぎび、ただのかゆみには使用しないでください。直射日光と湿気を避けて、室温(30以下)で保存してください。子どもの手の届かないところに置いてください。使用後は必ずキャップをよくしめて下さい。
小林化工株式会社 小林化工株式会社			
1319714M1043 661310118 	1 眼軟膏 フラビタン眼軟膏 0.1%	・身体の新陳代謝を正常に保つ働きをもつビタミンB2です。ビタミンB2の欠乏によって生じる目の病気(角膜炎、眼けん炎)の治療に用います。	・つけたすぐ後は、目のかすみがあらわれます。目のかすみがなくなるまでは自動車の運転など危険を伴う機械の操作をしないでください。・あやまって衣服につくと黄色いしみになることがあるので、注意してください。衣服についていた場合は、石けんをつけて水洗いすると落ちます。
トーアエイヨー株式 アステラス製薬株式	容器の記載: フラビタン 眼軟膏、5g		
1319714Q3072 661310289 	1 点眼液 フラビタン点眼液 0.05% 5mL	・身体の新陳代謝を正常に保つ働きをもつビタミンB2です。ビタミンB2の欠乏によって生じる目の病気(角膜炎、眼けん炎)の治療に用います。	・あやまって衣服につくと黄色いしみになることがあるので、注意してください。衣服についていた場合は、石けんをつけて水洗いすると落ちます。
トーアエイヨー株式 アステラス製薬株式	容器の記載: フラビタン 点眼液、社マーク609		
2639806L1029 662630031 	1 粉末剤 フランセチン・T・パウダー	このお薬は患部(創面)の雑菌を殺し、また患部を清浄化します。	
持田製薬株式会社 持田製薬株式会社	粉末の色: 白色容器: プラスチック容器(キャップ青、本体白) 容器表面の記載: 品名、成分、貯法、製造番号、最終有効年月、社名		
2171700S1028 662170009 	1 テープ剤(63.5mm x 63.5mm) フランドルテープS テープの色: 白色半透明 40mg	・心臓の血管を拡げ血流量を増やして、心臓に酸素や栄養を補給するとともに、全身の血管の抵抗を減らし心臓の負担を軽くします。・胸が重苦しく圧迫感があったり、またはしめつけられるような胸痛(狭心症)の発作の予防や治療に用いるもので、徐々に効果をあらわし、長時間効果が持続するテープ剤です。従って、急に起こった発作をすぐに鎮(しづ)めるために使用する薬ではありません。	・飲酒により血圧が下がることがあるので、注意してください。・頭痛などの副作用により、注意力、集中力、反射運動能力などが低下することがあるので、このような場合には、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作をしないでください。
トーアエイヨー株式 アステラス製薬株式	アルミ袋の記載: フランドルテープS、社マーク613		
1315704Q1093 660406163 	2 点眼液(5mLプラスチック容器) フルオロメトロン 0.02%点眼液T 日東メディック株式 日東メディック株式	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1315704Q1093 660406163 	1 点眼液(5mLプラスチック容器) フルオロメトロン 0.02%点眼液T 日東メディック株式 杏林製薬株式会社	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1315704Q1050 661310121 フルオロメトロン 0.02%「ティカ」 0.02% ティカ製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 懸濁性点眼剤 (成分)白色(容器) キャップ:薄い灰色 本体:透明	・この薬は目の炎症やアレルギー症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。 ・点眼するときは、手をせっけんと流水でよく洗って、下まぶたを下にひき、容器の先がまぶたの縁やまづげに触れないようにしてください
1315704Q3100 660406162 フルオロメトロン 0.1%点眼液T 日東メディック株式 杏林製薬株式会社	1 点眼液(5mLプラスチック容器) 点眼剤の色:白色(懸濁液) キャップの色:ピンク色	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1315704Q3100 660406162 フルオロメトロン 0.1%点眼液T 日東メディック株式 日医工株式会社	2 点眼液(5mLプラスチック容器) 点眼剤の色:白色(懸濁液) キャップの色:ピンク色	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1315704Q3100 660406162 フルオロメトロン 0.1%点眼液T 日東メディック株式 日東メディック株式	3 点眼液(5mLプラスチック容器) 点眼剤の色:白色(懸濁液) キャップの色:ピンク色	・目の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1315704Q3053 661310123 フルオロメトロン 0.1%「ティカ」 0.1% ティカ製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 懸濁性点眼剤 (成分)白色(容器) キャップ:濃い灰色本体:透明	・この薬は目の炎症症状を抑えます。	・長期間使用する場合、薬の副作用を防ぐために定期的な検査が必要です。主治医の指示に従って検査を受けてください。 ・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。 ・点眼するときは、手をせっけんと流水でよく洗って、下まぶたを下にひき、容器の先がまぶたの縁やまづげに触れないようにしてください
2647707M1030 662640278 フルコートF 田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社	1 剤径:軟膏 淡青緑色	皮ふの湿疹や皮ふ炎、皮ふのかゆみなどに用いられます。特に湿潤した場合やびらんのある感染を起こしている症状に用います。	・生活上注意することは、このくすりを化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用はさけてください。
2646709N1054 662640279 フルコートクリーム 白 0.025% 田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社	1 剤径:クリーム 皮ふの炎症を抑えるくすりで、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹や皮ふ炎、皮ふのかゆみ等に用いられます。虫さされによる炎症を抑えます。	皮ふの炎症を抑えるくすりで、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹や皮ふ炎、皮ふのかゆみ等に用いられます。虫さされによる炎症を抑えます。	・生活上注意することは、この薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用はさけてください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646709R2028 662640840 フルコートスプレー L 0 . 0 0 7 %	1 スプレー 白色	皮ふの炎症を抑えるくすりで、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹や皮ふ炎、皮ふのかゆみなどに用いられます。虫さされによる炎症を抑えます。	・生活上注意することはこの薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用はさけてください。
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			
2646709Q1026 662640281 フルコートソリュー ション 0 . 0 1 %	1 ソリューション 白色	皮ふの炎症を抑える薬で、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹や皮ふ炎、皮ふのかゆみ等に用いられます。虫さされによる炎症を抑えます。	・生活上注意することはこの薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用はさけてください。
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			
2646709M1067 662640282 フルコート軟膏 0 . 0 2 5 %	1 剤径：軟膏 灰褐色	皮ふの炎症を抑える薬で、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹や皮ふ炎、皮ふのかゆみ等に用いられます。虫さされによる炎症を抑えます。	・生活上注意することはこの薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどぴったりしたものの使用はさけてください。
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			
2290700G8020 620000453 フルタイド 1 0 0 工 アダプターの色：だいだー 1 2 . 2 5 m g 7 . 0 g グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク	1 吸入用エアゾール製剤 アダプターの色：だいだー 1 2 . 2 5 m g 7 . 0 g (アダプター本体)	・このくすりは気道の炎症を抑えることにより、喘息発作の程度、頻度を軽減します。・このくすりはすでに起きてしまった発作を速やかにしめるくすりではありません。・症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれるくすりです。	この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳、など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、特に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診してください。
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			
2290700G5021 660451013 フルタイド 1 0 0 ディスクスカス 1 0 0 μ g 6 0 ブリスター グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク	1 吸入用散剤 ディスクの色：オレンジ色	・このくすりは気道の炎症を抑えることにより、喘息発作の程度、頻度を軽減します。・このくすりはすでに起きてしまった発作を速やかにしめるくすりではありません。・症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれるくすりです。	この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳、など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、特に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診してください。
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			
2290700G2022 660421113 フルタイド 1 0 0 口 タディスク 1 0 0 μ g グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク	1 吸入用散剤（4つのブリスターがある円形ホイルパック） ディスクの色：オレンジ色	・このくすりは気道の炎症を抑えることにより、喘息発作の程度、頻度を軽減します。・このくすりはすでに起きてしまった発作を速やかにしめるくすりではありません。・症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれるくすりです。	この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳、など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、特に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診してください。
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			
2290700G6028 660451016 フルタイド 2 0 0 ディスクスカス 2 0 0 μ g 6 0 ブリスター グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク	1 吸入用散剤 ディスクの色：青色	・このくすりは気道の炎症を抑えることにより、喘息発作の程度、頻度を軽減します。・このくすりはすでに起きてしまった発作を速やかにしめるくすりではありません。・症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれるくすりです。	この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳、など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、特に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診してください。
田辺製薬株式会社 田辺製薬株式会社			

薬剤情報難形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	 <p>2290700G3029 660421114 フルタイド 200口 タディスク 200 μg グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク</p>	<p>吸入用散剤 (4つのブリスターがある円形ホイルパック) ディスクの色 : 赤色</p> <p>Flutide, フルタイド 200 μg, 吸入専用</p>	<p>・このくすりは気道の炎症を抑えることにより、喘息発作の程度、頻度を軽減します。・このくすりはすでに起きてしまった発作を速やかにしめるくすりではありません。・症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれるくすりです。</p> <p>この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳、など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、特に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診して下さい。</p>
	 <p>2290700G7024 660462011 フルタイド 50工 アーチ 9.72mg 10.6g グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク</p>	<p>吸入用エアゾール製剤</p> <p>アダプターの色 : 肌色 (キャップ)、だいだい色 (アダプター本体)</p>	<p>・このくすりは気道の炎症を抑えることにより、喘息発作の程度、頻度を軽減します。・このくすりはすでに起きてしまった発作を速やかにしめるくすりではありません。・症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれるくすりです。</p> <p>この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳、など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、特に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診して下さい。</p>
	 <p>2290700G4025 660451012 フルタイド 50ディスカス スカス 50 μg 6 0ブリスター グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク</p>	<p>吸入用散剤</p> <p>ディスクの色 : ピンク色</p> <p>フルタイド 50ディスカス</p>	<p>・このくすりは気道の炎症を抑えることにより、喘息発作の程度、頻度を軽減します。・このくすりはすでに起きてしまった発作を速やかにしめるくすりではありません。・症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれるくすりです。</p> <p>この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳、など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、特に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診して下さい。</p>
	 <p>2290700G1026 660421112 フルタイド 50ロタディスク 50 μg グラクソ・スミスク グラクソ・スミスク</p>	<p>吸入用散剤 (4つのブリスターがある円形ホイルパック)</p> <p>ディスクの色 : ベージュ色</p> <p>Flutide, フルタイド 50 μg, 吸入専用</p>	<p>・このくすりは気道の炎症を抑えることにより、喘息発作の程度、頻度を軽減します。・このくすりはすでに起きてしまった発作を速やかにしめるくすりではありません。・症状がないときでも毎日規則正しく使用することにより効果があらわれるくすりです。</p> <p>この薬は喘息の発作（呼吸困難、激しい咳、など）を速やかにしめる薬ではありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。万一発作が起きた場合は、特に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診して下さい。</p>
	 <p>2646709S1023 662640289 フルペアンコーワ テープ 0.4mg 5 cm × 10 cm 興和株式会社 興和株式会社</p>	<p>貼付剤 (外形 5 cm × 10 cm)</p> <p>白</p> <p>F A、外袋の識別番号 : 722</p>	<p>乾癬や、慢性化して皮膚が硬くなったり湿疹・皮膚炎、痒疹（虫さされ後の硬結を含む）、掌蹠膿疱症などの炎症を抑え、かゆみを和らげます。瘢痕やケロイドの状態を改善します。</p> <p>・生活上注意することは</p>
	 <p>2646731N1024 662640898 フルメタクリーム 0.1%</p> <p>塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社</p>	<p>クリーム</p> <p>白色～微黄白色</p> <p>商品名等 : チューブに印刷</p>	<p>皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。</p> <p>温度の高くなる所に保管しないでください。小児の手の届かない所に保管してください。</p>
	 <p>2646731M1029 662640899 フルメタ軟膏 0.1% 塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社</p>	<p>軟膏</p> <p>微黄白色</p> <p>商品名等 : チューブに印刷</p>	<p>皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。</p> <p>温度の高くなる所に保管しないでください。小児の手の届かない所に保管してください。</p>

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2646731Q1020 1 ローション 662640900 フルメタローション 無色 0.1%	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	火気には近づけないで下さい。 小児の手の届かない所に保管して下さい。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	商品名等：容器のラベルに印刷		
	1315704Q1077 1 点眼剤（5mLプラスチック容器） 661310125 フルメトロン 0.02% 2 0.02% 点眼剤の色：白色（懸濁液）キャップの色：うすい灰色	・この薬の有効成分はステロイドと呼ばれています。ステロイドは炎症を抑える作用が強く、目のいろいろな炎症に用います。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
	1315704Q3088 1 点眼剤（5mLプラスチック容器） 661310126 フルメトロン 0.1% 0.1% 点眼剤の色：白色（懸濁液）キャップの色：灰色	・この薬の有効成分はステロイドと呼ばれています。ステロイドは炎症を抑える作用が強く、目のいろいろな炎症に用います。	
参天製薬株式会社 参天製薬株式会社			
	2649732S1059 2 貼付剤（10cm×14cm） 662640850 フルルバン 10c 白色 m×14cm	・貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。 非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	・この薬を貼って入浴すると、ヒリヒリすることがありますので、入浴前にはがしてください。
大協薬品工業株式会社 三笠製薬株式会社	薬袋表面の記載：M Z - F L B		
	2649732S1059 1 貼付剤（10cm×14cm） 662640850 フルルバン 10c 貼付剤の色：白色 m×14cm	この薬は炎症を抑え、腫れや痛みをやわらげます。	はがれやすくなることがあるので、汗をかいたり、皮ふがぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
大協薬品工業株式会社 科研製薬株式会社	識別コード：K C - 3 2 2 H F R B (アルミ袋)		
	2649729S2096 1 貼付剤（7×10cm） 660453041 フレストルテープ 7cm×10cm 微黄色半透明～黄色半透明	・貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。ただし、急性期には有効性が確認されていないので使用しないで下さい。	まれに光線過敏症（こうせんかびんしょう：光によるかぶれ）をおこすことがあるので、はがした後も当分の間は、貼ったところを日光などの強い光に当たらないようにしてください。 戸外に出るときは天候に問わらず、濃い色の衣服、サポーター等を着用し、貼付部を紫外線に当てないで下さい。
東和薬品株式会社 東和薬品株式会社			
	2646712M1131 1 軟膏剤 662640320 プレドニゾロン軟膏 白色 0.5% (タツミ)	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社			



薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1315705M1037 661310130 	1 眼軟膏 プレドニン眼軟膏 白色～微帶黃白色 0.25%	目の炎症症状（かゆい、赤くなる等）を改善する眼科用の塗り薬です。	温度の高くなる所に保管しないでください。小児の手の届かない所に保管してください。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	商品名等：チューブに印刷		
2612706Q1024 662610262 	2 液体 プレボダインスクラ 赤褐色澄明 ブ	・この薬は皮膚の細菌、真菌、ウイルスを殺す働きがあり、手指、皮膚の洗浄・消毒に使用します。	・衣服などについてしまった場合は、すぐに水で洗ってください。
丸石製薬株式会社 参天製薬株式会社			
2612706Q1024 662610262 	1 液体 プレボダインスクラ 赤褐色澄明 ブ	・この薬は皮膚の細菌、真菌、ウイルスを殺す働きがあり、手指、皮膚の洗浄・消毒に使用します。	・衣服などについてしまった場合は、すぐに水で洗ってください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2612706Q2020 662610263 	1 液体 プレボダインソリューション 暗赤褐色澄明	・この薬は細菌、真菌、ウイルスを殺す働きがあり、皮膚、粘膜、傷口、やけどの部分の消毒に使用します。	・衣服などについてしまった場合は、すぐに水で洗ってください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2612706Q2020 662610263 	2 液体 プレボダインソリューション 暗赤褐色澄明	・この薬は細菌、真菌、ウイルスを殺す働きがあり、皮膚、粘膜、傷口、やけどの部分の消毒に使用します。	・衣服などについてしまった場合は、すぐに水で洗ってください。
丸石製薬株式会社 参天製薬株式会社			
2612706Q3027 662610264 	1 液体 プレボダインフィールド 赤褐色澄明	・この薬は皮膚の細菌、真菌、ウイルスを殺す働きがあり、皮膚の消毒に使用します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。・直射日光を避けて保存してください。・衣服などについてしまった場合は、すぐに水で洗ってください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2612706Q3027 662610264 	2 液体 プレボダインフィールド 赤褐色澄明	・この薬は皮膚の細菌、真菌、ウイルスを殺す働きがあり、皮膚の消毒に使用します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。・直射日光を避けて保存してください。・衣服などについてしまった場合は、すぐに水で洗ってください。
丸石製薬株式会社 参天製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649719M1143 662640622 プロアリシン軟膏 1 % 前田薬品工業株式会 メリク・ホエイ株式	1 ゼリー状の軟膏 帯黄白色～淡黄色 識別コード：M Y 5 5 C	炎症や痛みをやわらげます。また、外傷後のはれや痛みをやわらげます。変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛	
2559805J1020 662560007 プロクトセディル坐 葉 味の素株式会社 味の素ファルマ株式	1 坐剤 黄白色 シート表面の記載：P r o c t o s e d y l プロ クトセディル	・かゆみ、炎症、感染を抑え、痔の症状を改善します。	・主治医の指示を守って下さい。
2559806M1021 662560008 プロクトセディル軟 膏 味の素株式会社 味の素ファルマ株式	1 軟膏 黄白色 シート表面の記載：プロ クトセディルチュー・プラ ベル面の記載：プロクト	・かゆみ、炎症、感染を抑え、痔の症状を改善します。	・主治医の指示を守って下さい。
2679701Q1047 662670002 フロジン液 5 % 埼玉第一製薬株式会 第一製薬株式会社	1 液剤 緑色	頭の皮ふや白斑のできている皮ふの血管を広げて血液の流れをよくするはたらきで、脱毛や白斑を良くします。	・生活上注意することは湯上がりのあとは、注意して少量を使用してください。
2699705M1020 660412058 プロスタンディン軟 膏 0 . 0 0 3 % 小野薬品工業株式会 小野薬品工業株式会	1 軟膏剤 白色 チューブの記載：プロス タンディン軟膏	・潰瘍ができている部分の血流を改善することにより褥瘡（床ずれ）や皮膚潰瘍を治します。	・特にありません
2699709M2024 620000444 プロトピック軟膏 0 . 0 3 % 小児用 富山フジサワ株式会 アステラス製薬株式	1 軟膏剤 白色～微黄色	・皮膚における炎症反応を抑えて、アトピー性皮膚炎の症状（皮膚が赤くなる、盛り上がった感じの発しん、かゆみなど）を改善します。	・この薬をぬった部分を日光に長時間さらさないよう衣服を工夫するなどの注意をして下さい。また、日焼けランプや紫外線ランプの使用をさせてください。
2699709M2024 620000444 プロトピック軟膏 0 . 0 3 % 小児用 富山フジサワ株式会 アステラス製薬株式	2 軟膏剤 白色～微黄色	・皮膚における炎症反応を抑えて、アトピー性皮膚炎の症状（皮膚が赤くなる、盛り上がった感じの発しん、かゆみなど）を改善します。	・この薬をぬった部分を日光に長時間さらさないよう衣服を工夫するなどの注意をして下さい。また、日焼けランプや紫外線ランプの使用をさせてください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2699709M1028 660432014 	1 軟膏剤 プロトピック軟膏 0.1%	・皮膚における炎症反応を抑え て、アトピー性皮膚炎の症状 (皮膚が赤くなる、盛り上がつ た感じの癢しん、かゆみなど) を改善します。	・この薬をぬった部分を日光に 長時間さらさないよう衣服を工 夫するなどの注意をして下さ い。また、日焼けランプや紫外 線ランプの使用をさせてください。
アステラス製薬株式 アステラス製薬株式			
2699709M1028 660432014 	2 軟膏剤 プロトピック軟膏 0.1%	・皮膚における炎症反応を抑え て、アトピー性皮膚炎の症状 (皮膚が赤くなる、盛り上がつ た感じの癢しん、かゆみなど) を改善します。	・この薬をぬった部分を日光に 長時間さらさないよう衣服を工 夫するなどの注意をして下さ い。また、日焼けランプや紫外 線ランプの使用をさせてください。
藤沢薬品工業株式会 アステラス製薬株式			
1319743Q1025 660443008 	1 点眼剤 プロナック点眼液 0.1%	・点眼瓶の色：無色・ キャップの色：空色・ キャップ天面：BNC	コンタクトレンズを使用してい る人は、主治医に相談してくだ さい。
千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会			
1319727Q1077 660422062 	1 点眼液 プロバール点眼液 0.3%	結膜炎やものもらい等の眼の感 染症を引き起こしている細菌を 殺菌します。	コンタクトレンズを使用してい る人は、主治医に相談してくだ さい。
株式会社模範薬品研 メルク・ホエイ株式			
2646714N1128 662640324 	1 クリーム プロバデルムクリー ム 0.025%	・この薬は皮膚の炎症を抑える 働きがあり発赤、はれ、かゆみ などの症状をとりのぞきます。 湿しんや皮膚炎、虫さされなど の治療に使われます。	・この薬を化粧下やひげそり後 に使用しないでください。・こ の薬を他の人に使用させないで ください。・おしめのあたる部 分にこの薬を使用する時は、 ぴったりしたおしめやビニール 製のパンツの使用は避けてくだ さい。
グラクソ・スミスク 協和醸酵工業株式会			
2646714M1122 662640325 	1 軟膏 プロバデルム軟膏 0.025%	・この薬は皮膚の炎症を抑える 働きがあり発赤、はれ、かゆみ などの症状をとりのぞきます。 湿しんや皮膚炎、虫さされなど の治療に使われます。	・この薬を化粧下やひげそり後 に使用しないでください。・こ の薬を他の人に使用させないで ください。・おしめのあたる部 分にこの薬を使用する時は、 ぴったりしたおしめやビニール 製のパンツの使用は避けてくだ さい。
グラクソ・スミスク 協和醸酵工業株式会			
7121703X1330 667120036 	1 軟膏 プロペト	・この薬は皮膚を保護する働き があります。また、いろいろな 薬を軟膏の形にするために使用 します。	
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
3959701M1027 663950008 プロメライン軟膏 (ジェイドルフ) 50,000単位 ジェイドルフ株式会社 マルホ株式会社	1 軟膏 うすい茶色 ラベルの記載：プロメラ イン軟膏	やけど、潰瘍、床ずれ（褥瘍 (じょくそう)）などで生じた 不要の組織を除去することによ り、傷口の治りを助ける作用が あります。しかし、皮膚かいよう潰瘍 などの原因を取り除くものでは ありません。	・小児の手の届かないところに 保管してください。・温度の高 いところや直射日光の当たると ころに保管するのを避けてくだ さい。・未使用時は必ずキャッ プをしてください。
1319724Q1065 660422064 プロラノン点眼液 0.1% 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5mLプラス チック容器) 点眼剤の色：無色透明 キャップの色：極うすい 黄緑	・結膜炎、角膜炎、眼瞼炎など の目の炎症を抑えます。	
2529704J1029 662550019 フロリード 100 mg 持田製薬株式会社 持田製薬株式会社	1 膜坐剤 コンテナの記載：MO 2 55	腔内や外陰部に増殖したカンジ ダ菌（カビの一一種）を殺菌しま す。	
2655702N1035 662650045 フロリードD 1% 白色 持田製薬株式会社 持田製薬株式会社	1 クリーム剤 チューブの記載：MO 2 58 外用薬	皮膚・手指・爪に増殖したカビ (皮膚糸状菌・カンジダ菌)を 殺す薬です。水虫や皮膚カン ジダ症等の治療に用います。	
2655702Q1023 662650066 フロリードD液 1% 持田製薬株式会社 持田製薬株式会社	1 ローション剤 無色透明	皮膚・手指・爪に増殖したカビ (皮膚糸状菌・カンジダ菌)を 殺す薬です。水虫や皮膚カン ジダ症等の治療に用います。	
1319726Q1072 660444037 ベギータ点眼液 0.1% シオノケミカル株式 株式会社ニデック	1 点眼剤 無色～微黄色透明 キャップの色：紺色	・白内障手術後の炎症を防止し たり、合併症が起こるのを防止 します。	(保存方法を含む)・コンタクト レンズをしている人は、主治 医に相談してください。・遮光 して10以下に保存してくだ さい。・ふたを開けて1ヶ月 経ったものは使用しないでくだ さい。
2619713Q1114 662610463 ヘキザック液 0% 吉田製薬株式会社	1 液 帯黄色	・殺菌消毒剤です。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2619713Q1114 662610463 ヘキザック液 0 %	2 液	・殺菌消毒剤です。	
吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社			
2659711N1025 662650107 ペキロンクリーム 0 . 5 %	2 クリーム	水虫など真菌（カビの一種）による感染症の治療に用いられます。	・生活上注意することは患部を清潔にしてください。水虫の場合はできるだけ毎日、指の隙間までよく洗ってください。靴下は通気性のよいものにし、毎日履き替えてください。水虫の菌は湿った所で増えやすいので、患部ができるだけ乾いた状態にしておいてください。
杏林製薬株式会社 杏林製薬株式会社	チューブの記載：K P - 8 6 1		
2659711N1025 662650107 ペキロンクリーム 0 . 5 %	1 クリーム	水虫など真菌（カビの一種）による感染症の治療に用います。	・生活上注意することは患部を清潔にしてください。水虫の場合ができるだけ毎日、指の隙間までよく洗ってください。靴下は通気性のよいものにし、毎日履き替えてください。水虫の菌は湿ったところで増えやすいので、患部ができるだけ乾いた状態にしておいてください。
K P - 8 6 1			
2669701M1065 660433068 ペギン軟膏 1 0 0 %	1 軟こう剤	・角化症などのときに、皮膚にうるおいを与え、やわらかくなる働きがあります。	
藤永製薬株式会社 三共株式会社	チューブ上の記載(記号)：V G 1 0		
2669701M2088 660433069 ペギン軟膏 2 0 0 %	1 軟こう剤	・角化症などのときに、皮膚にうるおいを与え、やわらかくなる働きがあります。	
藤永製薬株式会社 三共株式会社	チューブ上の記載(記号)：V G 2 0		
2649728N1032 662640532 ベシカムクリーム 5 %	1 クリーム	このくすりは非ステロイド系の外用消炎鎮痛剤で、湿疹や皮膚炎などの皮ふの炎症をしづめ、痛みをやわらげます。また、にぎびを抑えるはたらきがあります。	・生活上注意することは
久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	容器の記載：H P 2 0 5 C		
2649728M1037 662640533 ベシカム軟膏 5 %	1 軟膏	このくすりは非ステロイド系の外用消炎鎮痛剤で、湿疹や皮膚炎などの皮ふの炎症をしづめ、痛みをやわらげます。	・生活上注意することは
久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	容器の記載：H P 2 0 6 0		

薬剤情報雑形マスター覧

形 色 記号	効能効果	注意事項
名称 製造会社 販売会社		
 <p>1325702Q1031 660408271 ベストロン耳鼻科用 10mg(溶解後の液として) 無色～淡黄色澄明</p> <p>・識別コード：B R N (5mL)・シート記載：該当せず</p>	<p>・中耳炎、外耳炎を引き起こしている細菌(ブドウ球菌、綠膿菌、レンサ球菌、プロテウス属等)を殺菌する働きがあります。</p>	<p>この薬を使うことで特に注意することはありません。</p>
 <p>1325702Q1031 660408271 ベストロン耳鼻科用 10mg(溶解後の液として) 無色～淡黄色澄明</p> <p>・識別コード：B R N (5mL)・シート記載：該当せず</p>	<p>・副鼻腔炎を引き起こしている細菌(ブドウ球菌、綠膿菌、レンサ球菌、プロテウス属等)を殺菌する働きがあります。</p>	<p>この薬を使うことで特に注意することはありません。</p>
 <p>1317713Q1020 661310233 ベストロン点眼用 5mg(溶解後の液として) 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社</p> <p>点眼液の色：無色上部 キャップの色：桃色 キャップ天面：B R E</p>	<p>・結膜炎やものもらい等の眼感染症を引き起こしている細菌を殺菌します。</p>	<p>コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。</p>
 <p>1319733Q1048 660463031 ベタキール0.5% 点眼液 メディサ新薬株式会社 日東メディック株式</p> <p>点眼液の色：無色～微黄色澄明キャップの色：白色</p>	<p>・目の中の圧力(眼圧)を下げて、緑内障による視力の悪化を抑えます。</p>	<p>・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。</p>
 <p>2646722M1070 662640880 ベタフルゾン軟膏 0.05%</p> <p>白色、半透明</p> <p>小林化工株式会社 小林化工株式会社</p>	<p>炎症を起こす物質の產生を抑制し炎症を抑え、発赤、腫れ、かゆみなどを改善します。</p>	<p>目に入らないように注意してください。化粧下やひげそり後などに化粧用として使用しないでください。この薬の基剤として使用されている油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化・破損する可能性があるため、これらとの接触を避けてください。直射日光と湿気を避けて、室温(30以下)で保存してください。子どもの手の届かないところに置いてください。使用後は必ずキャップをよくしめて下さい。</p>
 <p>2647708N1022 662640340 ベトネベートNクリーム 白色</p> <p>グラクソ・smithkline 第一製薬株式会社</p>	<p>細菌を殺す薬のはいっているクリームで、皮膚の炎症をおさえ、はれやかゆみをやわらげます。</p>	<p>・生活上注意することは化粧下やひげそり後など、治療以外には使用しないでください。小児の手のとどかない所においてください。直射日光や高温の場所をさけて保管してください。</p>
 <p>2647708M1027 662640341 ベトネベートN軟膏 白色半透明</p> <p>グラクソ・smithkline 第一製薬株式会社</p>	<p>細菌を殺す薬のはいっている軟膏で、皮膚の炎症をおさえ、はれやかゆみをやわらげます。</p>	<p>・生活上注意することは化粧下やひげそり後など、治療以外には使用しないでください。小児の手のとどかない所においてください。直射日光や高温の場所をさけて保管してください。</p>

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646701N2097 662640342 ベトネベートクリー ム 0.12%	1 軟膏剤（クリーム） 白色	皮ふの炎症を抑え、はれやかゆみをやわらげます。	・生活上注意することは化粧下やひげそり後など、治療以外には使用しないでください。
2646701M2121 662640343 ベトネベート軟膏	1 軟膏剤 白色半透明 0.12%	皮ふの炎症を抑え、はれやかゆみをやわらげます。	・生活上注意することは化粧下やひげそり後など、治療以外には使用しないでください。
2642703M1028 662640344 ベナバスタ 4%	1 軟膏 白色	じんましん、湿疹や虫さされなどのかゆみをとります。湿疹や皮ふ炎、皮ふのかゆみ等に用いられます。	
2254700G2026 662220027 ペネトリン吸入液	1 外用液剤 無色 0.5%	・気管支を拡げて、喘息などの症状を和らげる働きがあります。	
3334700M1020 663330004 ヘパリンZ軟膏 0.0単位	1 軟膏 白色ないし類白色	・血行障害による痛みを和らげ、炎症を抑えます。・打撲、捻挫、挫傷後のはれ・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、注射後の硬結ならびに痛みケロイドなどの治療と予防および血栓性静脈炎の治療に用います。	使用後は必ずチューブの栓をして保管ください。
2234700G1035 660433070 ペラミトール吸入液	1 吸入液 無色澄清 0.2%	痰を柔らかくし、排出させやすくすることにより、咳の回数・強さを軽減します。	誤って飲むことのないように注意してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
7990707X1037 660407007 ベリプラス 5mL 4瓶	1 凍結乾燥品（2バイアル）、液（2バイアル） 4バイアル1組からなる 溶解した時、無色でわずかに混濁した液剤	・生体では傷がでて出血すると出血を止めようとする仕組みが働きます。ベリプラスはこのような血が固まる作用を応用した生理的な生体組織接着剤です。生体では出血すると血液内のフィブリノゲン、血液凝固第XIII因子、トロンビンそしてカルシウムイオンと呼ばれる成分が作用し、安定で不溶性のフィブリンと呼ばれる凝固物質を生成します。ベリプラスはこれらの成分から構成されており、更に生成したフィブリンの溶解を防ぐためアプロチニンという成分が加えられています。心臓血管外科領域における心臓・血管縫合部の出血、肺外科領域における肺縫合部・胸膜剥離部からの空気漏れ、脳神経外科領域における硬膜縫合部からの髄液漏れ、消化器外科領域における浸出性出血など広く外科領域で接着・閉鎖を目的として使用されています。	・特にありません。
7990707X5024 660470007 ベリプラス P ンピセット mL 2キット	1 凍結乾燥品（2バイアル）、液（2バイアル） 4バイアルを2組にした 溶解した時、無色でわずかに混濁した液剤	・生体では傷がでて出血すると出血を止めようとする仕組みが働きます。ベリプラスはこのような血が固まる作用を応用した生理的な生体組織接着剤です。生体では出血すると血液内のフィブリノゲン、血液凝固第XIII因子、トロンビンそしてカルシウムイオンと呼ばれる成分が作用し、安定で不溶性のフィブリンと呼ばれる凝固物質を生成します。ベリプラスはこれらの成分から構成されており、更に生成したフィブリンの溶解を防ぐためアプロチニンという成分が加えられています。心臓血管外科領域における心臓・血管縫合部の出血、肺外科領域における肺縫合部・胸膜剥離部からの空気漏れ、脳神経外科領域における硬膜縫合部からの髄液漏れ、消化器外科領域における浸出性出血など広く外科領域で接着・閉鎖を目的として使用されています。	・特にありません。
6250701M1035 660453046 ベルクスロン軟膏 5%	1 軟膏剤 色調：白色キャップの 色：白色	・ヘルペスウイルスの増殖を抑え、単純疱疹の回復を早めます。	
2559807J1020 662560009 ヘルミチンS坐剤	2 坐剤 黄色	痔の症状（出血、痛み、かゆみ、はれ）をやわらげます。 肛門部の手術後の痛み等をやわらげます。	
アステラス製薬株式 会社	・シートの記載：He mitin S		
アステラス製薬株式 会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2559807J1020 	1 坐剤 662560009 ヘルミチンS 坐剤 藤沢薬品工業株式会社 アステラス製薬株式	痔の症状（出血、痛み、かゆみ、はれ）をやわらげます。 肛門部の手術後の痛み等をやわらげます。 ・シートの記載：Heel mitin S	
2252704G2020 	1 定量噴霧式エアゾール剤 660433071 ベロテックエロジル 100 20mg 1 0mL 日本ベーリングガーイ 該当しない 日本ベーリングガーイ	・気管支を広げて、喘息（ぜんそく）の発作をしのぎ、また、呼吸を楽にします。	
2619702Q3151 	1 液 662610282 ベンクロジド5%液 赤色澄明 メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式	・手指や皮膚の消毒、医療器具の消毒をします。	・石けんなどは消毒効果を弱めますので、手洗いなどに用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用してください。
2619702Q2090 	1 液 660406103 ベンクロジドVエタ 淡青紫色 ノール液（0.5%） 株式会社フヂミ製薬 メルク・ホエイ株式	・手術部位の皮膚の消毒や医療器具の消毒をします。	
2619702Q1051 	1 液 662610298 ベンクロジド・エタ 無色～微黄色 ノール液（0.5%） 株式会社伏見製薬所 メルク・ホエイ株式	・手術部位の皮膚の消毒や医療器具の消毒をします。	
2646724N1032 	1 クリーム 662640577 ボアラクリーム 0.12% マルホ株式会社 マルホ株式会社	・使用部位の炎症を抑える働きがあり、湿しん、皮膚炎や虫されなどの発赤、腫れ、かゆみなどの症状を軽くします。 ・チューブの記載：ボアラクリーム	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。
2646724M1037 	1 軟膏 662640578 ボアラ軟膏 0.12% マルホ株式会社 マルホ株式会社	・使用部位の炎症を抑える働きがあり、湿しん、皮膚炎や虫されなどの発赤、腫れ、かゆみなどの症状を軽くします。 ・チューブの記載：ボアラ軟膏	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1314701X1178 662610068	1 粉末 ホウ酸	・目（結膜のう）の洗浄・消毒をします。	
		無色または白色	
1314701X1054 660431005	1 結晶性粉末 ホウ酸・O.I.	・結膜囊の洗浄・消毒に用います。	
		白色	
1314701X1194 660421005	2 結晶性の粉末 ホウ酸（丸石）	・この薬は目を洗うために使用します。	・長期にわたって使用しないでください。
		無色または白色	
1314701X1194 660421005	1 結晶 ホウ酸（丸石）	・この薬は目を洗うために使用します。	・長期にわたって使用しないでください。
		無色または白色	
1314701X1305 662610503	1 粉末 ホウ酸「ヨシダ」	・結膜のうの洗浄・消毒に使います。	
		白	
1314702X1083 662610067	1 粉末 ホウ砂	・目（結膜のう）の洗浄・消毒をします。	
		白色	
1314702X1059 662610067	2 結晶または結晶性の粉末 ホウ砂	眼を洗い、消毒するお薬です。 無し	
			
			健栄製薬株式会社

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1314702X1059 662610067 ホウ砂	1 結晶または結晶性の粉末 無色～白色 無し	眼を洗い、消毒するお薬です。	
健栄製薬株式会社			
1314702X1121 661310325 ホウ砂「ホエイ」	1 結晶性の粉末 白色	・この薬は目を洗うために使用します。	長期にわたって使用しないでください。
2616700Q1409 662610428 ホエスミン	1 液 10% 無色～微黄色	・微生物で汚染された手指・皮膚などの殺菌・消毒をします。 ・医療用具などの消毒をします。	
メルク・ホエイ株式			
2616700Q3118 662610436 ホエスミン50	2 液 無色～微黄色	・微生物で汚染された手指・皮膚などの殺菌・消毒をします。 ・医療用具などの消毒をします。	
メルク・ホエイ株式			
2616700Q3118 662610436 ホエスミン50	1 液 無色～微黄色	・微生物で汚染された手指・皮膚などの殺菌・消毒をします。 ・医療用具などの消毒をします。	
株式会社フヂミ製薬 メルク・ホエイ株式			
2529701H2020 662550021 ホーリンV錠	1 錠剤(全長12.0mm) 1m g	・この薬は女性ホルモンの一種で、腔から挿入して腔や子宮の炎症を改善します。	・定期的に婦人科的検査を受けて下さい。
あすか製薬株式会社 大日本住友製薬株式	シートの記載: TZ18 6(透明ポリ包装に表示)		
2529701H2020 662550021 ホーリンV錠	2 錠剤(全長12.0mm) 1m g	・この薬は女性ホルモンの一種で、腔から挿入して腔や子宮の炎症を改善します。	・定期的に婦人科的検査を受けて下さい。
あすか製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	シートの記載: TZ18 6(透明ポリ包装に表示)		

薬剤情報難形マスター覧

形 色	効能効果	注意事項
記号		
<p>2529701H2020 3 錠剤（全長 12.0 mm） 662550021 ホーリンV錠 1mg 白色</p> <p>あすか製薬株式会社 シートの記載：TZ186 (透明ボリ包装に表示) 住友製薬株式会社</p>	・この薬は女性ホルモンの一種で、腔から挿入して腔や子宮の炎症を改善します。	・定期的に婦人科的検査を受けて下さい。
<p>2259707S1020 2 テープ剤 660421115 ホクナリンテープ 0.5mg 白色</p> <p>アポットジャパン株 HC780 マルホ株式会社</p>	・この薬は、気管支喘息等で息苦しいとき又は息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳を和らげる効果もあります。	・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、使用が過度にならないようにしてください。
<p>2259707S1020 4 テープ剤 660421115 ホクナリンテープ 0.5mg 白色</p> <p>アポットジャパン株 包装材料の記載：ホクナリンテープ 0.5mg マルホ株式会社</p>	・この薬は、気管支喘息等で息苦しいときは息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳をやわらげる効果もあります。	・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、主治医の指示を守って使用してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。・子供の手の届かない所に保存してください。
<p>2259707S1020 1 テープ剤 660421115 ホクナリンテープ 0.5mg 白色</p> <p>アポットジャパン株 HC780 アポットジャパン株</p>	・この薬は、気管支喘息等で息苦しいとき又は息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳を和らげる効果もあります。	・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、使用が過度にならないようにしてください。
<p>2259707S1020 3 テープ剤 660421115 ホクナリンテープ 0.5mg 白色</p> <p>アポットジャパン株 HC780 アポットジャパン株</p>	・この薬は、気管支喘息等で息苦しいときは息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳をやわらげる効果もあります。	・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、使用が過度にならないようにしてください。
<p>2259707S2027 2 テープ剤 660421116 ホクナリンテープ 1mg 白色</p> <p>アポットジャパン株 包装材料の記載ホクナリンテープ 1mg マルホ株式会社</p>	・この薬は、気管支喘息等で息苦しいときは息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳をやわらげる効果もあります。	・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、主治医の指示を守って使用してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。・子供の手の届かない所に保存してください。
<p>2259707S2027 1 テープ剤 660421116 ホクナリンテープ 1mg 白色</p> <p>アポットジャパン株 HC781 アポットジャパン株</p>	・この薬は、気管支喘息等で息苦しいとき又は息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳を和らげる効果もあります。	・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、使用が過度にならないようにしてください。

薬剤情報難形マスター覧

YJコード
診療コード
名称
製造会社
販売会社

効能効果

注意事項



2259707S2027 3 テープ剤

660421116

ホクナリンテープ 1 mg

アボットジャパン株 HC 781

アボットジャパン株

・この薬は、気管支喘息等で息苦しいとき又は息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳を和らげる効果もあります。

・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、使用が過度にならないようしてください。



2259707S2027 4 テープ剤

660421116

ホクナリンテープ 1 mg

アボットジャパン株 HC 781

マルホ株式会社

・この薬は、気管支喘息等で息苦しいとき又は息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳を和らげる効果もあります。

・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、使用が過度にならないようしてください。



2259707S3023 2 テープ剤

660421117

ホクナリンテープ 2 mg

アボットジャパン株 HC 782

マルホ株式会社

・この薬は、気管支喘息等で息苦しいとき又は息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳を和らげる効果もあります。

・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、使用が過度にならないようしてください。



2259707S3023 1 テープ剤

660421117

ホクナリンテープ 2 mg

アボットジャパン株 HC 782

アボットジャパン株

・この薬は、気管支喘息等で息苦しいとき又は息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳を和らげる効果もあります。

・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、使用が過度にならないようしてください。



2259707S3023 4 テープ剤

660421117

ホクナリンテープ 2 mg

アボットジャパン株 HC 782

アボットジャパン株

・この薬は、気管支喘息等で息苦しいとき又は息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳を和らげる効果もあります。

・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、使用が過度にならないようしてください。



2259707S3023 3 テープ剤

660421117

ホクナリンテープ 2 mg

アボットジャパン株 包装材料の記載ホクナリンテープ 2 mg
マルホ株式会社

・この薬は、気管支喘息等で息苦しいときは息苦しくなりそうなときに、その症状を改善または予防する効果があります。また、咳をやわらげる効果もあります。

・過度に使用を続けた場合、不整脈などを起こすことがあるので、主治医の指示を守って使用してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。・子供の手の届かない所に保存してください。



7190700X1023 1 ろう状固体

667190001

ホスコE - 75 白色～微黄色

丸石製薬株式会社

丸石製薬株式会社

・この薬はいろいろな薬を坐薬の形にするために使用します。

・冷蔵庫などすずしいところに保存してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
7190700X1031 667190002 ホスコH - 15	1 ろう状固体 白色～微黄色	・この薬はいろいろな薬を坐薬の形にするために使用します。	・冷蔵庫などすずしいところに保存してください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
7190700X1040 667190003 ホスコS - 55	1 ろう状固体 白色～微黄色	・この薬はいろいろな薬を坐薬の形にするために使用します。	・冷蔵庫などすずしいところに保存してください。
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			
2559808J1024 660407129 ポステリザンF坐薬	1 坐剤 白色	・使用部位の炎症を抑え、細菌の感染を防ぐ作用があり、痔の出血・痛み・腫れ・かゆみなどの症状を軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。・直射日光が当たらない、涼しいところに保管してください。
マルホ株式会社 マルホ株式会社	包装材料の記載：P o s t e r i s a n F M A 2 3 0		
2559700M1026 662560015 ポステリザン（軟膏）	1 軟膏 うすい黄色	・使用部位の細菌の感染を防ぐ作用があり、痔の出血・痛み・腫れ・かゆみなどの症状を軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところに保管するのを避けてください。
マルホ株式会社 マルホ株式会社	チューブの記載：ポステリザン（軟膏）		
2451700Q1024 662450004 ボスマイン液 0.1%	1 液剤 無色～わずかに赤色をおびた透明な液	気管支喘息や百日咳に基づく気管支の痙攣（けいれん）を和らげます。局所麻酔薬の作用を延長させます。手術時、外創、耳鼻咽喉の局所の出血を抑えます。耳鼻咽喉の粘膜の充血や腫れを抑えます。	・生活上注意することは吸入する時は、吸入して2～5分経って効果が不十分であれば、もう一度だけ吸入できますが、続けて使用する必要がある場合でも4～6時間以上経ってから吸入してください。
第一製薬株式会社			
6250700M1111 660444040 ホスマイン軟膏 3%	1 軟膏剤 色：白色～淡黄白色 チューブの色：淡青色 (帯色：緑色)キャップ	・病気の原因となるウイルスの増殖を抑制し、症状を改善します。	
岩城製薬株式会社 岩城製薬株式会社			
1147700J2045 661140195 ボナフェック坐剤 2.5mg	1 坐剤 白色～うすい黄色	炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。また手術後の炎症や痛みをやわらげます。（ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。）熱を下げる作用があります。	めまいやねむけ、目のかすみがおこることがありますので、自動車の運転など危険をともなう機械の操作などはさけて下さい。タバコ、アルコール類、コーヒー類は胃腸障害を強めるおそれがありますので量をひかえるようこころがけてください。
日新製薬株式会社 久光製薬株式会社	シート面の記載：V N C 2.5mg		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1147700J3076 661140205 	1 坐剤 ボナフェック坐剤 5 0 5 0 m g	炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。また手術後の炎症や痛みをやわらげます。(ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。)熱を下げる作用があります。	めまいやねむけ、目のかすみがあることがありますので、自動車の運転など危険をともなう機械の操作などはさけて下さい。タバコ、アルコール類、コーヒー類は胃腸障害を強めるおそれがありますので量をひかえるようこころがけてください。
2612701Q3121 662610283 	1 液 ポピヨドン液 1 0 %	・殺菌消毒剤です	石ケンと混じると殺菌効果が低下するので、塗布する面に石ケンが残っていたら洗い流してから使用して下さい。
2260701F1085 662230024 	1 液 ポピヨドンガーグル 赤褐色 7 %	・うがい薬です。	・石ケンと混じると殺菌効果が低下するので、使用するコップ等に石ケンが残っていたら洗い流してから使用して下さい。
2612701Q1099 660463033 	1 液 ポピヨドンスクラブ 黒褐色 7 . 5 %	・殺菌消毒剤です	ほかの石ケンと混じると殺菌効果が低下するので、塗布する面にほかの石ケンが残っていたら洗い流してから使用して下さい。
2612701Q3130 662610309 	1 液体 ポピラール液 1 0 %	・この薬は皮膚、粘膜の細菌、真菌、ウイルスを殺す働きがあり、皮膚、粘膜の消毒に使用します。	・直射日光を避けて保存してください。・衣服などについてしまった場合は、水で洗ってください。
2260701F1093 662230030 	1 液剤(外用液剤) ポピロンガーグル 赤褐色 7 %	・口の中の炎症を抑えるうがい薬です。・細菌やウイルスを殺すうがい薬です。	
シオ工製薬株式会社 日本新薬株式会社	本体識別コード：包装識別コード：		
2559813J1033 662560014 	1 坐剤 ボラザG坐剤 白色～わずかに黄みをおびた白色	内痔核(いぼ痔)の症状(出血、痛み、はれ)を改善します。	・生活上注意することはおしりはいつも清潔にしましょう。特に入浴は肛門の血液循环をよくしますので、効果的です。排便のとき、無理にいきまないようにしましょう。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 2559813M1021 662550038 ボラザG軟膏 天藤製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	1 軟膏（注入式軟膏） 白色～わずかに黄みをおびた白色 ボラザG軟膏（容器上及びシート前面）	痔核（いぼ痔）の症状（出血、痛み、はれ）を改善します。 裂肛（きれ痔・さけ痔）の症状（出血、痛み）を改善します。 裂肛に伴う傷の治りを早めます。	・生活上注意することは おしりはいつも清潔にしましょう。特に入浴は肛門の血液循环をよくしますので、効果的です。 排便のとき、無理にいきまないようにしましょう。
 2649734Q1034 660443007 ボルタレンゲル 1 %	1 軟こう剤（ゼリー状） 軟こうの色：すきとおった無色～微黄色	・炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。	・この薬はアルコールが含まれていますので、火気に近づけないでください。
 1147700J1057 661140079 ボルタレンサポ 1 2.5 mg	2 坐剤 白色～淡黄色	・熱を下げる作用があります。 ・上気道炎に伴う炎症やはれ、筋肉や関節の痛みも軽くします。ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。	・解熱薬は受診したときの病態に合わせて処方されています。家庭に残っている解熱薬を医師の指示なしに使用しないでください。 ・上気道炎（特にインフルエンザ）では、急激に病気が進行することがあります。病状に注意し、解熱薬をむやみに使用せずに、異常を認めた場合は直ちに主治医に相談してください。 ・めまいやねむり、目のかすみが起こった場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。 ・タバコ、飲酒、コーヒー類はこのくすりの胃腸障害を強めるおそれがありますので、量をひかえるようこころがけてください。 ・高温（35度以上）でとけて変形します。なるべく冷蔵庫で保管してください。一度とけた物は有効成分の片よりを生じますので、切って使うことはできません。
 1147700J1057 661140079 ボルタレンサポ 1 2.5 mg	1 坐剤 白色～淡黄色	・炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。 ・熱を下げる作用があります。	・めまいやねむり、目のかすみが起こった場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。 ・タバコ、飲酒、コーヒー類はこのくすりの胃腸障害を強めるおそれがありますので、量をひかえるようこころがけてください。 ・高温で変形することができますので、15度以下（なるべく冷蔵庫）で保管してください。
 1147700J1057 661140079 ボルタレンサポ 1 2.5 mg	アルミ包装の記載：ボルタレンサポ 1 2.5 mg	アルミ包装の記載：ボルタレンサポ 1 2.5 mg	アルミ包装の記載：ボルタレンサポ 1 2.5 mg

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 形
診療コード 色
名称 製造会社
販売会社 記号

効能効果

注意事項

	1147700J2061	2 坐剤	<ul style="list-style-type: none"> ・熱を下げる作用があります。 ・上気道炎に伴う炎症やは れ、筋肉や関節の痛みも軽くし ます。ただし、病気の原因そ のものをなおすものではありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・解熱薬は受診したときの病態に合わせて処方されています。 家庭に残っている解熱薬を医師の指示なしに使用しないでください。 ・上気道炎（特にインフルエンザ）では、急激に病気が進行することがあります。病状に注意し、解熱薬をむやみに使 用せずに、異常を認めた場合は直ちに主治医に相談してください。 ・めまいやねむり気、目のかすみが起きた場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。 ・タバコ、飲酒、コーヒー類はこのくすりの胃腸障害を強めるおそれがありますので、量をひかえるようこころがけてください。 ・高温（35以上）でと けて変形します。なるべく冷蔵庫で保管してください。一度と けた物は有効成分の片よりを生じますので、切って使うことはできません。
	661140080	ボルタレンサポ 25 mg		
	1147700J2061	1 坐剤	<ul style="list-style-type: none"> ・炎症やはれ、筋肉や関節の痛 みを軽くします。ただし、病 気の原因そのものをなおすもの ではありません。 ・熱を下げる 作用があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・めまいやねむり気、目のかすみ が起きた場合には、車の運転 や危険を伴う機械の操作などは 行わないでください。 ・タバ コ、飲酒、コーヒー類はこのく すりの胃腸障害を強めるおそれ がありますので、量をひかえる ようこころがけてください。 ・高温で変形する ことがありますので、15以下 (なるべく冷蔵庫)で保管してく ださい。
	661140080	ボルタレンサポ 25 mg		
	1147700J3084	2 坐剤	<ul style="list-style-type: none"> ・熱を下げる作用があります。 ・上気道炎に伴う炎症やは れ、筋肉や関節の痛みも軽くし ます。ただし、病気の原因そ のものをなおすものではありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・解熱薬は受診したときの病態に合わせて処方されています。 家庭に残っている解熱薬を医師の指示なしに使用しないでください。 ・上気道炎（特にインフルエンザ）では、急激に病気が進行することがあります。病状に注意し、解熱薬をむやみに使 用せずに、異常を認めた場合は直ちに主治医に相談してください。 ・めまいやねむり気、目のかすみが起きた場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。 ・タバ コ、飲酒、コーヒー類はこのく すりの胃腸障害を強めるおそれ がありますので、量をひかえる ようこころがけてください。 ・高温（35以上）でと けて変形します。なるべく冷蔵庫で保管してください。一度と けた物は有効成分の片よりを生じますので、切って使うことはできません。
	661140081	ボルタレンサポ 50 mg		
	1147700J3084	1 坐剤	<ul style="list-style-type: none"> ・炎症やはれ、筋肉や関節の痛 みを軽くします。ただし、病 気の原因そのものをなおすもの ではありません。 ・熱を下げる 作用があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・めまいやねむり気、目のかすみ が起きた場合には、車の運転 や危険を伴う機械の操作などは 行わないでください。 ・タバ コ、飲酒、コーヒー類はこのく すりの胃腸障害を強めるおそれ がありますので、量をひかえる ようこころがけてください。 ・高温で変形する ことがありますので、15以下 (なるべく冷蔵庫)で保管してく ださい。
	661140081	ボルタレンサポ 50 mg		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649734S1031 620001946 ボルタレンテープ 7 cm × 10 cm 同仁医薬化工株式会 ノバルティス ファ	1 貼付剤 (7 × 10 cm) テープ部 はだ色粘着部 すきとおった無色～淡 黄色	・炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。	
1147700J2070 661140197 ボルマゲン坐剤 25 2.5 mg 大正薬品工業株式会 大正薬品工業株式会	1 坐剤 白色～淡黄色 コンテナの記載：TYK 184	・熱を下げる作用があります。 ・上気道炎に伴う炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。	解熱剤は受診した時の病態にあわせて処方されているので家庭に残っているものを指示なしに使用しないでください。めまいや眠気、目のかすみが起こった場合、車の運転や危険を伴う機械の操作などなどは避けてください。
1147700J2070 661140197 ボルマゲン坐剤 25 2.5 mg メルク・ホエイ株式	2 坐剤 白～淡黄色 V o l m a g e n 2 5 TYK 184	・炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。 ・熱を下げる作用があります。	めまいやねむけ、目のかすみがおこることがあります。このような症状に気づいたら、車の運転や危険をともなう機械の操作などはさけてください。タバコ、アルコール類、コーヒー類はこのくすりの胃腸障害を強めるおそれがありますので、量をひかえるようこころがけてください。
1147700J3092 661140206 ボルマゲン坐剤 50 5.0 mg メルク・ホエイ株式	1 坐剤 白～淡黄色 V o l m a g e n 5 0 TYK 185	・炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。 ・熱を下げる作用があります。	めまいやねむけ、目のかすみがおこることがあります。このような症状に気づいたら、車の運転や危険をともなう機械の操作などはさけてください。タバコ、アルコール類、コーヒー類はこのくすりの胃腸障害を強めるおそれがありますので、量をひかえるようこころがけてください。
1147700J3092 661140206 ボルマゲン坐剤 50 5.0 mg 大正薬品工業株式会 大正薬品工業株式会	2 坐剤 白色～淡黄色 コンテナの記載：TYK 185	・熱を下げる作用があります。 ・上気道炎に伴う炎症やはれ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものをなおすものではありません。	解熱剤は受診した時の病態にあわせて処方されているので家庭に残っているものを指示なしに使用しないでください。めまいや眠気、目のかすみが起こった場合、車の運転や危険を伴う機械の操作などなどは避けてください。
2619708X1088 662610070 ホルマリン シオ工製薬株式会社 日本新薬株式会社	1 液剤 無色澄明 本体識別コード：包装識 別コード：	・殺菌消毒剤です。	
2619708X1088 662610070 ホルマリン 日本新薬株式会社	2 液剤 無色澄明 本体識別コード：包装識 別コード：	・殺菌消毒剤です。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2619708X1142 620001545	1 液 ホルマリン「メタ ル」	・殺菌消毒剤です	
2659708Q1020 662650095	1 液剤 ボレー液 1 %	水虫やたむし、いんきんたむしなどの原因となる(白癬(はくせん)菌や癪風(でんぶう)菌)に強い抗菌力があり、殺菌的にはたらきます。	治療は毎日行ってください。患部や靴下など通気性をよくし、清潔にしてください。
	久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	容器の記載: H P 2 4 4 L	
2659708N1023 662650096	1 クリーム ボレークリーム 1 %	水虫やたむし、いんきんたむしなどの原因となる白癬(はくせん)菌や癪風(でんぶう)菌)に強い抗菌力があり、殺菌的にはたらきます。	治療は毎日行ってください。患部や靴下など通気性をよくし、清潔にしてください。
	久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	チューブの記載: H P 2 4 3 C	
2634712X1048 662630050	1 バイアル	・腸内の細菌を殺します。 ・細菌による炎症を治療します。	
	ポロミキシンB末 (富士製薬) 50 万単位 富士製薬工業株式会 富士製薬工業株式会	白色～黄褐色	
2691700N1059 620002323	1 クリーム剤 ポンアルファクリー ム 2 μg / g 0 . 0 0 2 % 帝人ファーマ株式会 帝人ファーマ株式会	乾癬を始めとする皮膚の一番外側の角質層が厚くなる病気のための、活性型ビタミンD3のお薬です。皮膚の細胞の状態を整えて、症状(かさぶた、赤み、発しんなど)をやわらげます。	直射日光と高温を避けて、涼しい所に保管してください。小児の手の届かないところに保管してください。
2691700M1053 620002324	1 軟膏剤 ポンアルファ軟膏 2 μg / g 0 . 0 0 0 2 % 帝人ファーマ株式会 帝人ファーマ株式会	乾癬を始めとする皮膚の一番外側の角質層が厚くなる病気のための、活性型ビタミンD3のお薬です。皮膚の細胞の状態を整えて、症状(かさぶた、赤み、発しんなど)をやわらげます。	直射日光と高温を避けて、涼しい所に保管してください。小児の手の届かないところに保管してください。
2691700M2025 660462006	1 軟膏剤 ポンアルファハイ軟 膏 2 0 μg / g 0 . 0 0 2 % 帝人ファーマ株式会 帝人ファーマ株式会	皮膚の細胞の状態を整えて、乾癬の症状(かさぶた、赤み、発しんなど)をやわらげる、活性型ビタミンD3のお薬です。	直射日光と高温を避けて、涼しい所に保管してください。小児の手の届かないところに保管してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2691700Q1047 620002325  ボンアルファロー ション 2 μg / g 0 . 0 0 2 % 帝人ファーマ株式会 帝人ファーマ株式会	1 ローション剤 白色	乾癬を始めとする皮膚の一番外側の角質層が厚くなる病気のため、活性型ビタミンD3のお薬です。皮膚の細胞の状態を整えて、症状(かさぶた、赤み、発しんなど)をやわらげます。	直射日光と高温を避けて、涼しい所に保管してください。小児の手の届かないところに保管してください。
1147700J1090 661140274  ポンフェナック坐剤 12.5 12.5 mg ゼリア新薬工業株式	1 坐剤(全長22mm) 白色～微黄色 コンテナの記載:ポン フェナック坐剤 12.5 K Y O 1 0 1	・炎症を抑え、痛みをやわらげる働きがあり、リウマチ、関節炎、腰痛および後陣痛などの痛みや炎症を改善します。また、熱を下げる作用があります。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。	・解熱薬は受診したときの、症状に合わせて処方されます。家庭に残っている解熱薬を医師の指示なしに使用しないでください。・ねむけ、注意力や集中力の低下が起こった場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作は避けて下さい。
1147700J2088 661140198  ポンフェナック坐剤 25 25 mg 京都薬品工業株式会 ゼリア新薬工業株式	1 坐剤(全長26.0mm) 白色～微黄色 コンテナの記載:ポン フェナック坐剤 25 K Y O 1 0 2	・炎症を抑え、痛みをやわらげる働きがあり、リウマチ、関節炎、腰痛および後陣痛などの痛みや炎症を改善します。また、熱を下げる作用があります。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。	・解熱薬は受診したときの、症状に合わせて処方されます。家庭に残っている解熱薬を医師の指示なしに使用しないでください。・ねむけ、注意力や集中力の低下が起こった場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作は避けて下さい。
1147700J3106 661140207  ポンフェナック坐剤 50 50 mg 京都薬品工業株式会 ゼリア新薬工業株式	1 坐剤(全長27.0mm) 白色～微黄色 コンテナの記載:ポン フェナック坐剤 25 K Y O 1 0 3	・炎症を抑え、痛みをやわらげる働きがあり、リウマチ、関節炎、腰痛および後陣痛などの痛みや炎症を改善します。また、熱を下げる作用があります。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。	・解熱薬は受診したときの、症状に合わせて処方されます。家庭に残っている解熱薬を医師の指示なしに使用しないでください。・ねむけ、注意力や集中力の低下が起こった場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作は避けて下さい。
2646713N1085 662640623  マイアロンクリーム 0 . 0 5 % ・チューブの記載: M Y 1 0 1 1 C	1 クリーム 白色～微黄色	いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
2646713M1080 662640540  マイアロン軟膏 0 . 0 5 % M Y 0 5 (5 g) M Y 1 0 (1 0 g)	1 軟膏 白色～微黄色	いろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。
2646713Q1065 662640881  マイアロンローション 0 . 0 5 %	1 ローション 白色	主に頭部のいろいろな種類の皮膚症状や皮膚の炎症を鎮めます。	患部の清潔に心がけてください。皮膚炎が悪化するので多量の汗をかいたり、刺激の強い香辛料を多量にとったりすることはやめましょう。また、病変部をかいたりして直接刺激しないことも大切です。

薬剤情報雑形マスター覧

形 色	効能効果	注意事項
記号		
<p>2655708Q1020 1 液 (瓶入り 10ml) 662650074  マイコスポール液 1% バイエル薬品株式会社 バイエル薬品株式会社</p>	<p>カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によっておこる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。</p>	<p>・生活上注意することは 火気近くに近づけないでください。使用済みの容器は火中に投じないでください。 本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。 本剤中のアルコール成分により合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので注意してください。(フローリング等) 水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。</p>
<p>2655708N1024 1 クリーム (チューブ入り 10g) 662650075  マイコスポールク リーム 1% バイエル薬品株式会社 バイエル薬品株式会社</p>	<p>カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によっておこる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。</p>	<p>・生活上注意することは 本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。 水虫の原因である白癬菌は多湿を好みます。患部に汗や脂が付いたら、きれいに洗ってよく乾かし、靴下は通気性のよいものを毎日とりかえましょう。</p>
<p>2646725N1029 2 クリーム 662640579  マイザークリーム 白色 0.05% 三菱ウェルファーマ チューブの記載:マイザークリーム 三菱ウェルファーマ</p>	<p>・湿しん、皮ふ炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮ふの炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。</p>	
<p>2646725N1029 3 クリーム 662640579  マイザークリーム 白色 0.05% 三菱ウェルファーマ チューブの記載:マイザークリーム 三菱ウェルファーマ</p>	<p>・湿しん、皮ふ炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮ふの炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。</p>	
<p>2646725N1029 1 クリーム 662640579  マイザークリーム 白色 0.05% 三菱ウェルファーマ チューブの記載:マイザークリーム 日研化学株式会社</p>	<p>・湿しん、皮ふ炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮ふの炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。</p>	
<p>2646725M1023 1 軟膏 662640580  マイザーソフト 0.05% 三菱ウェルファーマ 三菱ウェルファーマ</p>	<p>・湿しん、皮ふ炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮ふの炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。</p>	
<p>2646725M1023 2 軟膏 662640580  マイザーソフト 0.05% 三菱ウェルファーマ 三菱ウェルファーマ</p>	<p>・湿しん、皮ふ炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮ふの炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。</p>	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646725M1023 662640580 	3 軟膏 マイザー軟膏 0 . 白色で僅かに特異な臭い 0 %	・湿しん、皮ふ炎、虫さされやアレルギーによる症状の皮ふの炎症やかゆみ、赤みなどをおさえます。	
1329702R5023 660407133 	2 エアゾール剤 マイリー点鼻液 9 . 3 7 5 m g 7 . 5 g	・この薬は、鼻の炎症を抑えることにより、鼻炎の症状が起こるのを防ぎます。・しかし、この薬は鼻炎の原因を治す薬ではありません。	
1329702R5023 660407133 	1 点鼻液 マイリー点鼻液 9 . 3 7 5 m g 7 . 5 g	・鼻の粘膜の炎症を抑え、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの鼻症状を改善します。	
2459700J1024 660412059 	1 腔坐剤 (2 9 mm × 1 0 mm) マイリス腔坐剤 6 白色～微黄色 0 0 m g	・子宮口はお産が近づくまでその口が固く厚い壁で閉ざされています。お産が近づいたりお産が始まると、この部分が次第にやわらかく薄くなって開いてきます。この変化を「子宮頸管の熟化」といい、お産が無理なく順調に進むのに重要なことです。この薬は、「子宮頸管の熟化」を促進させ、お産の準備状態を整える作用があります。	
7123701X1041 667120016 	1 粘稠性のある液体 マクロゴール4 0 0 無色澄明	・この薬は軟膏や坐薬を作ると同時に使用します。 ・湿気を避けて保存してください。	
7123703X1032 667120017 	1 パラフィンようの小塊 (粒) マクロゴール4 0 0 白色	・この薬はいろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。	
7123700M1040 667120019 	2 軟膏 マクロゴール軟膏 白色	・皮膚を保護します。滲出液を吸収し、乾燥を早める作用があります	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	7123700M1040 667120019 マクロゴール軟膏	1 軟膏 白色	・この薬は皮膚を保護する働きがあります。また、いろいろな薬を軟膏の形にするために使用します。
	2619702Q2040 662610284 マスキンR・エタ ノール液(0.5W /V%) 0.5%	1 液体 赤色透明	・この薬は手術部位の皮膚や医療用具を消毒します。
	2619702Q1060 662610285 マスキンW・エタ ノール液(0.5W /V%) 0.5%	1 液体 無色透明	・この薬は手術部位の皮膚や医療用具を消毒します。
	2619702Q3160 662610073 マスキン液(5W/ V%) 5%	1 液体 赤色透明	・この薬は手指・皮膚、医療用具、皮膚の創傷部位、部屋・家具・器具・物品などの消毒に使用します。
	2260700B1089 662230020 マズレニンG 0. 4%	3 微粒状の散剤 M I - 4 · G M Z	・この薬は炎症を抑えるうがい薬です。 ・光をあてない工夫をして、で きるだけ30以下で保存して ください。・空気、光により 徐々に色がなくなりますので、 開封後の保存には注意してく ださい。
	2260700B1089 662230020 マズレニンG 0. 4%	2 微粒状の散剤 M I - 6 · G M Z	・この薬は炎症を抑えるうがい薬です。 ・光をあてない工夫をして、で きるだけ30以下で保存して ください。・空気、光により 徐々に色がなくなりますので、 開封後の保存には注意してく ださい。
	2260700B1089 662230020 マズレニンG 0. 4%	4 微粒状の散剤 ヒートシールの記載：M I - 6 · G M Z	・この薬は炎症を抑えるうがい薬です。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2260700B1089 662230020 マズレニンG 4%	1 微粒状の散剤 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は炎症を抑えるうがい薬です。	・光をあてない工夫をして、で きるだけ30℃以下で保存して ください。・空気、光により 徐々に色がなくなりますので、 開封後の保存には注意してくだ さい。
2619820Q1023 662610138 マルプロ	1 液体 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は手指、皮膚および医療用具を消毒します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでく ださい。・刺激がありますの で、傷のある皮膚や粘膜には使 用しないでください。
2171701R4020 660411010 ミオコールスプレー 0.65% 7.2g トーアエイヨー株式 アステラス製薬株式	1 定量噴霧式エアゾール剤 スプレー缶本体の記載： ミオコールスプレー社 マーク721	・心臓の血管を拡げ血流量を増 やして、心臓に酸素や栄養を補 給するとともに、全身の血管の 抵抗を減らし心臓の負担を軽く します。・胸が重苦しく圧迫感 があったり、またはしめつけら れるような胸痛（狭心症）の発 作が起ったときにすぐに鎮 (しづ)めるために用いるもの です。	・飲酒中または飲酒後にこの薬 を使用した場合、血圧が下がる ことがあるので、注意してください。 ・頭痛などの副作用によ り、注意力、集中力、反射運動 能力などが低下することがある ので、このような場合には、自 動車の運転などの危険を伴う機 械の操作をしないでください。
1319809X2027 661310302 ミオピン 5mL	1 点眼剤（5mLプラス チック容器） 点眼剤の色：無色透明 キャップの色：緑 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	・目のピント調節機能を改善し ます。	
2649719N1076 662640731 ミカメタン - クリー ム 1%	1 軟膏剤 三笠製薬株式会社 三笠製薬株式会社	・痛みをやわらげたり、炎症を 抑えます。 キャップの色：水色 チューブの色：白色容器 の記載：MZ-MTC	
1145700J2245 661140233 ミカメタン坐剤 2.5 2.5mg	1 坐剤 三笠製薬株式会社	・炎症や痛みをやわらげます。 また、手術後の炎症やは腫れを やわらげます。（ただし、病気 の原因そのものを治すものでは ありません。） シートの記載：2.5mg (赤字)	・眠気、めまい、ふらつき感な どがあらわれることがあります ので、自動車の運転など危険を 伴う機械の操作などには充分注 意してください。
1145700J3314 661140263 ミカメタン坐剤 5.0 5.0mg	1 坐剤 三笠製薬株式会社	・炎症や痛みをやわらげます。 また、手術後の炎症やは腫れを やわらげます。（ただし、病気 の原因そのものを治すものでは ありません。） シートの記載：5.0mg (青字)	・眠気、めまい、ふらつき感な どがあらわれることがあります ので、自動車の運転など危険を 伴う機械の操作などには充分注 意してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319701Q1021 661310208 ミケラン点眼液 1 % 大塚製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	1 点眼剤 無色透明点眼瓶の色：無色キャップの色：ピンク色 識別コード：OG - MOS (容器底部)	緑内障の治療などに用いる目薬で、眼圧を下げる作用があります。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319701Q1021 661310208 ミケラン点眼液 1 % 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社	2 点眼剤 無色透明点眼瓶の色：無色キャップの色：ピンク色 識別コード：OG - MOS (容器底部)	緑内障の治療などに用いる目薬で、眼圧を下げる作用があります。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319701Q1021 661310208 ミケラン点眼液 1 %	3 点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：淡橙色	・緑内障の治療などに用いる目薬で、眼圧を下げる作用があります。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319701Q2028 661310209 ミケラン点眼液 2 %	2 点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：赤色	・緑内障の治療などに用いる目薬で、眼圧を下げる作用があります。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319701Q2028 661310209 ミケラン点眼液 2 % 大塚製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	1 点眼剤 無色透明点眼瓶の色：無色キャップの色：赤色 識別コード：OG - MOS (容器底部)	緑内障の治療などに用いる目薬で、眼圧を下げる作用があります。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319701Q2028 661310209 ミケラン点眼液 2 % 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社	3 点眼剤 無色透明点眼瓶の色：無色キャップの色：赤色 識別コード：OG - MOS (容器底部)	緑内障の治療などに用いる目薬で、眼圧を下げる作用があります。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319727Q1093 660422069 ミタトニン点眼液 0.3 % 東洋ファルマー株式会社 株式会社ニデック	1 点眼剤 無色透明 キャップの色：赤色	・目の感染症を引き起こしている細菌を殺菌します。	(保存方法を含む) ・コンタクトレンズをしている人は、主治医に相談してください。・遮光して室温に保存してください(長時間低温で保存しないでください)。・ふたを開けて1ヶ月経ったものは使用しないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

形 色 記号	効能効果	注意事項
名称 製造会社 販売会社		
 1319717Q1081 1 水性点眼剤 661310315 ミタヤク点眼液 1 液の色：無色～微黄色澄明キャップの色：白 0.0mg 5mL 東洋ファルマー株式 日医工株式会社	アレルギー性結膜炎や春季カタル（うわまぶたの裏側に小さな石垣のようなぶつぶつがたくさんでき、黒目のまわりの白目が腫れて充血することがある。また異物感や、目の痛み、涙がでる、まぶしいなどの症状が強い。春に多い。）の症状の発現を予防し、また発現した症状をやわらげます。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 1329700Q1066 1 水性点鼻液 661320025 ミタヤク点鼻液 1 無色～微黄色澄明 9.0mg 9.5mL 東洋ファルマー株式 日医工株式会社	アレルギー性鼻炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの症状を改善します。	
 1311705Q1030 1 点眼剤（5mLプラスチック容器） 661310136 ミドリンM 0.4% 点眼剤の色：無色澄明キャップの色：黄色 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	・目の中の筋肉に働いて瞳孔（ひとみ）を広げたり、ピント調節を休ませたりする作用があります。	・点眼後はまぶしく感じたり、近くの物がぼやけて見えます。このような症状がある場合は、「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。また、普段よりまぶしく感じますので、日光やその他の明るい光から目を守るために、昼間の外出時はサングラスをかけるなどしてください。
 1319810Q1037 1 点眼剤（5mL, 10mLプラスチック容器） 661310137 ミドリンP 点眼剤の色：無色～微黄色澄明キャップの色：白 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	・目の中の筋肉に働いて瞳孔（ひとみ）を広げたり、ピント調節を休ませたりする作用があります。	・点眼後はまぶしく感じたり、近くの物がぼやけて見えます。このような症状がある場合は、「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。また、普段よりまぶしく感じますので、日光やその他の明るい光から目を守るために、昼間の外出時はサングラスをかけるなどしてください。
 2649729S1030 1 パップ剤 662640690 ミルタックス 10cm x 14cm 淡黄白色 埼玉第一製薬株式会社 第一製薬株式会社	非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮ふから吸収され、貼った部位の関節や筋肉の炎症を抑え、痛みをやわらげます。	・生活上注意することは、まれに光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがありますので、はがした後しばらくの間は、貼っていた部位を日光などの強い光に当てないようにしてください。
 1319744Q1020 1 水性点眼剤 M I R O L O p h t h . S o l n . 0.5% 660443013 ミロル点眼液 0.5% (点眼液) 無色～微黄色澄明(容器)キャップ-緑色本体 - 茶色 杏林製薬株式会社 科研製薬株式会社	・この薬は眼圧を下降させる働きがあり、緑内障などに用います。	・お薬を衛生的にお使い頂くために、点眼する時は手を石鹼と流水で良く洗い、また、容器の先端が直接目やまつげに触れない様に注意してください。・コンタクトレンズを使用している人は、1度レンズをはずしてから点眼し、5～10分間位してから再び装着してください。
 1319718Q1043 1 点眼剤（5mLプラスチック容器） 661310210 ムコゾーム点眼液 0.5% 点眼剤の色：無色澄明キャップの色：極うすい黄 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	・この目薬は消炎酵素製剤で、結膜炎の治療に用います。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード	形	効能効果	注意事項
名称	色		
製造会社			
販売会社	記号		
2233700G2026 	1 液剤	タンを液状にして、排出させやすくする働きがあります。	・生活上注意することは気管支からの分泌物が増すことがありますので、つまらせないように注意してください。
660463034 ムコフィリン液 7.62% 2mL	1 無色		
サンノーバ株式会社 エーザイ株式会社			
2615704X1110 	1 液剤	・殺菌消毒剤です。	
662610112 無水エタノール	無色		
日本新薬株式会社	本体識別コード：包装識別コード：		
2615704X1099 	1 液	・手指・皮膚の消毒をします。・手術部位の皮膚の消毒をします。・医療用具の消毒をします。	
662610112 無水エタノール	無色透明		
2615704X1099 	2 液剤	・手指・皮膚の消毒に用います。・手術部位の消毒に用います。・医療用具の消毒に用います。	・火気厳禁（引火性および爆発性がありますので、火気には十分注意して下さい。）・蒸気を吸いしないようにして下さい。・傷のある皮膚や粘膜に使用すると、刺激感がありますので使用しないで下さい。・しっかり栓をして、光が当たらないように保存して下さい。
662610112 無水エタノール	無色透明		
2615704X1323 	2 液剤	・細菌、真菌、ウイルス等を殺す働きがあります。	・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。・広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。・火気には十分気をつけて下さい。
662610399 無水エタノール「ヒシヤマ」			
ニプロファーマ株式 大日本住友製薬株式			
2615704X1323 	1 液剤	・細菌、真菌、ウイルス等を殺す働きがあります。	・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。・広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意して下さい。・火気には十分気をつけて下さい。
662610399 無水エタノール「ヒシヤマ」			
ニプロファーマ株式 ニプロファーマ株式			
2615704X1234 	1 液体	・この薬は手指、皮膚および医療用具を消毒します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。・刺激がありますので、傷のある皮膚や粘膜には使用しないでください。
660421042 無水エタノール（丸 無色透明石）			
丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 形
診療コード 色
名称 製造会社
販売会社 記号

効能効果

注意事項

	2615704X1358	1 液	・殺菌消毒剤です。
	662610402	無水エタノール「ヨシダ」	
	吉田製薬株式会社		
	1329700Q1074	1 点眼液	アレルギー性結膜炎、春季力タルの発症を予防し、また症状が現わっても軽度に抑えます。この薬を定期的に点眼することによって症状の発現が少なく軽くなっています。
	661320026	メインター点鼻液 無色～微黄色澄明 190mg 9.5ml	
	株式会社模範薬品研 メルク・ホエイ株式	L	
	1329700Q1074	2 鼻用定量噴霧式吸入剤	・アレルギー性鼻炎の発症を予防し、また症状が現れても軽度に抑えます。・このくすりを定期的に点鼻することによって症状の発現が少なく軽くなっています。
	661320026	メインター点鼻液 キャップは白色 190mg 9.5ml	L
	株式会社模範薬品研 メルク・ホエイ株式		
	1147700J2096	1 坐剤	熱を下げたり、痛みや炎症を抑えます。(ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。)
	661140199	メクロフェン坐剤 2 白色～淡黄色 5.25mg	・ねむけやめまい、目のかすみが起ることがありますので、車の運転など危険をともなう機械の作業に十分注意してください。
	日医工株式会社	メクロフェン 25(表)	
	日医工株式会社		
	1147700J3114	1 坐剤	熱を下げたり、痛みや炎症を抑えます。(ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。)
	661140208	メクロフェン坐剤 5 白色～淡黄色 0.50mg	・ねむけやめまい、目のかすみが起ることがありますので、車の運転など危険をともなう機械の作業に十分注意してください。
	日医工株式会社	メクロフェン 50(表)	
	日医工株式会社		
	2646726N1023	1 クリーム	・皮膚炎やかぶれなどの皮膚の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。
	662640593	メサデルムクリーム 白色～微黄色 0.1%	
	岡山大鵬薬品株式会 大鵬薬品工業株式会	チューブの記載：メサデルムクリーム TC260	
	2646726M1028	1 軟膏	・皮膚炎やかぶれなどの皮膚の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。
	662640594	メサデルム軟膏 白色～微黄色 0.1%	
	岡山大鵬薬品株式会 大鵬薬品工業株式会	チューブの記載：メサデルム軟膏 TC261	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646726Q1020 660406113 メサデルムローション 0.1%	1 ローション	・皮膚炎やかぶれなどの皮膚の炎症やアレルギーによる症状を抑えます。	
岡山大鵬薬品株式会社 大鵬薬品工業株式会社	容器の記載：メサデルムローション T C 2 6 2		
1144700J2140 661140086 メチロン坐薬 10 0 mg	1 坐剤	発熱を下げます。	
埼玉第一製薬株式会社 第一製薬株式会社	D 1 1 8 、メチロン坐薬		
7131700X1022 667130005 滅菌精製水	2 液 無色澄明	・溶解剤として製剤の調整、医療用具の洗浄に用いる。	そのまま飲用に使うと下痢を起こすことがあります。
7131700X1022 667130005 滅菌精製水	1 液剤 無色澄明	・この薬はいろいろな薬を溶かし無菌の薬を作るために使用します。・この薬は医療器具を洗うために使用します。	
2171701S7020 660453050 メディトランステープ 27mg 14cm	1 テープ剤 (3 2 mm × 4 5 mm) テープ剤の色：白色布状シート	・この薬は、狭心症発作（主に心臓の部分に起る胸痛）を予防または和らげます。ただし、起こってしまった発作そのものをしずめる薬ではありません。・全身の血管をひろげて血管の抵抗を減らし、心臓の負担を軽くします。また、心臓の血管をひろげて心臓に酸素や栄養を補給する働きにより、症状を改善します。	・使用をはじめた初期には頭痛などの症状が現れることがあります。このような場合には車の運転や高所での作業、危険を伴う機械の操作などは行わないでください。・アルコール性飲料の摂取によって薬自体の作用が強まることがあるので、注意してください。・外出または旅行などする場合は、必要な分量を忘れずに携行してください。
2646708N1190 662640386 メドレキシムクリーム 0.05%	1 クリーム	皮ふ部分の炎症をおさえる働きがあり、皮ふ症状の治療に用います。	この薬を化粧下やひげそり後に使わないでください。おむつにあたる部分に使うときは、ビニール製のパンツなどピッタリしたものの使用はさけてください。
大洋薬品工業株式会社 大洋薬品工業株式会社	チューブのラベル記載： t 9 0 9 M R - C		
1149700J1051 661140173 メナミン坐剤 50 50 mg	1 坐剤	・痛みや炎症を抑えたり、熱を下げたりするための坐薬です。	・リウマチなどでこの薬を長期に使っている人は、主治医が効果や副作用をチェックしますので、必ず定期的に受診して下さい。・まれにめまいや眠気があらわれることがありますので、車の運転や、危険を伴う機械の操作などには気をつけて下さい。・この薬を使っている間に他の薬（薬局で買った薬も）を飲むときは、あらかじめ主治医または薬剤師にご相談下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1149700J2058 661140174 	1 坐剤 メナミン坐剤 7.5 7.5 mg サノフィ・アベンテ MEN 75-ZA 中外製薬株式会社	・痛みや炎症を抑えたり、熱を下げるための坐薬です。	・リウマチなどでこの薬を長期に使っている人は、主治医が効果や副作用をチェックしますので、必ず定期的に受診して下さい。・まれにめまいや眠気があらわれることがありますので、車の運転や、危険を伴う機械の操作などには気をつけて下さい。・この薬を使っている間に他の薬（薬局で買った薬も）を飲むときは、あらかじめ主治医または薬剤師にご相談下さい。
2649729M1023 662640595 	1 軟膏剤 メナミン軟膏 3% 無色透明（芳香がある） 東興薬品工業株式会社 C-26C-O 中外製薬株式会社	・痛みや炎症を抑える塗り薬です。	・このくすりを使っている間は、天候にかかわらず、戸外活動を避けるとともに、日常の外出時もくすりを塗った部分を衣服、サポーターなどでおおい、紫外線に当てないでください。なお、塗った後も当分の間、同様の注意をしてください。
2259704G3043 620000403 	1 吸入剤（エアゾール剤） メブチンエアー 1.0 μg 0.014 3% 5mL 大塚製薬株式会社 識別コード：OG-N A 大塚製薬株式会社 底部）容器：白色と青色	気管支をひろげて呼吸を楽にする外用薬です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。
2259704G2039 620000404 	1 吸入剤（エアゾール剤） メブチンキッドエー 5 μg 0.0 14.3% 2.5mL 大塚製薬株式会社 識別コード：OG-N K 大塚製薬株式会社 （缶底部）容器：青色	気管支をひろげて呼吸を楽にする吸入剤です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。
2259704G1024 662220043 	1 吸入液 メブチン吸入液 0.01% 大塚製薬株式会社 識別コード：なし 大塚製薬株式会社	気管支をひろげて呼吸を楽にする吸入液です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。
2259704G5020 660463035 	1 吸入液 メブチン吸入液ユニット 0.3mL 0.01% 大塚製薬株式会社 識別コード：なし容器： 大塚製薬株式会社 青色プラスチック容器	気管支をひろげて呼吸を楽にする吸入液です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。
2259704G6026 660463036 	1 吸入液 メブチン吸入液ユニット 0.5mL 0.01% 大塚製薬株式会社 識別コード：なし容器： 大塚製薬株式会社 無色プラスチック容器	気管支をひろげて呼吸を楽にする吸入液です。	主治医からの生活上の指導に従ってください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2259704G7022 620002626 メプチンクリックヘ ラー 10 µg 2m g 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社	1 吸入剤(ドライパウダー 式吸入剤) 容器 - 白色と青色のラ スチック なし	・気管支をひろげて呼吸を樂に する吸入剤です。	・主治医からの生活上の指導に 従ってください。
1329705Q1166 660433077 メラポン点鼻液 6.0 4.8 mg 8m L 大洋薬品工業株式会 大洋薬品工業株式会	1 外用液剤 無色 ~ 微黄色澄明	アレルギー性鼻炎のくしゃみ、 鼻みず、鼻づまりなどをやわら げます。	眠気が現れることがあるので、 車の運転や危険を伴う機械の操 作などは行わないでください。
2659708Q1046 620003052 メリーダム液 1% 東和薬品株式会社 東和薬品株式会社	1 外用液剤 無色澄明	水虫やインキンタムシ、タムシ などの皮フ感染症を治します。	・この薬はアルコールが含まれ ていますので、室温で保存し、 火に近づけないでください。・ 治療は毎日継続して行うことが 大切です。・清潔にすることが 肝心です。靴、靴下、衣服など も清潔にしてください。
2659708N1058 620003053 メリーダムクリーム 白色 1% 東和薬品株式会社 東和薬品株式会社	1 クリーム状軟膏剤 白色	水虫やインキンタムシ、タムシ などの皮フ感染症を治します。	・治療は毎日継続して行うこと が大切です。・清潔にすること が肝心です。靴、靴下、衣服など も清潔にしてください。
2659708Q1038 662650097 メンタックス液 1% 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 外用液剤 無色澄明 容器の記載 : KC - 1 2 1	・この薬は、水虫やインキンタ ムシ、タムシなど、皮膚に感染 するカビ(真菌)によっておこ る皮膚の病気を治します。	・治療は毎日行なうことが大 切です。・清潔にすることが第 一です。靴、靴下、衣服なども清 潔にしてください。・この薬は アルコールを含んでいますので、 火気に近づけないでください。
2659708N1031 662650098 メンタックスクリー ム 1% 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 クリーム剤 白色 容器の記載 : KC - 1 2 2	・この薬は、水虫やインキンタ ムシ、タムシなど、皮膚に感染 するカビ(真菌)によっておこ る皮膚の病気を治します。	・治療は毎日行なうことが大 切です。・清潔にすることが第 一です。靴、靴下、衣服なども清 潔にしてください。
2659708R1033 620002328 メンタックススプレー 1% 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社	1 スプレー剤(外用液剤) 無色澄明 容器の記載 : KC - 1 2 6	・この薬は、水虫やインキンタ ムシ、タムシなど、皮膚に感染 するカビ(真菌)によっておこ る皮膚の病気を治します。	・治療は毎日行なうことが大 切です。・清潔にすることが第 一です。靴、靴下、衣服なども清 潔にしてください。・この薬は アルコールを含んでいますので、 火気に近づけないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649729S1049 662640691 モーラス 10cm × 14cm 久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	1 貼付剤 (10 × 14 cm) 白色～淡黃白色 モーラスの記載：HP310P 久光製薬株式会社	貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中及び使用後も当分の間は、貼ったところを色物の衣服やサポーター等でおおい、紫外線にあてないようにしてください。・戸外へ出るときは天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し、貼ったところを紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあります。・海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。
2649729S2029 660407062 モーラステープ 7cm × 10cm 久光製薬株式会社 祐徳薬品工業株式会社	2 貼付剤 (7 × 10 cm) 淡褐色～褐色半透明 モーラステープの記載：HP311T 久光製薬株式会社	貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。特に慢性化した疾患の鎮痛・消炎に効果があります。	・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中及び使用後も当分の間は、貼ったところを色物の衣服やサポーター等でおおい、紫外線にあてないようにしてください。・戸外へ出るときは天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し、貼ったところを紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあります。・海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。
2649729S2029 660407062 モーラステープ 7cm × 10cm 久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	1 貼付剤 (7 × 10 cm) 淡褐色～褐色半透明 モーラステープの記載：HP311T 久光製薬株式会社	貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。特に慢性化した疾患の鎮痛・消炎に効果があります。	・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中及び使用後も当分の間は、貼ったところを色物の衣服やサポーター等でおおい、紫外線にあてないようにしてください。・戸外へ出るときは天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し、貼ったところを紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあります。・海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。
2649729S3025 660463037 モーラステープ L 10cm × 14cm 久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	2 貼付剤 (10 × 14 cm) 淡褐色～褐色半透明 モーラステープの記載：HP312T 久光製薬株式会社	貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。特に慢性化した疾患の鎮痛・消炎に効果があります。	・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中及び使用後も当分の間は、貼ったところを色物の衣服やサポーター等でおおい、紫外線にあてないようにしてください。・戸外へ出るときは天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し、貼ったところを紫外線にあてないでください。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあります。・海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2649729S3025 660463037 モーラステープ L 10 cm × 14 cm 久光製薬株式会社 祐徳薬品工業株式会社	1 貼付剤 (10 × 14 cm) 淡褐色～褐色半透明 ・薬袋の記載：HP31 2 T	貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。特に慢性化した疾患の鎮痛・消炎に効果があります。	・光線過敏症（光によるかぶれ）をおこすことがあるので、使用中及び使用後も当分の間は、貼ったところを色々の衣服やサポーター等でおおい、紫外線にあてないようにしてください。・戸外へ出るときは天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し、貼ったところを紫外線にあてないください。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあります。・海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。
2654700X1021 662650050 モクタール 吉田製薬株式会社	1 軟膏 モクタール 蒂黒褐色	・皮膚の炎症・かゆみを抑える作用や殺菌作用があります	
2649865M2024 660406119 モビラートゲル マルホ株式会社 マルホ株式会社	1 ゲル モビラートゲル 透明なうすい黄色 チューブの記載：モビラートゲル	・使用部位の炎症を抑え、痛みをやわらげる作用があります。慢性関節リウマチ、腰痛症、変形性関節症、けん腱・けんしょうえん腱鞘炎などによる痛み、腫れ等の症状を軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。
2649865M1028 662640390 モビラート軟膏 マルホ株式会社 マルホ株式会社	1 軟膏 モビラート軟膏 チューブの記載：モビラート軟膏	・使用部位の炎症を抑え、痛みをやわらげる作用があります。慢性関節リウマチ、腰痛症、変形性関節症、けん腱・けんしょうえん腱鞘炎などによる痛み、腫れ等の症状を軽くします。	・小児の手の届かないところに保管してください。・温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。
2655708Q1098 660407139 モルダイン液 1 % 大洋薬品工業株式会社	1 外用液剤 モルダイン液 1 % チューブのラベル記載： t MO - L	カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によっておこる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。皮ふのただれがひどい部分にはぬらないでください。本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。本剤中のアルコール成分により合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので注意してください。（フローリング）
2655708N1130 660407140 モルダインクリーム 1 % 大洋薬品工業株式会社	1 クリーム モルダインクリーム 1 % チューブのラベル記載： t MO - C	カビの一種である白癬菌、カンジダ、癪風菌によっておこる皮膚病、いわゆる水虫、たむし等に効く薬です。	目に入らないように注意してください。入ってしまった場合はすぐに洗い、異常を感じた時は眼科医の診察を受けてください。皮ふのただれがひどい部分にはぬらないでください。本剤の付いた手で目や粘膜に触れないでください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード	形	効能効果	注意事項
名称	色		
製造会社			
販売会社	記号		
2649732S3035 660454009 ヤクバン20 m×10cm	2 7c 肌色	・この薬は炎症を抑え、腫れや痛みをやわらげます。	・はがれやすくなることがあるので、汗をかいたり、皮ふがぬれている時は、よくふき取つてから使用してください。
株式会社トクホン 科研製薬株式会社	識別コード：KC-324（アルミ袋）		
2649732S3035 660454009 ヤクバン20 m×10cm	1 7c 淡黄色	・貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	
株式会社トクホン 三笠製薬株式会社	薬袋表面の記載：MZ-YKB20		
2649732S2039 660454010 ヤクバン40 c m × 1 4 c m	1 淡黄色	・貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	
株式会社トクホン 三笠製薬株式会社	薬袋表面の記載：MZ-YKB40		
2649732S2039 660454010 ヤクバン40 c m × 1 4 c m	2 白色	・この薬は炎症を抑え、腫れや痛みをやわらげます。	・はがれやすくなることがあるので、汗をかいたり、皮ふがぬれている時は、よくふき取つてから使用してください。
株式会社トクホン 科研製薬株式会社	識別コード：KC-323（アルミ袋）		
2616706X1052 662610113 薬用石ケン	1 粒状 白色～淡黄白色	・腸などの検査のため、または腸などの手術前・後の便の排泄をします。	
2646700M1090 662640788 ユートロン軟膏 0.1%	1 軟膏剤 白色～帯黄白色	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	・この薬は、光のあたらない場所に保管してください。
辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社			・この薬は、光のあたらない場所に保管してください。
2646700N1096 662640794 ユートロンユニバー サルクリーム 0.1%	1 クリーム状の軟膏剤 白色～帯黄白色	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
辰巳化学株式会社 辰巳化学株式会社			・この薬は、光のあたらない場所に保管してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2699801V1033 662690010 ユーパスタコーワ	1 軟膏剤 褐色	・創傷治癒作用、殺菌作用により、褥瘡（床ずれ）や、皮膚潰瘍の治癒を促進させます。	・生活上注意することは 衣類、装身具などに付着したらすぐに洗い落としてください。
興和株式会社 興和株式会社	650		
2646720N1050 662640884 ユーメトンクリーム	1 クリーム 白色 0.3%	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
辰巳化学株式会社			
2646720M1047 662640885 ユーメトン軟膏	1 軟膏剤 白色～帯黄白色 0.3%	・皮膚の炎症を抑え、発赤、はれ、かゆみなどの症状をやわらげます。	
辰巳化学株式会社			
1149702J2022 661140187 ユニプロン坐剤 10	1 坐剤 (9.0 mm × 2 6.0 mm) 白色～淡黃白色 0.100mg	・この薬は熱を下げる作用があります。しかし、この薬は病気の原因そのものを治すものではありません。	
昭和薬品化工株式会 科研製薬株式会社	識別コード： S D U P · S U P · 1 0 0		
1149702J2022 661140187 ユニプロン坐剤 10	2 坐剤 白色～淡黃白色 0.100mg	・熱を下げます。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。	・体温が下がり過ぎたり、虚脱、四肢冷感があらわれることがあるので、投与後の状態に気をつけて下さい。・光と湿気を避けて、風通しがよい暗い所に保存して下さい。
昭和薬品化工株式会 昭和薬品化工株式会	シート裏面の記載： S D U P · S U P · 1 0 0		
1149702J2022 661140187 ユニプロン坐剤 10	3 坐剤 白色～淡黃白色 0.100mg	・熱を下げます。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。	・体温が下がり過ぎたり、虚脱、四肢冷感があらわれることがあるので、投与後の状態に気をつけて下さい。・光と湿気を避けて、風通しがよい暗い所に保存して下さい。
昭和薬品化工株式会 科研製薬株式会社	シート裏面の記載： S D U P · S U P · 1 0 0		
1149702J1026 661140186 ユニプロン坐剤 50	2 坐剤 (9.0 mm × 2 3.0 mm) 白色～淡黃白色 5.0mg	・この薬は熱を下げる作用があります。しかし、この薬は病気の原因そのものを治すものではありません。	
昭和薬品化工株式会 科研製薬株式会社	識別コード： S D U P · S U P · 5 0		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1149702J1026 661140186 ユニプロン坐剤 50 昭和薬品化工株式会社 科研製薬株式会社	3 坐剤 白色～帯黄白色 50mg S DUP・SUP・50	・熱を下げる作用があります。 ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。	・この薬はアルミ包装のまま冷蔵庫などの光の当たらない涼しい場所に保管してください。
1149702J1026 661140186 ユニプロン坐剤 50 昭和薬品化工株式会社 昭和薬品化工株式会社	1 坐剤 白色～帯黄白色 50mg S DUP・SUP・50	・熱を下げる作用があります。 ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。	・この薬はアルミ包装のまま冷蔵庫などの光の当たらない涼しい場所に保管してください。
2649805M1026 662640396 ユベラ軟膏 サンノーバ株式会社 エーザイ株式会社	1 軟膏 白色～淡黄色	皮膚の血液の流れを増やし、皮膚を保護することにより、しもやけやカサカサした皮膚を治療します。	・生活上注意することは特にありません。
2699704M1033 620003055 ヨードコート軟膏 株式会社メドレック 日本新薬株式会社	1 軟こう剤 褐色～暗赤褐色 ヨードコート軟膏 0.9%	・床ずれや皮膚のただれなどの傷を殺菌消毒し、ただれたところを改善する薬です。	
2612703X1157 662610077 ヨードチンキ 東豊薬品株式会社 メリク・ホエイ株式	1 液 暗赤褐色	・皮膚の消毒をします。 ・皮膚の傷・潰瘍の殺菌・消毒をします。 ・歯肉、口の粘膜の消毒をします。	
2612703X1157 662610077 ヨードチンキ 本体識別コード：包装識別コード：	2 液剤 暗赤褐色	・皮膚・傷口の消毒。歯肉炎・口腔粘膜の消毒。	
2612703X1246 660408128 ヨードチンキ・YI 山田製薬株式会社 岩城製薬株式会社	1 液剤 暗赤褐色	・皮膚の殺菌・消毒に用います。 ・歯肉や口腔粘膜の消毒に用います。	・栓をして、光が当たらないようにして保管して下さい。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2612703X1220 660421026 	2 粉末 ヨードチンキ(丸石) 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は腸の調子を整える働きがあります。	
2612703X1220 660421026 	1 液体 ヨードチンキ(丸石) 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬は皮膚、傷口、ただれているところを消毒します。 ・この薬は歯茎や口の中を消毒します。	・火をつけると燃えるので火のそばで使ったり保存しないでください。 ・衣服などについてしまった場合は、なかなか落ちませんのでつかないように注意してください。 ついでしまった場合はハイポアルコールなどで拭いてください。
2612707X1066 662610348 	2 結晶 ヨードホルム「ホエイ」 メルク・ホエイ株式 メルク・ホエイ株式	・皮膚のきず(創傷)・潰瘍の殺菌・消毒に用います。	
2612707X1066 662610348 	1 結晶 ヨードホルム「ホエイ」 メルク・ホエイ株式	・皮膚のきず(創傷)・潰瘍の殺菌・消毒に用います。	
2649719S1169 660412049 	3 貼付剤(10cm x 14cm) ラクティオンパップ 10cm x 14cm ティカ製薬株式会社 三笠製薬株式会社	・貼った部位の関節や筋肉の痛みをやわらげ、炎症を抑えます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	・トウガラシエキスを含む温感貼付剤です。入浴の30分以上前にはがし、また、入浴後はしばらくたってから貼ってください。
2649719S1169 660412049 	2 貼付剤(10 x 14 cm) ラクティオンパップ 10cm x 14cm ティカ製薬株式会社 ティカ製薬株式会社	・肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みを和らげます。外傷後のはれ、痛みを和らげます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	トウガラシエキスを含む温感貼付剤です。入浴の30分以上前にはがし、また、入浴後はしばらくたってから貼ってください。
2649719S1169 660412049 	1 貼付剤(10 x 14 cm) ラクティオンパップ 10cm x 14cm ティカ製薬株式会社 三笠製薬株式会社	・肩、膝、肘その他の関節や、腱、筋肉のはれ、痛みを和らげます。外傷後のはれ、痛みを和らげます。非ステロイド系の鎮痛消炎剤で、薬物が皮膚から吸収されます。	トウガラシエキスを含む温感貼付剤です。入浴の30分以上前にはがし、また、入浴後はしばらくたってから貼ってください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1313700Q3026 661310279 ラクリミン点眼液 0.05% 5mL 参天製薬株式会社 参天製薬株式会社	1 点眼剤 (5mLプラスチック容器) 点眼剤の色：無色透明 キャップの色：極うすい 青緑	・過剰な涙の分泌を抑えます。	
2659710Q1027 660411012 ラミシール液 1% すみきった無色～微黄色 日本チバガイギー株 ノバルティス ファ	1 液剤 (外用液) ラミシール液 1% すみきった無色～微黄色	・水虫やタムシ、カンジダ症などのカビが原因で起こる皮膚の病気をなおします。	・使用するまでは、包装を開けずに高温をさせて保管してください。・この薬はアルコールを含んでいます。火気に近づけないでください。
2659710N1020 662650105 ラミシールクリーム 白色 1% 東興薬品工業株式会社 チューブの記載： ノバルティス ファ	1 軟こう剤 (クリーム) ラミシールクリーム 白色 1%	・水虫やタムシ、カンジダ症などのカビが原因で起こる病気をなおします。	
2659710R1022 620000406 ラミシールスプレー すみきった無色～微黄色 1% 日本チバガイギー株 ノバルティス ファ	1 スプレー剤 (外用液) ラミシールスプレー すみきった無色～微黄色 1%	・水虫やタムシ、カンジダ症などのカビが原因で起こる皮膚の病気をなおします。	・直射日光の当たらない涼しいところにキャップをしめて保管してください。・この薬はアルコールを含んでいます。火気に近づけないでください。
2659710N1101 620003056 ラミテクトクリーム 白色 1% 沢井製薬株式会社 沢井製薬株式会社	1 クリーム剤 ラミテクトクリーム 白色 1%	・真菌 (カビ) が原因で起こる病気を治します。	
1319736Q1025 660407061 リザベン点眼液 5mg 5mL キッセイ薬品工業株 キッセイ薬品工業株	1 点眼剤 リザベン点眼液 5mg 5mL リザベン点眼液	アレルギーによる結膜炎のくすりです。その症状である目のかゆみや目やにが出る、充血する、まぶたがはれる、ごろごろするなどの症状をやわらげます。	・生活上注意することは
1319702Q5021 660432021 リズモンTG点眼液 0.25% わかもと製薬株式会社 キッセイ薬品工業株	1 点眼剤 リズモンTG点眼液 0.25% リズモンTG点眼液 0.25%	目の中の圧力 (眼圧) を下げて、緑内障による視野の欠けや視力の低下を抑えます。	・生活上注意することは

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1319702Q6028 660432022 リズモンT G点眼液 わかもと製薬株式会社 キッセイ薬品工業株	1 点眼剤 無色～微黄色透明キャップの色：半透明の濃オレンジ リズモンT G点眼液 0.5%	目の中の圧力（眼圧）を下げて、緑内障による視野の欠けや視力の低下を抑えます。	・生活上注意することは
1319718Q1051 661310226 リゾティア 0.5% 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	1 点眼液 点眼瓶の色：無色キャップの色：白色キャップ外面：LT	・慢性結膜炎の炎症を抑えます。	コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
2559813J1092 660406121 リドベノン坐剤 小林化工株式会社 小林化工株式会社	1 坐剤（長さ約28.8m） 白色～帯黄白色 コンテナー記載：KN704	内痔核（いぼぢ）の症状（出血、痛み、はれ、かゆみ）をやわらげます。	シートを取り除いたら直ちに使用してください。おしゃりはいつも清潔にしましょう。特に入浴は肛門の血液循环をよくしますので、効果的です。 高温で変形する所以がありますので、15以下（なるべく冷蔵庫）で保管してください。 子どもの手の届かないところに置いてください。
2559813J1092 660406121 リドベノン坐剤 小林化工株式会社 ナガセ医薬品株式会社	2 坐剤（長さ約28.8m） 白色～帯黄白色 コンテナー記載：KN704	内痔核（いぼぢ）の症状（出血、痛み、はれ、かゆみ）をやわらげます。	シートを取り除いたら直ちに使用してください。おしゃりはいつも清潔にしましょう。特に入浴は肛門の血液循环をよくしますので、効果的です。 高温で変形する所以がありますので、15以下（なるべく冷蔵庫）で保管してください。 子どもの手の届かないところに置いてください。
2646720N1026 662640408 リドメックスコーワ 白 クリーム 0.3% 興和株式会社 興和株式会社	1 クリーム剤 726	この薬は炎症を抑える働きがあり発赤、はれ、かゆみなどの症状を和らげます。湿疹、皮膚炎、ストロフルス、虫さされ、乾癬、掌蹠膿疱症などに効果があります。	・生活上注意することは
2646720M1020 662640409 リドメックスコーワ 白（半透明） 軟膏 0.3% 興和株式会社 興和株式会社	1 軟膏剤 727	この薬は炎症を抑える働きがあり発赤、はれ、かゆみなどの症状を和らげます。湿疹、皮膚炎、ストロフルス、虫さされ、乾癬、掌蹠膿疱症などに効果があります。	・生活上注意することは
2646720Q1022 662640626 リドメックスコーワ 白 ローション 0.3% 興和株式会社 興和株式会社	1 ローション剤 728	この薬は炎症を抑える働きがあり発赤、はれ、かゆみなどの症状を和らげます。湿疹、皮膚炎、ストロフルス、虫さされ、乾癬、掌蹠膿疱症などに効果があります。	・生活上注意することは

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
1329702A1032 620000407 リノコートカプセル 外用50 µg	1 外用カプセル剤(噴霧剤)(長径:約18mm, 短径:約6mm) 青色と白色	アレルギー性鼻炎(花粉症など)にみられる炎症を抑え、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等の症状を改善します。	
帝人ファーマ株式会 帝人ファーマ株式会	リノコート 50 µg 帝 人ファーマ		
1329702R7026 620000408 リノコートパウダー スプレー鼻用 1. 50 mg 0.908	1 粉剤(噴霧剤) 粉の色:白色ノズル:白 色、本体:青色、ポン ブ:緑色	アレルギー性鼻炎(花粉症など)にみられる炎症を抑え、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等の症状を改善します。	
帝人ファーマ株式会 帝人ファーマ株式会			
1319722Q1104 660453053 リビゲット点眼液 0.3%	1 点眼剤 微黄色~淡黄色透明	・結膜炎やものもらい、眼瞼炎など細菌感染症の治療に用います。	コンタクトレンズを使用している人は主治医に相談してください。
長生堂製薬株式会社 メルク・ホエイ株式			
2171700S2075 660453054 リファタックテープ S 40 mg	1 貼付剤(5.8cm x 8.7cm) テープの色:白色	・心臓への酸素の補給を助け、心臓の負担を軽くします。 ・狭心症発作(胸の圧迫感、痛みなどの症状)の予防に使われますが、いま起こっている発作の症状をやわらげるものではありません。	・この薬を使用するとめまいや立ちくらみが起こることがありますので注意してください。 ・この薬を使用すると頭痛などが起こることがありますので、このような場合には、車の運転や高い所での作業、危険をともなう機械の操作を避けるなど十分注意してください。 ・この薬を使用しているときに、アルコール類を摂取すると血圧低下が起こりやすいので注意して下さい。
メディサ新薬株式会 持田製薬株式会社	アルミ袋の記載:リファ タックテープS MED -039		
2649729S1057 660407142 リフェロン 10 cm x 14 cm	1 貼付剤(10 x 14 cm) (テープ面)微黄色半透 明(台紙)白色	・筋肉や関節の炎症や痛みをやわらげます。	・戸外に出るときは天候にかかわらず、濃い色の長袖の衣服、サポーター等で貼った部位を紫外線に当たらないようにしてください。 ・くすりをはがした後でも当分の間(4週間程度)紫外線に当てないでください。
沢井製薬株式会社 沢井製薬株式会社	袋記載: SW - 465		
3959700M1022 663950010 リフラップ軟膏 5%	1 軟膏 白色~帯黄白色	床ずれや火傷などによる皮膚のじゅくじゅくした状態を治す働きがあります。	・生活上注意することは薬を塗った部位やその周りを清潔に保つことを心がけてください。
日立化成工業株式会 エーザイ株式会社			
1319746Q1029 660443015 リボスチン点眼液 0.025%	2 点眼剤(5mLプラスチック容器) 白色(懸濁液)キャップの色:白	・ヒスタミンという生体内物質の動きを抑え、目のかゆみや充血といったアレルギー性結膜炎の症状をやわらげます。	
ヤンセンファーマ株 参天製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
 1319746Q1029 660443015 リボスチン点眼液 0.025%	1 点眼剤 (5 mL プラスチック容器) 点眼剤の色 : 白色 (懸濁液) キャップの色 : 白色	・アレルギーによって出てくる物質の働きを抑え、アレルギー性結膜炎の症状を改善します。	・ソフトコンタクトレンズ (ディスポーザブルタイプは除く) をつけたまま点眼しないでください。
 1329708Q1020 660432012 リボスチン点鼻液 0.025% 15mL	1 点鼻液 白色の懸濁液	・この薬はアレルギーを起こす物質が鼻腔内で產生されるのを抑えます。さらに、アレルギーを起こす物質にも直接働き、この作用を抑えることにより、くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどを消失またはやわらげます。 ・アレルギー性鼻炎の治療に用います。	・眠気を催すことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作は避けて下さい。
 1311706M1024 661310144 リュウアト 1% 眼軟膏	1 眼軟膏 (3.5 g チューブ) 点眼剤の色 : 白色 ~ 微黄色 キャップの色 : 赤	・目の中の筋肉に働いて瞳孔 (ひとみ) を広げたり、ピント調節を休ませたりする作用があります。	・使用後はまぶしく感じたり、近くの物がぼやけて見えます。このような症状がある場合は、「運転」、「機械の使用」、「よく見えないときに行うと危険な作業」は行わないでください。また、普段よりまぶしく感じますので、日光やその他の明るい光から目を守るために、昼間の外出時はサングラスをかけるなどしてください。
 1317706Q1070 660406166 硫酸ゲンタマイシン 点眼液 T 3 mg	1 点眼液 (5 mL プラスティック容器) 点眼剤の色 : 無色 ~ 微黄色 透明キャップの色 : 淡緑白色	・目の炎症を引き起こしている細菌を殺菌します。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
 2634712X1072 662630053 硫酸ポリミキシン B 末ファイザー 50 万単位	3 粉末 色 : 白色 ~ 黄褐色 バイアルの色 : 無色透明 キャップの色 : 白色	・病気 (感染症) の原因となる色々な細菌に対して殺菌作用を示します。体の色々な部分に起こる感染症に効果があります。真菌やウィルス性の病気には効果がありません。	特にありません。
 2634712X2079 662630058 硫酸ポリミキシン B 末ファイザー 30 万単位	1 粉末 白色 ~ 黄褐色 バイアルの色 : 無色透明 キャップの色 : 青色	・病気 (感染症) の原因となる色々な細菌に対して殺菌作用を示します。体の色々な部分に起こる感染症に効果があります。真菌やウィルス性の病気には効果がありません。	特にありません。
 2634712X2079 662630058 硫酸ポリミキシン B 末ファイザー 30 万単位	3 粉末 色 : 白色 ~ 黄褐色 バイアルの色 : 無色透明 キャップの色 : 青色	・病気 (感染症) の原因となる色々な細菌に対して殺菌作用を示します。体の色々な部分に起こる感染症に効果があります。真菌やウィルス性の病気には効果がありません。	特にありません。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	2634712X1072 1 粉末 662630053 硫酸ポリミキシンB 末ファイザー 50 万単位 ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	・病気（感染症）の原因となる 色々な細菌に対して殺菌作用を 示します。体の色々な部分に 起こる感染症に効果があります。 真菌やウィルス性の病気には効 果がありません。	特にありません。
	2634712X1072 2 外用粉末 662630053 硫酸ポリミキシンB 末ファイザー 50 万単位 ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	・病気（感染症）の原因となる 色々な細菌に対して殺菌作用を 示します。体の色々な部分に起 こる感染症に効果があります。 真菌やウィルス性の病気には効 果がありません。	特にありません。
	2634712X2079 2 外用粉末 662630058 硫酸ポリミキシンB 末ファイザー 30 0万単位 ファイザー株式会社 ファイザー株式会社	・病気（感染症）の原因となる 色々な細菌に対して殺菌作用を 示します。体の色々な部分に起 こる感染症に効果があります。 真菌やウィルス性の病気には効 果がありません。	特にありません。
	7121718X1107 1 油液 662350027 流動パラフィン 無色透明	・軟膏の基剤です。	
	7121718X1042 1 油液 660431069 流動パラフィン . O 澄明 I 岩城製薬株式会社	・軟膏基剤として用います。	
	7121718X1140 1 油 660421104 流動パラフィン（丸 無色 石） 丸石製薬株式会社 丸石製薬株式会社	・この薬はいろいろな薬を軟膏 の形にするために使用します。	・火をつけると燃えるので火の そばで使ったり保存しないでく ださい。
	6250702G1028 1 吸入用散剤（円形ホイル パック） 660443018 リレンザ 5mg ディスクの色：銀色 グラクソ・スミスク Relenza (zana mivir) 5mg, R グラクソ・スミスク otadisk, G1a	このくすりはA型又はB型イン フルエンザウイルスの増殖を抑 えて、症状をはやく改善する働 きがあります。	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646703N1073 662640414 リンデロン - DP クリーム リーム 0 . 0 6 4 % 塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	1 クリーム 白色 商品名等：チューブに印刷	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	室温で保管してください。小児の手の届かない所に保管してください。
2646703Q1029 662640627 リンデロン - DP ソル ル 0 . 0 6 4 % 塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	1 ソル 無色 商品名等：容器のラベルに印刷	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	火気に近づけないでください。直接光のあたらない所に保管してください。小児の手の届かない所に保管してください。
2646703M1094 662640415 リンデロン - DP 軟膏 膏 0 . 0 6 4 % 塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	1 軟膏 白色～微黄色 商品名等：チューブに印刷	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	温度の高くなる所に保管しないでください。小児の手の届かない所に保管してください。
2647709N1060 662640416 リンデロン - VG クリーム リーム 0 . 1 2 % 塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	1 クリーム 白色 商品名等：チューブに印刷	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	室温で保管してください。小児の手の届かない所に保管してください。
2647709M1102 662640418 リンデロン - VG 軟膏 膏 0 . 1 2 % 塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	1 軟膏 白色～微黄色 商品名等：チューブに印刷	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	温度の高くなる所に保管しないでください。小児の手の届かない所に保管してください。
2647709Q1040 662640417 リンデロン - VG ローション ローション 塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	1 ローション 白色 商品名等：容器のラベルに印刷	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	温度の高くなる所に保管しないでください。直接光のあたらない所に保管してください。小児の手の届かない所に保管してください。
2646701N2135 662640420 リンデロン - VG クリーム リーム 0 . 1 2 % 塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	1 クリーム 白色 商品名等：チューブに印刷	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	室温で保管してください。小児の手の届かない所に保管してください。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646701M2156 662640423 	1 軟膏 リンデロン - V軟膏 白色～微黄色 0.12%	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	温度の高くなる所に保管しないで下さい。直接光のあたらない所に保管して下さい。小児の手の届かない所に保管して下さい。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	商品名等：チューブに印刷		
2646701Q1038 662640421 	1 ローション リンデロン - Vローション 白色 0.12%	皮膚の炎症（かゆい、赤くはれる等の症状）を改善する塗り薬です。	温度の高くなる所に保管しないでください。直接光のあたらない所に保管してください小児の手の届かない所に保管してください。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	商品名等：容器のラベルに印刷		
1315706Q2056 661310145 	1 点眼・点耳・点鼻剤 リンデロン液 0.1% 無色	目、耳、鼻の炎症症状（かゆい、赤くなる等）を改善する薬です。	直接光のあたらない涼しい所に保管してください。小児の手の届かない所に保管してください。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	商品名等：容器のラベルに印刷		
2454700J1028 662450002 	1 坐剤 リンデロン坐剤 0.5mg 不透明なにぶい微黄白色	腸の炎症症状（下痢、便に血がまじる等）をおさえます。	過激な運動等のストレスをさけるように注意してください。はしかまたは水疱瘡にかかるないように注意してください。直接光のあたらない所に保管してください。小児の手の届かない所に保管してください。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	リンデロン坐剤 0.5 mg		
2454700J2024 662450003 	1 坐剤 リンデロン坐剤 1.0mg 不透明なにぶい微黄白色	腸の炎症症状（下痢、便に血がまじる等）をおさえます。	過激な運動等のストレスをさけるように注意してください。はしかまたは水疱瘡にかかるないように注意してください。直接光のあたらない所に保管してください。小児の手の届かない所に保管してください。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	リンデロン坐剤 1.0 mg		
1315706Q1025 661310146 	1 点眼剤 リンデロン点眼液 0.01% 無色	目の炎症症状（かゆい、赤くなる等）を改善する目薬です。	使用する前に手を洗ってください。薬を使用後は汚染しないようにしっかりとふたをしめてください。直接光のあたらない涼しい所に保管してください。小児の手の届かない所に保管してください。
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社	商品名等：容器のラベルに印刷		
2646708N1211 662640424 	1 ゲル剤 ルーフルゲル 0.5% 無色透明	このくすりは皮膚の炎症（赤くはれる、かゆいなどの症状）を抑えるぬり薬です。	
久光製薬株式会社 久光製薬株式会社	容器の記載：		

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646708M1194 662640425 ルーフル軟膏 0.5%	1 軟膏剤 0.5% 白色半透明	このくすりは皮ふの炎症(赤くはれる、かゆいなどの症状)を抑えるぬり薬です。	
久光製薬株式会社	容器の記載:		
久光製薬株式会社			
1319724Q1049 660407143 ルポック点眼液 0.1%	2 点眼剤 無色透明	・眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、目の手術後の炎症などを抑えます。	(保存方法を含む)・コンタクトレンズをしている人は、主治医に相談してください。・ふたを開けて1ヵ月経ったものは使用しないでください。
東洋ファルマー株式 株式会社ニデック	キャップの色:白色		
1319724Q1049 660407143 ルポック点眼液 0.1%	1 点眼液(5mLプラスチック容器) 点眼剤の色:無色透明 キャップの色:白色	・目の炎症や目の手術後の炎症を抑えます。	・コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
東洋ファルマー株式 日東メディック株式			
1147700J4021 660443016 レクトス25 mg	1 注腸軟膏 25 白~微黄色	・炎症や腫れ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。・熱を下げる作用があります。	・めまいやねむけ、目のかすみが起こった場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。
太田製薬株式会社 アステラス製薬株式			
1147700J5028 660443017 レクトス50 mg	1 注腸軟膏 50 白~微黄色	・炎症や腫れ、筋肉や関節の痛みを軽くします。ただし、病気の原因そのものを治すものではありません。・熱を下げる作用があります。	・めまいやねむけ、目のかすみが起こった場合には、車の運転や危険を伴う機械の操作などは行わないでください。
太田製薬株式会社 アステラス製薬株式			
1319732Q1027 660406136 レスキュラ点眼液 0.12%	1 点眼剤 無色透明キャップの色: 黄緑色	・この薬は緑内障や高眼圧症の治療に用いる目薬です。・栄養などを運んでいる目の中の液(房水)の流れをよくすることにより眼球内の圧力(眼圧)を下げ、病気の進行を止めます。	
株式会社アールテッ アステラス製薬株式			
1319732Q1027 660406136 レスキュラ点眼液 0.12%	2 点眼剤 無色透明キャップの色: 黄緑色	・この薬は緑内障や高眼圧症の治療に用いる目薬です。・栄養などを運んでいる目の中の液(房水)の流れをよくすることにより眼球内の圧力(眼圧)を下げ、病気の進行を止めます。	
株式会社アールテッ 参天製薬株式会社			

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
	1319732Q1027 3 点眼剤 660406136 レスキュラ点眼液 0.12% 黄緑色	・この薬は緑内障や高眼圧症の治療に用いる目薬です。・栄養などを運んでいる目の中の液(房水)の流れをよくすることにより眼球内の圧力(眼圧)を下げ、病気の進行を止めます。	
	株式会社アールテッ 参天製薬株式会社		
	2642702M1023 1 軟膏剤 662640428 レスタミンコーワ軟膏 1%	じん麻疹、湿疹、ストロフルス、虫さされその他皮膚のかゆみを和らげます。	・生活上注意することは
	興和株式会社 興和株式会社		
	2646705N1072 2 クリーム剤 662640430 レダコートクリーム 白色 0.1%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	アルフレッサファー アルフレッサファー	チューブ底面の記載: N F 5 5 4	
	2646705N1072 1 クリーム剤 662640430 レダコートクリーム 白色 0.1%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	アルフレッサファー アルフレッサファー	チューブ底面の記載: N F 5 5 4	
	2646705N1072 4 クリーム剤 662640430 レダコートクリーム 白色 0.1%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	アルフレッサファー アルフレッサファー	チューブ底面の記載: N F 5 5 4	
	2646705N1072 3 クリーム剤 662640430 レダコートクリーム 白色 0.1%	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	アルフレッサファー 武田薬品工業株式会社	チューブ底面の記載: N F 5 5 4	
	2646705M1107 1 軟膏剤 662640431 レダコート軟膏 0.1% 微黄色	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
	アルフレッサファー アルフレッサファー	チューブ底面の記載: N F 5 5 5	

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード 名称 製造会社 販売会社	形 色 記号	効能効果	注意事項
2646705M1107 662640431 レダコート軟膏 0.1%	4 軟膏剤 チューブ底面の記載：N F 5 5 5 武田薬品工業株式会社	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646705M1107 662640431 レダコート軟膏 0.1%	2 軟膏剤 チューブ底面の記載：N F 5 5 5 アルフレッサファー	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
2646705M1107 662640431 レダコート軟膏 0.1%	3 軟膏剤 チューブ底面の記載：N F 5 5 5 アルフレッサファー	・炎症を抑える働きがあり、発赤、はれ、かゆみなどの症状をとります。	
1149703J1020 661140188 レペタン坐剤 0.2 mg 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社	1 坐剤 シート面記載：レペタン 坐剤 0.2 mg	強い痛みをおさえる働きがあります。	(1) この薬を使用した後に、立ち上がったり歩いたりすると、むかつき、吐き気などがあらわれることがあるので、使用後はできる限り安静にしてください。 (2) 眠気、めまい、ふらつきなどが起こることがあるので、この薬を使用後は車の運転や高所作業など危険を伴う操作をしないでください。 (3) この薬を使用している間は飲酒を控えてください(アルコールの摂取により、この薬の作用が強くなることがあります)。 (4) 主治医からの生活上の指導に従ってください。
1149703J2027 661140189 レペタン坐剤 0.4 mg 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社	1 坐剤 シート面記載：レペタン 坐剤 0.4 mg	強い痛みをおさえる働きがあります。	(1) この薬を使用した後に、立ち上がったり歩いたりすると、むかつき、吐き気などがあらわれることがあるので、使用後はできる限り安静にしてください。 (2) 眠気、めまい、ふらつきなどが起こることがあるので、この薬を使用後は車の運転や高所作業など危険を伴う操作をしないでください。 (3) この薬を使用している間は飲酒を控えてください(アルコールの摂取により、この薬の作用が強くなることがあります)。 (4) 主治医からの生活上の指導に従ってください。
7149702X1026 667140003 ローズ水(吉田製薬) 吉田製薬株式会社 吉田製薬株式会社	1 液 無色澄明	・臭いを調えるものとして使用します。	

薬剤情報雑形マスター覧

形 色	効能効果	注意事項
記号		
2646717N1067 662640435  ロコイドクリーム 0.1%	1 クリーム 鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社	外用のステロイド剤です。皮ふの炎症をおさえる働きがあり、発赤(ほっせき:皮ふが赤くなる)、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹(しつしん)や皮ふ炎、虫さされなどの治療に用います。
2646717M1070 662640436  ロコイド軟膏 1%	1 軟膏 鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社	外用のステロイド剤です。皮ふの炎症をおさえる働きがあり、発赤(ほっせき:皮ふが赤くなる)、はれ、かゆみなどの症状をとります。湿疹(しつしん)や皮ふ炎、虫さされなどの治療に用います。
1329709Q1024 660444056  ロメフロン耳科用液 0.3%	2 耳科用液剤 鳥居薬品株式会社 鳥居薬品株式会社	・外耳炎・中耳炎を引き起こしている細菌(ブドウ球菌、綠膿菌、レンサ球菌、プロテウス属等)を殺菌する働きがあります。 この薬を飲むことで特に注意することはできません。
1329709Q1024 660444056  ロメフロン耳科用液 0.3%	1 点耳液 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・外耳炎や中耳炎を引き起こしている細菌を殺菌します。
1319734Q1034 660444057  ロメフロン点眼液 0.3%	1 点眼液 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・結膜炎やものもらい等の眼感染症を引き起こしている細菌を殺菌します。 コンタクトレンズを使用している人は、主治医に相談してください。
1319734Q2022 660407059  ロメフロンミニムス 眼科耳科用液 0.3% 0.5mL	2 耳科用液剤 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・外耳炎・中耳炎を引き起こしている細菌(ブドウ球菌、綠膿菌、レンサ球菌、プロテウス属等)を殺菌する働きがあります。 この薬を飲むことで特に注意することはできません
1319734Q2022 660407059  ロメフロンミニムス 眼科耳科用液 0.3% 0.5mL	1 点耳液 千寿製薬株式会社 武田薬品工業株式会社	・外耳炎や中耳炎を引き起こしている細菌を殺菌します。

薬剤情報雑形マスター覧

YJコード 診療コード	形	効能効果	注意事項
名称	色		
製造会社			
販売会社	記号		
2399707D2029 662390005	1 ワプロンP g	口腔内粘膜貼付剤（直径 1.2mm） 淡黄赤色	アフタ性口内炎の炎症をおさ え、痛みを和らげます。 ・生活上注意することは
救急薬品工業株式会 興和株式会社	590		

